

Ban ve hộp ACEHASAN 100 (Acetylcystein 100)


Hộp 30 gói thuốc bột

Kích thước : 105 x 45 x 85



Bảng vẽ thiết kế gói Acehasan 100

Kích thước: 50 x 80 mm



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hương

140 x 200 mm

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Acehasan

Thuốc bột

Thành phần

ACEHASAN 100

Hoạt chất: Acetylcystein 100 mg

Tá dược: Vitamin C, Saccharose, Natri saccharin, Kollidon K30, Mùicam.

ACEHASAN 200

Hoạt chất: Acetylcystein 200 mg

Tá dược: Vitamin C, Saccharose, Natri saccharin, Kollidon K30, Mùicam.

Tính chất dược lý

Các đặc tính dược lực học

- Acetylcystein là dẫn chất N - acetyl của L - cystein, một amino acid tự nhiên. Acetylcystein có tác dụng làm loãng nhầy. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mũ hoặc không bằng cách tách đôi cấu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học.
- Acetylcystein dùng để giải độc và bảo vệ gan do quá liều paracetamol bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hóa trung gian của paracetamol gây độc cho gan. Thuốc có thể bảo vệ được gan nếu bắt đầu điều trị trong vòng 12 giờ sau quá liều paracetamol. Bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.

Các đặc tính dược động học

- Sau khi uống, Acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl thành cystein và được chuyển hóa sau đó.
- Đạt nồng độ đỉnh huyết tương trong khoảng 0,5 đến 1 giờ sau khi uống liều 200 mg đến 600 mg. Độ thanh thải thận có thể chiếm 30% độ thanh thải toàn thân.
- Nửa đời cuối của Acetylcystein toàn phần là 6,25 giờ sau khi uống.

Chỉ định

- Làm loãng đờm trong các bệnh phế quản - phổi cấp và mãn tính kèm theo sự tăng tiết chất nhầy.
- Dùng làm thuốc giải độc trong quá liều paracetamol.

Liều lượng và cách dùng

Làm loãng chất nhầy

- Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 200 mg x 3 lần/ngày.
- Trẻ em từ 2 - 6 tuổi: 200 mg x 2 lần/ngày.

Giải độc quá liều paracetamol

- Khởi đầu 140 mg/kg, dùng dung dịch 5%, tiếp theo cách 4 giờ uống 1 lần, liều 70 mg/kg thể trọng và uống tổng cộng thêm 17 lần.

Cách dùng: Uống thuốc dưới dạng hòa tan trong nước.

Chống chỉ định

- Trẻ em dưới 2 tuổi.

- Quá mẫn với Acetylcystein hay với bất cứ thành phần nào khác của thuốc.
- Tiền sử hen (do nguy cơ phản ứng co thắt phế quản với tất cả các dạng thuốc có chứa Acetylcystein).

Thận trọng

- Giám sát chặt chẽ người bệnh có nguy cơ phát hen, nếu dùng Acetylcystein cho người có tiền sử dị ứng; nếu có co thắt phế quản, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản như salbutamol hoặc ipratropium và ngừng Acetylcystein ngay.
- Khi điều trị với Acetylcystein có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản, cần phải hút đờm để thông phế quản nếu bệnh nhân giảm khả năng ho.
- Bệnh nhân đái tháo đường (mỗi gói Acehasan 100 chứa 1,8 gam saccharose, mỗi gói Acehasan 200 chứa 2,7 gam saccharose).

Tác dụng phụ

- Rất hiếm khi xảy ra: Buồn nôn, nhức đầu, viêm miệng, ù tai, phát ban, mày đay.

Tương tác thuốc

- Acetylcystein là một chất khử, không nên phối hợp với các chất có tính oxy - hóa.
- Không được uống đồng thời Acetylcystein với các thuốc khác hoặc bất cứ thuốc nào làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng Acetylcystein.

Phụ nữ có thai và cho con bú

- Thuốc an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Lái xe và vận hành máy móc

- Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều và cách xử trí

- Quá liều Acetylcystein xảy ra khi tiêm truyền quá nhanh và với liều quá cao trong điều trị ngộ độc paracetamol.
- Điều trị quá liều theo triệu chứng.

Trình bày

ACEHASAN 100: Hộp 30 gói x gói 2 g. Gói giấy/Al/PE
ACEHASAN 200: Hộp 30 gói x gói 3 g. Gói giấy/Al/PE

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ẩm.

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Lưu ý

- Không dùng thuốc quá liều chỉ định.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CTY TNHH HASAN-DERMAPHARM

Đường số 2 - Khu công nghiệp Đồng An, Bình Dương, Việt Nam

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS: Trần Đình Hoàng