

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Terp-cod'S[®]



lsh

Terp-cod'S[®]

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

3 VỈ X 10 VIÊN NANG



THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG

Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.



MONTRONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Terp-cod'S[®]

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

3 VỈ X 10 VIÊN NANG



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Terp-cod'S[®]

Terp-cod'S[®]

Terpin hydrat	100mg
Dextromethorphan.HBr	10mg

10 VỈ X 10 VIÊN NANG



CHỈ ĐỊNH
Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG
Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.
Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.
Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

Mọi thông tin chi tiết xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Terp-cod'S[®]

Terp-cod'S[®]

Terpin hydrat	100mg
Dextromethorphan.HBr	10mg

10 VỈ X 10 VIÊN NANG



TC áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Terp-cod'S



Terp-cod'S

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

25 VỈ X 10 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG

Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

YÊU CẦU THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Terp-cod'S

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

25 VỈ X 10 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

TC áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Terp-cod'S

Terp-cod'S

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

100 VỈ X 10 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Terp-cod'S

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

100 VỈ X 10 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG

Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.



Mọi thông tin chi tiết xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 □ Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An



Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

3 VỈ X 4 VIÊN NANG





Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

3 VỈ X 4 VIÊN NANG





Handwritten signature

THÀNH PHẦN
Terpin hydrat100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH
Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG
Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.
Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.
Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Terp-cod'S

Terp-cod'S

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

10 VỈ X 4 VIÊN NANG



Terp-cod'S

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

10 VỈ X 4 VIÊN NANG



llh

THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG

Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

TRỌNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Đeo xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Terp-cod'S®



llh

Terp-cod'S®

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

25 VỈ X 4 VIÊN NANG



THÀNH PHẦN

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG

Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Terp-cod'S®

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

25 VỈ X 4 VIÊN NANG



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 □ Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Terp-cod'S®



Handwritten signature

Terp-cod'S®

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

100 VỈ X 4 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG

Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.



MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Terp-cod'S®

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

100 VỈ X 4 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Terp-cod'S®

Terp-cod'S®

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

20 VỈ X 15 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Terp-cod'S®

Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg

20 VỈ X 15 VIÊN NANG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Terpin hydrat 100mg
Dextromethorphan.HBr 10mg
Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG

Người lớn: 1-2 viên/ lần, ngày 3-4 lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.



MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lô SX :


Ngày SX :

HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ



Nhãn chai 50 viên nang

THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
 Dextromethorphan.HBr 10mg
 Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3-4 lần.
 Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem trong tờ HSDS

Để xa tầm tay của trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

SDK :
 TC áp dụng: TCCS
 Số lô SX :
 Ngày SX :
 HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
 ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244
 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
 phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 100 viên nang

THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
 Dextromethorphan.HBr 10mg
 Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3-4 lần.
 Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem trong tờ HSDS

Để xa tầm tay của trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

SDK :
 TC áp dụng: TCCS
 Số lô SX :
 Ngày SX :
 HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
 ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244
 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
 phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn chai 500 viên nang

THÀNH PHẦN

Terpin hydrat100mg
 Dextromethorphan.HBr 10mg
 Tá dược v.đ 01 viên nang

CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

LIỀU DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3-4 lần.
 Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2 viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem trong tờ HSDS

Để xa tầm tay của trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

SDK :
 TC áp dụng: TCCS
 Số lô SX :
 Ngày SX :
 HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
 ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244
 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
 phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

VIÊN NANG TERP-COD'S

Thành phần

Terpin hydrat	100mg
Dextromethorphan.HBr	10mg
Tá dược v.đ	01 viên nang

(Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon, Magnesi stearat)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 3 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 10 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 25 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 4 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 25 vỉ
8	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
9	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 20 vỉ
10	Đóng chai 50 viên
11	Đóng chai 100 viên
12	Đóng chai 500 viên

Dược lực học

Terpin hydrat là thuốc long đàm. Tác dụng bằng cách kích thích tế bào bài tiết của đường hô hấp.

Dextromethorphan.HBr là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung tâm ho ở hành não.

Dextromethorphan.HBr được dùng giảm ho nhất thời do kích thích nhẹ ở phế quản và họng như cảm lạnh hoặc hít phải chất kích thích.

Dextromethorphan.HBr có hiệu quả nhất trong điều trị ho mãn tính không có đàm.

Hiệu lực của Dextromethorphan.HBr gần tương đương so với hiệu lực của codein nhưng ít gây tác dụng phụ ở đường tiêu hóa hơn.

Dược động học

Dextromethorphan hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và có tác dụng trong vòng 15-30 phút sau khi uống, kéo dài khoảng 6-8 giờ.

Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không biến đổi và các chất chuyển hóa demethyl, trong số đó cũng có tác dụng giảm ho nhẹ.

Chỉ định

Điều trị triệu chứng ho do họng và phế quản bị kích thích khi cảm lạnh thông thường hoặc khi hít phải chất kích thích.

Liều dùng

Người lớn: 1-2viên/ lần, ngày 3-4lần.

Trẻ em từ 2-12 tuổi: 1-2viên/ ngày, chia làm 3-4 lần, tùy theo tuổi.

Chống chỉ định

Người bệnh quá mẫn với thành phần nào của thuốc.

Người bệnh đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase vì có thể gây những phản ứng dị nặng như sốt cao, chóng mặt, tăng huyết áp, chảy máu não, thậm chí tử vong.

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phụ nữ có thai và cho con bú.

Thận trọng

Người bệnh bị ho quá nhiều đàm và ho mãn tính ở người hút thuốc, hen hoặc tràn khí.

Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm hô hấp.

Người hay bị dị ứng.

Lạm dụng và phụ thuộc Dextromethorphan, có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng liều cao kéo dài.

Tác dụng phụ

Mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, buồn nôn, nôn và đau bụng (uống thuốc lúc đói).

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng

Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng được

Tương tác thuốc

Tránh dùng đồng thời các thuốc ức chế monoamin oxydase do tăng tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này.

Quinidin có thể làm giảm chuyển hóa của Dextromethorphan ở gan, làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh và tăng các tác dụng không mong muốn của Dextromethorphan.

Sử dụng quá liều

Triệu chứng: buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái mê, ảo giác, mất điều hòa, suy hô hấp, co giật.

Điều trị: hỗ trợ, dùng naloxon 2mg tiêm tĩnh mạch, cho dùng nhắc lại nếu cần tới tổng liều 10mg.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30⁰C.
- TC áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 826111 – 829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 06 tháng 04 năm 2012

KT. Giám đốc Công ty

Phó Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu