

VĐ-24846-16/154

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 15/7/2016

# 1. Nhãn tuýp 5g

**CHỈ ĐỊNH:** CHỮA VIÊM KẾT MẠC, ĐAU MẮT HỘT

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH**  
46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

**GMP - WHO**      Rx Thuốc bán theo đơn

**Thuốc mỡ tra mắt**      Tuýp 5g

**TETRACYCLIN 1%**

**Thành phần:** Tetracyclin hydroclorid.....0.05g  
Tá được vừa đủ.....5g

Số lô SX:  
HD:



# 2. Nhãn hộp 1 tuýp 5g

**QUAPHARCO**      Rx Thuốc bán theo đơn      **Thuốc mỡ tra mắt**      Tuýp 5g

**TETRACYCLIN 1%**

**Thành phần:** Tetracyclin hydroclorid.....0.05g  
Tá được vừa đủ.....5g

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH**  
46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

8 935069 601061

Rx Thuốc bán theo đơn      **Thuốc mỡ tra mắt**      Tuýp 5g

**TETRACYCLIN 1%**

Tiêu chuẩn: DDVN IV      SDK:

**Chỉ định:** Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột  
**Cách dùng:** Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày.  
**Chống chỉ định:**  
- Người mẫn cảm với Tetracyclin  
- Trẻ em dưới 12 tuổi.  
**Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.**

**Bảo quản:** Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.  
\*ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM,  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG\*

### 3. Nhãn hộp 100 tuýp 5g

Mặt trước

**QUAPHARCO**  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH  
46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

**GMP - WHO** **Thuốc mỡ tra mắt**

# TETRACYCLIN 1%

**100 tuýp (1 tuýp/5g)**

"ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM,  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"

5g

Rx Thuốc bán theo đơn

**Thuốc mỡ tra mắt**

# TETRACYCLIN 1%

**THÀNH PHẦN:**  
Tetracyclin hydroclorid.....0,05g  
Tá dược vừa đủ..... 5g

Tiêu chuẩn: DĐVN IV SDK:  
**THUỐC DÙNG TRONG BỆNH VIỆN**

Mặt sau



5g

QUAPHARCO



Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

Rx Thuốc bán theo đơn

**Thuốc mỡ tra mắt**

# TETRACYCLIN 1%

**CHỈ ĐỊNH:**  
Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột.

**CÁCH DÙNG:**  
Tra vào mắt 3 - 4 lần trong ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, TRÁNH ÁNH SÁNG,  
NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 30°C**

## 4. Nhãn tuýp 3g

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH**  
46 Đường Hữu Nghị, P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, T. Quảng Bình

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn  
Thuốc mỡ tra mắt

**TETRACYCLIN 1%**

**CHỈ ĐỊNH:** CHỮA VIÊM KẾT MẠC, ĐAU MẮT HỘT

**Thành phần:**  
Tetracylin hydroclorid.....0.03g  
Tá dược vừa đủ.....3g

  
**Tuýp 3g**

Số lô SX:  
HD:

## 5. Nhãn hộp 1 tuýp 3g



**Tetracyclin 1%**

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn

**TETRACYCLIN 1%**

**Thành phần:** Tetracylin hydroclorid.....0.03g  
Tá dược vừa đủ.....3g

**Chỉ định:** Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột  
**Cách dùng:** Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày.  
**Chống chỉ định:**  
- Người mẫn cảm với Tetracyclin  
- Trẻ em dưới 12 tuổi.  
*Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.*

  
8 935069 601061

**Bảo quản:** Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.  
"ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"  
**Tiêu chuẩn:** ĐBVN IV  
**SĐK:**

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH**  
46 Đường Hữu Nghị, P. Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, T. Quảng Bình

Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

**Tetracyclin 1%**

**Tetracyclin 1%**

**Tetracyclin 1%**

## 6. Nhãn hộp 100 tuýp 3g

Mặt trước

Mặt sau

**3g**

**3g**

QUAPHARCO

Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

**QUAPHARCO**  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH  
46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

**GMP - WHO**

**Thuốc mỡ tra mắt**

100 tuýp (1 tuýp/3g)

**Tetracyclin 1%**

ĐỂ XA TÁM TAY CỦA TRẺ EM,  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG\*

Rx Thuốc bán theo đơn

**Thuốc mỡ tra mắt**

**Tetracyclin 1%**

**THÀNH PHẦN:**  
Tetracyclin hydroclorid..... 0,03g  
Tá dược vừa đủ..... 3g

Tiêu chuẩn: DDVN IV      SĐK:

**THUỐC DÙNG TRONG BỆNH VIỆN**

**CHI ĐỊNH:**  
Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột.

**CÁCH DÙNG:**  
Tra vào mắt 3 - 4 lần trong ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**BẢO QUẢN NƠI KHÔ RÁO, TRÁNH ÁNH SÁNG,  
NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUẢ 30°C**

M.S.D.N: 3100137028 - C.T. H  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
DƯỢC PHẨM  
QUẢNG BÌNH  
TP. ĐỒNG HỚI - T. QUẢNG BÌNH

QUAPHARCO

8 935069 4601061

*Rx Thuốc bán theo đơn*

## Thuốc mỡ tra mắt

### TETRACYCLIN 1%

\*\*\*\*\*

**Thành phần:** Tính cho 1 tuýp 3g:

Tetracyclin hydroclorid ..... 0,03 g

Tá dược (Parafin rắn, Lanolin, Vaseline) ... vừa đủ 3g

**Chỉ định:**

Thuốc được dùng tra mắt để điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các vi khuẩn nhạy cảm với tetracyclin, chữa viêm kết mạc, đau mắt hột.

**Liều lượng và cách dùng:**

Tra một lượng nhỏ thuốc mỡ vào mắt bị bệnh. Ngày tra 3-4 lần.

Nên tra thuốc trước khi đi ngủ để tránh trở ngại do thuốc mỡ có thể hạn chế tầm nhìn.

Lưu ý:

- Không nên dùng thuốc sau khi mở nắp tuýp quá 1 tháng. Để nhớ chính xác, nên viết ghi chú ngày mở nắp tuýp lần đầu.
- Sau mỗi lần mở nắp tuýp, phải đậy kín nắp và bảo quản tuýp thuốc ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
- Không để đầu tuýp chạm vào bất cứ thứ gì để tránh nhiễm bẩn.
- Không dùng chung thuốc tra mắt cho nhiều người.

**Chống chỉ định:**

- Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với các Tetracyclin.
- Trẻ em dưới 12 tuổi.

**Thận trọng:**

Sử dụng tại chỗ tetracyclin có nguy cơ tăng nhạy cảm dẫn đến tăng tính kháng thuốc của vi khuẩn, vì vậy nên sử dụng thuốc để điều trị giới hạn các nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn nhạy cảm cao và bệnh mắt hột.

**Phụ nữ có thai và cho con bú:** Chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Tetracyclin phân bố trong sữa mẹ có khả năng biến màu răng vĩnh viễn, giảm sản men răng, ức chế sự phát triển xương, phản ứng nhạy cảm ánh sáng và nấm Candida ở miệng và âm đạo trẻ nhỏ. Vì vậy không nên dùng tetracyclin cho phụ nữ đang cho con bú.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:**

Do thuốc dùng để tra mắt có thể gây hạn chế tầm nhìn. Vì vậy không nên dùng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc.

**Tương tác thuốc:**

Tương tác thuốc đối với dạng thuốc mỡ Tetracyclin 1% ít gặp.

**Tác dụng không mong muốn:**

- Có thể gây kích ứng thoáng qua khi sử dụng.
- Răng trẻ kém phát triển và biến màu khi sử dụng tetracyclin cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em dưới 8 tuổi.
- Hiếm gặp phản ứng toàn thân có thể xảy ra dị ứng da, mày đay, phù Quincke, tăng nhạy cảm với ánh sáng, các phản ứng phản vệ, ban xuất huyết.

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**Dược lực học:**

Tetracyclin là một kháng sinh kìm khuẩn có hoạt phổ rộng thông qua sự ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. Cơ chế tác dụng của tetracyclin là do khả năng gắn vào và ức chế chức năng ribosom của vi khuẩn, đặc biệt là gắn vào

11.1  
11.2  
11.3  
11.4

đơn vị 30S của ribosom. Do vậy ngăn cản quá trình gắn aminoacyl t - RNA dẫn đến ức chế quá trình tổng hợp protein. Phổ tác dụng: Tetracyclin có tác dụng trên nhiều vi khuẩn gây bệnh cả Gram âm và Gram dương, cả hiếu khí và kỵ khí. Thuốc có tác dụng trên *Chlamydia*, *Mycoplasma*, *Rickettsia*, *Spirochaete*. Ngày nay, sự kháng thuốc của tetracyclin là rộng, tuy nhiên tetracyclin vẫn nhạy cảm với một vài chủng vi khuẩn và trong điều trị bệnh mắt hột.

**Dược động học:**

Tetracyclin dạng thuốc mỡ 1%, khi dùng trực tiếp lên mắt, thuốc cho tác dụng tại chỗ, mức độ hấp thu phụ thuộc mức độ tổn thương kết mạc mắt.

**Quá liều và xử trí:**

Thuốc mỡ Tetracyclin 1% là thuốc tra mắt có tác dụng tại chỗ, tác dụng quá liều gần như không xảy ra.

**Đóng gói:** Hộp 1 tuýp 3g. Hộp 100 tuýp 3g. Hộp 1 tuýp 5g. Hộp 100 tuýp 5g.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**Tiêu chuẩn:** ĐDVN IV.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH**

Số 46- Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

ĐT: (052) 3822475 - 3822346 Fax: 052. 3820720

Ngày 08 tháng 01 năm 2016

**CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đs. Nguyễn Thị Mai*

