


# MẪU NHÃN

20/142

## 1. Mẫu nhãn lọ 45 viên bao phim



## 2. Mẫu nhãn hộp 1 lọ



# MẪU NHÃN

## 3. Nhãn trên vỉ 10 viên



Số Lô SX, HD :  
In chìm trên vỉ

## 4. Nhãn trên hộp 05 vỉ x 10 viên



# MẪU NHÃN

## 5.Nhãn lọ 1000 viên



Đà Nẵng, ngày 5 tháng 7 năm 2013  
Tổng giám đốc



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

### Viên bao phim BÀI THẠCH

**Thành phần :** mỗi viên bao phim chứa:

Cao khô Kim tiền thảo	: 90 mg
Tương ứng với 1000 mg Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracifolii)	
Cao khô hỗn hợp	: 230 mg
Tương ứng với:	
+ 250 mg Nhân trần (Herba Artemisia capillaris)	
+ 150 mg Hoàng cầm (Radix Scutellariae)	
+ 250 mg Nghệ (Rhizoma Curcumae longae)	
+ 100 mg Bình lang (Semen arecae)	
+ 100 mg Chỉ thực (Fructus Aurantii immaturus)	
+ 100 mg Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis)	
+ 500 mg Bạch mao căn (Rhizoma Imperatae cylindricae)	
- Mộc hương (Radix Saussureae lappae)	: 100mg
- Đại hoàng (Rhizoma Rhei)	: 50mg
Tá dược (Lactose monohydrat, Eragel, Povidon K30, MCC 102, DST, Aerosil, Magnesi stearat, HPMC, Maltodextrin, Talc, Titan dioxide, PEG 400, Màu đen oxyd sắt, Màu đen oxyd đỏ) vừa đủ	: 1 viên



#### Dược lực học:

BÀI THẠCH được phối hợp từ nhiều loại dược liệu có tác dụng bổ sung hiệp đồng với nhau:

- Kim tiền thảo: lợi tiểu, tiêu viêm, bào mòn sỏi. Tác dụng của Kim tiền thảo được tăng

cường và dễ dàng hơn khi được phối hợp với các dược liệu khác có trong công thức:

- Nhân trần, Bình lang và Đại hoàng: làm tăng tiết mật, kích thích co bóp.

- Hoàng cầm, Nghệ: kháng sinh, kháng viêm.

- Mộc hương, Chỉ thực, Hậu phác: hành khí, giảm đau.

#### Dược động học:

 Không có thông tin

#### Chỉ định :

 Thuốc dùng trong các trường hợp

- Điều trị sỏi thận- tiết niệu, sỏi mật, viêm túi mật.

- Phòng ngừa tái phát, đặc biệt là sau khi tán sỏi hoặc mổ lấy sỏi

#### Liều lượng - Cách dùng:

Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc dùng liều trung bình là

- Để tống sỏi : Ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên

- Để điều trị viêm và phòng ngừa tái phát : Ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên

Uống với nhiều nước, trước bữa ăn

Nguyễn Văn...  
9

### Chống chỉ định :

- Người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và đang cho con bú

**Tác dụng không mong muốn:** Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.

\**Thông báo ngay cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc*

### Phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

### Lái xe và vận hành máy móc:

Chưa ghi nhận được ảnh hưởng nào trên người lái xe hay vận hành máy móc.

**Thận trọng:** Thận trọng khi dùng thuốc cho người đang rối loạn tiêu hóa, ỉ chảy.

**Tương tác thuốc :** Không có thông tin.

**Quá liều:** Không có thông tin

### Khuyến cáo :

- Uống thuốc trước bữa ăn, uống với nhiều nước.
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng.
- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.*

### Trình bày và bảo quản :

- Thuốc đóng trong lọ 45 viên, hộp 1 lọ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Thuốc đóng trọng lượng 1000 viên, hộp 1 lọ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Thuốc ép trong vỉ 10 viên, hộp 5 vỉ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

### ĐỀ XÁ TÀM TAY TRẺ EM

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

### Thuốc được sản xuất tại :

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu Công nghiệp Hòa Khánh – quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760452 Fax: 0511.3760127 Email: [info@danapha.com](mailto:info@danapha.com)

Điện thoại tư vấn: 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 7 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Đầu

PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thành*