

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
VIÊN NÉN DEGRESINOS

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 27 / 12 / 2013

1. Mẫu nhãn vỉ



Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2012
CTY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM

KT/ Giám đốc

Phó giám đốc



Ds. Nguyễn Quốc Chính

2 Mẫu nhãn hộp



Hộp 4 vỉ x 25 viên nén

Degresinos

Diiodohydroxyquinolin 210mg

R_x

Thuốc bán theo đơn

WHO GMP
SĐK:

Degresinos

Diiodohydroxyquinolin 210mg

Hộp 4 vỉ x 25 viên nén
Box of 4 blisters x 25 tablets

TP

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM
60 Độc Lập - KCN Việt Nam Singapore
Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương
VP: 3A Đặng Tất P. Tân Định, Q.1, TP.HCM

THÀNH PHẦN: mỗi viên chứa
Diiodohydroxyquinolin210mg
Tá dược vd.....1 viên nén

SĐK:
TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX:
Ngày SX:
Hạn dùng:

Degresinos

Diiodohydroxyquinolin 210mg

TP

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C

Degresinos

Diiodohydroxyquinolin 210mg

Box of 4 blisters x 25 tablets

CHỈ ĐỊNH:
- Nhiễm amip đường ruột

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nén DEGRESINOS

THÀNH PHẦN : Mỗi viên chứa

Diiodohydroxyquinolin 210 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Avicel PH101, Tinh bột sắn, PVP. K30, Natri starch glycolat, Talc, Magnesi stearat).

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ

- Nhiễm amip đường ruột.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Người lớn: Uống 2 - 3 viên/ lần, 3 lần/ ngày, trong 20 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người bị mẫn cảm với iodine hoặc các dẫn xuất halogen của hydroxyquinolin.

- Người bị suy gan, suy thận.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- Thận trọng với bệnh nhân bị bệnh tuyến giáp.

- Thận trọng với bệnh nhân có rối loạn thần kinh.

- Tránh sử dụng lâu dài.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC

Không dùng chung với các thuốc có chứa nhóm hydroxyquinolein, phenobarbiton, warfarin.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Lưu ý thuốc có thể gây chóng mặt, vì thế phải thận trọng khi điều khiển lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, ngứa, viêm da, phi đại tuyến giáp. Sốt, ớn lạnh nhức đầu, chóng mặt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Ngộ độc cấp: Đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, sốt và lạnh run.

Xử trí: Rửa dạ dày. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

DƯỢC LỰC HỌC

Diiodohydroxyquinolin là chất dẫn xuất halogen của hydroxyquinolin có tác dụng chống lại trophozite của Entamoeba histolytica ở đường ruột.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Diiodohydroxyquinolin kém hấp thu ở đường tiêu hóa và có thể đạt nồng độ cao ở lòng ruột. Diiodohydroxyquinolin kém hấp thu sau khi uống. Diiodohydroxyquinolin được thải trừ chủ yếu qua phân, một lượng nhỏ ít hơn 10% liều dùng được thải trừ qua nước tiểu dưới dạng glucuronide.

BẢO QUẢN : Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C

HẠN DÙNG : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN : TCCS

TRÌNH BÀY : Hộp 4 vỉ x 25 viên.

KHUYẾN CÁO : Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ

CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM THÀNH NAM

Địa chỉ: 60 - Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

ĐT: (0650) - 3767850

Fax: (0650) - 3767852

Văn phòng: 3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM

Ngày 01/ 04/ 2012

KT/ Giám đốc

Phó Giám đốc



DS NGUYỄN QUỐC CHINH



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh