

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~101~~ /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày ~~27~~ tháng ~~04~~ năm 2017

**GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39200300

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Rectiofar	VD-19338-13

**Phương tiện quảng cáo:** Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, pano, phương tiện giao thông cho công chúng

**Nội dung quảng cáo:** Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Tất Đạt**



# Pectiofar

thuốc trị táo bón



*Signature*  
26/04/2018

Tỉ lệ: 1/70 – 1/500

**CÔNG THỨC:**

- Glycerin: 59,53g

- Nước tinh khiết: vừa đủ 100ml

**CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:**

- Bơm thuốc vào trực tràng, ngày 2 đng, 1-2 lần/ ngày.

- Trẻ em : loại 3ml.

- Người lớn: loại 5 ml.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Dùng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Trị trong đợt cấp, đỏ hậu môn, tiêu chảy.

**LIỀU Y - THẬN TRỌNG:**

- Người bị bệnh tim, thận hay gan.

- Người cao tuổi.

- Người bệnh ở tình trạng tinh thần lú lẫn, suy tim sung huyết, lão suy ở người cao tuổi, đại tháo đường và mất nước trầm trọng.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Không có

**PHỤ NỮ MANG THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ:**

- Glycerin có thể sử dụng trong quá trình mang thai nếu thật sự cần thiết

- Thuốc nên dùng thận trọng đối với phụ nữ cho con bú

**TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LẠI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không có

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

- Glycerin có thể gây kích ứng tại chỗ khi dùng đường trực tràng.

- Sau khi dùng đường trực tràng thuốc ít được hấp thu, nhưng khi hấp thu:

Thuốc có thể gây đau đầu, nôn.

It gặp trường hợp choáng váng, lú lẫn, tiêu chảy, buồn nôn, khát.

Một số triệu chứng hiếm xảy ra: loạn nhịp tim, tăng đường huyết.

Thông báo cho Bác Sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUẢ LIỀU VÀ/XỬ TRÍ:**

- Quá liều có thể gây tiêu chảy nặng, nôn, loạn nhịp tim, kích ứng trực tràng, đau rất trực tràng và cơ rút, tăng đường huyết.

- Trường hợp quá liều mạnh phải ngừng thuốc và đưa người bệnh vào bệnh viện.

**ĐƯỢC LƯC HỌC:**

- Glycerin được dùng qua đường trực tràng để hút dịch vào đại tràng và do đó thúc đẩy thải phân khi táo bón. Thuốc còn có tác dụng gây trơn và làm mềm phân.

**ĐƯỢC ĐỒNG HỌC:**

- Khi dùng đường trực tràng, sự hấp thu của thuốc kém.

**CHỈ DÙNG NGOÀI, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG.**

**BÉ XA TÂM TAY TRẺ EM,**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, THUỐC KHI DÙNG,**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Y KIẾN BÁC SĨ.**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỀU PHARMEDIC  
367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. HCM | Tel: (84) 08 39 200 300 | Fax: (84) 08 39 200 096 | Website: www.pharmedic.com.vn

Số giấy xác nhận HSDKQC của cục QLD BHYT: .../.../ XNQC - QLD