

SA 8/131

MẪU THÂN HỘP THUỐC

Chỉ định :

Bổ sung Vitamin và khoáng chất

Liều lượng và cách dùng : Xem tờ hướng dẫn kèm theo.

Chống chỉ định : Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Bảo quản : Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng ở nhiệt độ dưới 30°C.

Đóng gói : Hộp 100 viên nang mềm (20 vỉ x 5 viên)

Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Lot No. / Số lô SX :
Mfd. Date / NSX :
Exp. Date / HSD :
Visa No. / Số ĐK :



Boch

ROYALPANACEA

Chứa sữa ong chúa, các Vitamin và khoáng chất.

Sản xuất bởi :

KOREA E-PHARM INC

648-2, CHOJI-DONG, ANSAN-SI, KYUNGKI-DO, HÀN QUỐC



Thành phần :

Thành phần hoạt chất mỗi viên gồm:

Sữa ong chúa	50,00mg	Sắt fumarat	25,00mg
Cao lô hội (Aloe extract)	3,00mg	Magnesi Oxid	40,00mg
Retinol acetat (Vitamin A)	2.000 I.U.	Kẽm Oxid	10,00mg
		Dicalci Phosphat	120,00mg

ROYALPANACEA

Chứa sữa ong chúa, các Vitamin và khoáng chất.

Sản xuất bởi :


KOREA E-PHARM INC

648-2, CHOJI-DONG, ANSAN-SI, KYUNGKI-DO, HÀN QUỐC


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 26/11/2013

MẪU NẮP HỘP THUỐC



MẪU VỈ THUỐC



CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ
HỒNG LONG

S.Đ.K.K.D.: 0102000690 - C.T.N.H.H
LỘN VĨ
AG NGC 0

67

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Viên nang ROYALPANACEA

[Thành phần] Mỗi viên nang mềm chứa:

Thành phần hoạt chất:

Sữa ong chúa.....50,00 mg
Cao lô hội (Aloe extract).....3,00 mg
Retinol acetat (vitamin A).....2000 I.U.
Sắt fumarat.....25,00 mg
Magnesi oxid.....40,00 mg
Kẽm oxid.....10,00 mg
Dicalci Phosphat.....120,00 mg

Thành phần tá dược: Dầu cọ, sáp ong, dầu đậu nành, Gelatin, Ethyl vanillin, Titan dioxid, Methyl-p-hydroxy benzoat, Propyl-p-hydroxy benzoat, Màu xanh số 1, Màu vàng số 5, Màu đỏ số 40, Nước tinh khiết vừa đủ.

[Chỉ định]

- Bổ sung Vitamin và khoáng chất.

[Liều lượng và cách dùng]

- Liều lượng thông thường cho người lớn là uống 2 viên mỗi lần, 2 lần mỗi ngày.
- Liều lượng cho trẻ em là uống từ 1 viên mỗi lần, 2 lần mỗi ngày.
- Nên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn sử dụng hay theo lời khuyên của bác sỹ.

Cách dùng: Dùng theo đường uống

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG

Cần hỏi ý kiến bác sỹ hay dược sỹ trước khi dùng thuốc trong các trường hợp sau đây:

- Trẻ em dưới 1 tuổi
- Bệnh nhân đang trong thời gian điều trị
- Phụ nữ có thai hay nghi ngờ có thai.

Thông tin bổ sung:



TC
11/2018

- Cần dùng thuốc theo hướng dẫn sử dụng
- Trẻ em dùng thuốc dưới sự giám sát của người lớn.
- Không dùng chung với thuốc chứa vitamin A khác .
- Vì Vitamin A được cung cấp đầy đủ trong các bữa ăn hàng ngày nên trong khi điều trị không nên dùng quá 5000 I.U Vitamin A mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc và lái xe.

Tác dụng phụ

Chưa đến nay chưa có báo cáo về tác dụng phụ của thuốc khi được kê toa. Tuy nhiên nếu bạn gặp bất kỳ một triệu chứng bất thường nào khi dùng thuốc xin báo cáo cho bác sĩ biết

Thông báo cho bác sĩ nếu có bất cứ phản ứng phụ nào xảy ra khi dùng thuốc

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Tương tác thuốc

Colestyramin làm giảm hấp thu vitamin A. Cho đến nay chưa thấy có sự tương tác nào với các thực phẩm nào.

Quá liều

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Đóng gói: Hộp 100 viên nang mềm (20 vỉ x5 viên).

Dạng bào chế: viên nang mềm

Đường dùng: Đường uống.

Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng ở nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn Nhà sản xuất

Nhà sản xuất: **KOREA E- PHARM INC**

648-2 CHOJIDONG, ANSAN-SI, KYUNGKI - DO, Hàn Quốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh