

Rx

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

SDK: VN-16019-12

# Chymotase

Thymomodulin 60mg

## THÀNH PHẦN

Mỗi ống 10 ml có chứa:

Thymomodulin ..... 60mg

Tà được vừa đủ 1 ống (Sucrose, Acid citric khan, Concentrated Glycerin, Methyl parahydroxybenzoat, Propyl parahydroxybenzoat, Champagne cider flavor, Ethanol, nước tinh khiết, D-sorbitol solution).

## TÁC DỤNG DƯỢC LÝ

Thymomodulin là một polypeptide phi protein có tác dụng điều hòa miễn dịch trên mô hình thử nghiệm.

## DƯỢC ĐỘNG HỌC

Thuốc được hấp thu tốt sau khi uống, mức độ hấp thu của thuốc được đánh giá thông qua sự xuất hiện của FTS (facteur thymique serique). Sau khi uống Thymomodulin trên đối tượng khỏe mạnh khoảng 2-6h sự xuất hiện của FTS đạt được là tối đa, nó được duy trì trong khoảng 12 giờ và biến mất sau khoảng 48 giờ.

## CHỈ ĐỊNH

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn. - Viêm mũi dị ứng.
- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn. - Hỗ trợ cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn: 120mg/ngày, dùng trong thời gian từ 4 đến 6 tháng. - Viêm mũi dị ứng: Liều dùng 120mg/ngày, dùng trong thời gian 4 tháng. - Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn: 120mg/ngày, dùng trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. - Hỗ trợ cải thiện triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS: 60mg/ngày, dùng trong thời gian 50 ngày. - Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi: Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong 6 tuần.

## THẬN TRỌNG

Tuân thủ liều dùng và đường dùng. Trẻ em dùng thuốc phải có giám sát của cha mẹ.

Thuốc chỉ dùng đường uống, không được tiêm.

## SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Sử dụng thuốc thận trọng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ. Thông báo cho bác sỹ nếu có phản ứng phụ xảy ra trong khi dùng thuốc. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn với thuốc này hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

**TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC** | Không ảnh hưởng.

**TÁC DỤNG PHỤ** | Có thể gặp phản ứng dị ứng ở bệnh nhân quá mẫn.

**TƯƠNG TÁC THUỐC** | Chưa có báo cáo.

**QUẢ LIỀU** | Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều khi sử dụng thuốc nước CHYMOTASE.

Nếu có quá liều xảy ra việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và nâng đỡ cơ thể.

**ĐÓNG GÓI** | 10 ml / ống, 20 ống / hộp

**HẠN DÙNG** | 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN** | Giữ thuốc trong hộp kín ở nhiệt độ phòng (dưới 30°C), tránh ánh sáng.

**TIÊU CHUẨN** | Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Sản xuất bởi:



**CHO-A PHARM.CO.,LTD.**

118, Gwanggyong-ro, Haman-syeon, Haman-gun, Gyeonggsangnam-do, Hàn Quốc