

CHAI 100 ML SIRO THUỐC

Thành phần : Cho 100 ml siro
Cao khô lá thường xuân 10%0,7g
Tương ứng với 4,55 g lá thường xuân (Folium hederæ)
Tã được vừa đủ100 ml

Chỉ định : Điều trị viêm đường hô hấp cấp tính có kèm ho. Điều trị triệu chứng trong bệnh lý viêm phế quản mãn tính.

Chống chỉ định : Quá mẫn với các thành phần của thuốc. Người không dung nạp fructose, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú chỉ được phép dùng thuốc theo chỉ dẫn của Bác sĩ.

Bảo quản : Nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng. Nhiệt độ không quá 30° C

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Công ty CP. dược Danapha
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng



Danospan

Liều lượng và cách dùng :

- Trẻ sơ sinh - 1 tuổi: Uống 2,5ml x 1-2 lần/ngày.
- Trẻ 1 tuổi - 4 tuổi: Uống 2,5ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ 4 tuổi - 12 tuổi: Uống 5ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ > 12 tuổi và người lớn: Uống 5ml x 3 lần/ngày.

Sử dụng cốc đong kèm theo trong hộp thuốc

SDK :
ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
Ngày SX :
Số lô SX :
HD :

Sản xuất tại : KCN. Hòa Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

2. Nhãn hộp 1 chai x 100 ml :

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 23-03-2016

Roz

Sirô

Danospan

Chai 100ml



Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

Sirô

Danospan

Thành phần : Cho 100 ml siro
Cao khô lá Thường xuân 10%.....0,7g
Tương ứng với 4,55 g lá thường xuân (Folium Hederæ)
Tã được vừa đủ100ml

Chỉ định :
Điều trị viêm đường hô hấp cấp tính có kèm ho. Điều trị triệu chứng trong bệnh lý viêm phế quản mãn tính.

Chống chỉ định : Quá mẫn với các thành phần của thuốc. Người không dung nạp fructose, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú chỉ được phép dùng thuốc theo chỉ dẫn của Bác sĩ.

Bảo quản :
Nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng.
Nhiệt độ không quá 30° C

CÔNG TY CP. DƯỢC DANAPHA
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng

Sirup

Danospan

Chai 100ml



Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

Sirô

Danospan

Liều lượng và cách dùng :

- Trẻ sơ sinh - 1 tuổi: Uống 2,5ml x 1-2 lần/ngày.
- Trẻ 1 tuổi - 4 tuổi: Uống 2,5ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ 4 tuổi - 12 tuổi: Uống 5ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ > 12 tuổi và người lớn: Uống 5ml x 3 lần/ngày.

Sử dụng cốc đong kèm theo trong hộp thuốc

SDK :
ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Ngày SX :
Số lô SX :
HD :

Sản xuất tại : KCN. Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Đà Nẵng ngày 5 tháng 6 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. Nguyễn Quang Trị, MBA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

DANOSPAN

THÀNH PHẦN: Cho 100 ml dung dịch:

Cao khô lá thường xuân 10%.....	0,7 g
Trương ứng với 4,55 g lá thường xuân (Folium Hederæ)	
Tá dược (Kali sorbat, Acid citric monohydrat, Dung dịch Sorbitol 70%, Sucralose, Xanthagum, nước tinh khiết) vừa đủ.....	100 ml

DƯỢC LỰC HỌC:

Saponin trong cao lá thường xuân (gồm alpha hederin và hederacoside C) có tác dụng chống co thắt và tan đàm theo cơ chế qua trung gian niêm mạc dạ dày, kết quả nhận được trong kích thích phản thân của các tuyến dịch nhầy phế quản thông qua các cơ quan của hệ thống thần kinh đối giao cảm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Không có thông tin

CHỈ ĐỊNH: Thuốc được dùng điều trị viêm đường hô hấp cấp tính có kèm ho, điều trị triệu chứng trong bệnh lý viêm phế quản mãn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, chỉ được phép dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng: Nếu không có chỉ định riêng, sử dụng liều như sau:

- Trẻ sơ sinh - 1 tuổi: 2,5 ml x 1-2 lần/ngày.
- Trẻ 1 tuổi - 4 tuổi: 2,5 ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ 4 tuổi - 12 tuổi: 5 ml x 2 lần/ngày.
- Trẻ > 12 tuổi và người lớn: 5 ml x 3 lần/ngày.

Cách dùng:

- Sử dụng dụng cụ đựng thuốc đi kèm trong hộp thuốc:

Lắc kỹ trước mỗi lần sử dụng

Thời gian điều trị: Thời gian điều trị ho phụ thuộc vào loại bệnh và mức độ của bệnh trên lâm sàng, tuy nhiên, việc điều trị nên duy trì trong ít nhất một tuần đối với trường hợp viêm nhẹ đường hô hấp. Việc điều trị với thuốc nên được duy trì 2 - 3 ngày sau khi hết triệu chứng để đảm bảo hiệu quả của đợt điều trị.

Nếu tình trạng bệnh vẫn kéo dài hoặc có xuất hiện thở nông, sốt cũng như đờm có máu hoặc mủ thì phải tham khảo ngay ý kiến bác sĩ.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Mặc dù chưa có báo cáo nào về tác dụng có hại đối với thai nhi và trẻ bú mẹ, chỉ nên sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi thật cần thiết. Cần cân nhắc giữa lợi ích mang lại và nguy cơ tác hại có thể xảy ra.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không có phản ứng không mong muốn nào được biết đến khi sử dụng đồng thời đường uống siro ho Danospan với các loại thuốc khác. Vì vậy, sử dụng siro Danospan đồng thời với các thuốc khác được xem là an toàn, ví dụ như phối hợp với thuốc kháng sinh.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Rất hiếm khi. Siro ho Danospan có thể dẫn tới nhuận tràng do thành phần sorbitol có trong thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Dùng quá liều có thể gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy và kích thích. Trong trường hợp này, nên tham khảo ngay ý kiến của bác sĩ.

KHUYẾN CÁO

- Không nên dùng thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghi ngờ về chất lượng thuốc.
 - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.
- Lưu ý đặc biệt:** Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc chiết xuất từ thực vật, màu của siro Danospan đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Chế phẩm đóng trong chai thủy tinh 100 ml, kèm theo cốc phân liều.
- Để thuốc nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Khu công nghiệp Hòa Khánh – quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com

Điện thoại tư vấn : 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 6

tháng 6

năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Quang Trí, MBA