

# Liverstad

## THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang chứa:

Silymarin (dưới dạng cao cardus marianus) .....70 mg

Tá dược vừa đủ ..... 1 viên

(Lactose monohydrat, tinh bột bắp, povidon K30, macrogol 6000, colloidal silica khan, talc, magnesi stearat)

## MÔ TẢ

Viên nang cứng, màu cam, chứa bột thuốc màu vàng.

## DƯỢC LỰC HỌC

Silymarin được dùng để điều trị các rối loạn ở gan. Thử nghiệm trên thú silymarin được dùng để ngăn ngừa các rối loạn ở gan, thuốc giúp tăng cường chức năng của các cấu trúc xung quanh và bên trong tế bào gan, do đó dẫn đến kích hoạt sự phát triển và sự tái tạo tế bào gan.

Tác dụng bảo vệ gan của silymarin đã được chứng minh trên các mẫu thử nghiệm không những dùng các tác nhân cổ điển tấn công lên gan như carbon tetrachlorid, thioacetamid, D-galactosamin, cồn ethyl, mà còn trên các tổn thương nặng ở gan gây bởi phalloidin, alpha-amanatin và Frog virus 3 (FV3).

## DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi uống 140 mg silymarin, nồng độ của hoạt chất đạt được ở mật khoảng 10 - 30 mcg/ml. Đào thải qua mật kéo dài khoảng 24 giờ. Đào thải qua thận thấp (khoảng 3%).

## CHỈ ĐỊNH

Điều trị hỗ trợ các rối loạn chức năng tiêu hóa liên quan đến các bệnh về gan.

## LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Liverstad được dùng bằng đường uống, 2 viên x 2-3 lần/ngày.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân bị bệnh não do gan, vàng da do tắc mật và xơ gan do mật nguyên phát.

## THẬN TRỌNG

- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Trẻ em: không có độc tính nào được báo cáo.

## TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có báo cáo tương tác với các thuốc khác.

## PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có báo cáo về độc tính đối với người mẹ, bào thai và trẻ sau khi dùng silymarin.

## TÁC DỤNG PHỤ

Đau dạ dày và tiêu chảy (rất hiếm). Hiếm gặp phản ứng dị ứng.

## QUÁ LIỀU

Chưa xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng nào vì thuốc này an toàn và được dung nạp tốt.

## BẢO QUẢN

Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ẩm, nhiệt độ không quá 30°C.

## HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

## ĐÓNG GÓI

Ví 10 viên. Hộp 6 ví.

Ví 10 viên. Hộp 10 ví.

Chai 100 viên. Hộp 1 chai.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

**Để xa tầm tay trẻ em**

**Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ**

**Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**



**CTY TNHH LD STADA-VN**

40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore,  
Thuận An, Bình Dương, VN.

ĐT: (84).650.3767470 - Fax: (84).650.3767469

C230211