



CAFUNTEN

Kem bôi da

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Mỗi gam kem có chứa:

Clotrimazol 10 mg

Chứa được: Cetostearyl Alcohol, Cetomacrogol emulsifying wax, Vaseline, dầu Parafin, Glycerin, Propylene glycol, Methylparaben, Propylparaben, Nước cất vừa đủ 1g

CHỈ ĐỊNH: Điều trị tại chỗ các bệnh nấm như: bệnh nấm da, bệnh nấm Candida ngoài da, nấm kẽ ngón tay, kẽ chân, cũng như bệnh nấm Candida ở âm hộ, âm đạo, lang ben do Malassezia furfur, viêm móng và quanh móng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Không dùng clotrimazol cho điều trị nhiễm nấm toàn thân.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

- Bôi nhẹ một lượng thuốc vừa đủ lên vùng da bị bệnh, 2 lần /ngày. Nếu bệnh không đỡ sau 4 tuần điều trị, cần phải xem lại chẩn đoán. Bệnh thường đỡ trong vòng 1 tuần. Có khi phải điều trị đến 8 tuần.
- Điều trị nấm âm đạo: dùng 5 g/ lần/ ngày trong 7 - 14 ngày.

THẬN TRỌNG:

- Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng clotrimazol, phải ngừng thuốc và điều trị thích hợp.
- Phải điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm. Sau 4 tuần điều trị, nếu không đỡ cần khám lại.
- Báo với thầy thuốc nếu có biểu hiện tăng kích ứng ở vùng bôi thuốc (đỏ, ngứa, bóng, mụn nước, sưng), dấu hiệu của sự quá mẫn.
- Tránh các nguồn gây nhiễm khuẩn hoặc tái nhiễm.
- Chỉ bôi ngoài da, không nên để thuốc tiếp xúc với mắt.

THỜI KỲ MANG THAI: Chưa có đủ các số liệu nghiên cứu trên người mang thai trong 3 tháng đầu. Thuốc này chỉ được dùng cho người mang thai trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ.

THỜI KỲ CHO CON BÚ: Vẫn chưa biết liệu thuốc có bài tiết qua sữa không, thận trọng khi dùng cho người cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Do thuốc dạng kem bôi da, Clotrimazol rất ít được hấp thu mà chủ yếu có tác dụng tại chỗ. Vì vậy thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có thông báo về tác dụng hiệp đồng hay đối kháng giữa clotrimazol và nystatin, amphotericin B hay fluocytosin với các loài C. albicans.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Các phản ứng tại chỗ bao gồm bóng nhẹ, kích ứng, viêm da dị ứng do tiếp xúc, đau rát vùng bôi thuốc ở da hoặc âm đạo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:

***Dược lực học:** Clotrimazol là thuốc chống nấm phổ rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên Trichomonas, Staphylococcus và Bacteroides. Không có tác dụng với Lactobacilli.

Cơ chế tác dụng của clotrimazol là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tính thấm của màng, gây mất các chất thiết yếu nội bào dẫn đến tiêu hủy tế bào nấm. In vitro, clotrimazol có tác dụng kìm hãm và diệt nấm, tùy theo nồng độ, với các chủng Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis và các loài Candida. Kháng tự nhiên với clotrimazol hiếm gặp. Chỉ phân lập được một chủng Candida guilliermondii kháng clotrimazol. Kháng chéo giữa các azol là phổ biến.

*Dược động học:

Dùng thuốc bôi lên da hoặc đấm đường âm đạo, Clotrimazol rất ít được hấp thu. 6 giờ sau khi bôi kem 1% clotrimazol trên da nguyên vẹn và trên da bị viêm cấp, nồng độ clotrimazol thay đổi từ 100 microgam/cm² trong lớp sừng đến 0,5-1 microgam/cm² trong lớp gai và 0,1 microgam/cm² trong lớp mô dưới da.

Sau khi dùng 5 g kem clotrimazol 1% ở âm đạo, nồng độ đỉnh huyết thanh trung bình đạt xấp xỉ 0,01 microgam/ml sau 8-24 giờ

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Vì thuốc được sử dụng để bôi ngoài da nên ít xảy ra khả năng quá liều. Nên ngừng sử dụng khi có các biểu hiện kích ứng vùng bôi thuốc.

LỜI KHUYẾN CÁO:

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Tuýp 5g, 10g, 20g, hộp 1 tuýp.

HẠN DÙNG: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá 30 ngày kể từ khi mở nắp tuýp thuốc