

Hộp 50 gói x 3,7 g thuốc bột

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
Lần đầu: 18/01/2013




**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g




THUỐC BỘT

**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g



THUỐC BỘT

**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g



**THÀNH PHẦN:** Diosmectit ..... 3g  
Tá dược v.d ..... 1 gói

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản – dạ dày – tá tràng và đại tràng.

Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

**LIỀU DÙNG**

Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều trước khi uống.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác

Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.

Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.

Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.

Người lớn: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC  
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**Để xa tầm tay của trẻ em  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

TC áp dụng: TCCS  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :



**Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An





Hộp 30 gói x 3,7 g thuốc bột



# DIOSMECTIT

Diosmectit 3g

THUỐC BỘT

# DIOSMECTIT

Diosmectit 3g



THUỐC BỘT

# DIOSMECTIT

Diosmectit 3g



**THÀNH PHẦN:** Diosmectit ..... 3g  
Tà được v.đ ..... 1 gói

**CHỈ ĐỊNH**  
Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản – dạ dày – tá tràng và đại tràng.  
Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

**LIỀU DÙNG**  
Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều trước khi uống.  
Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.  
Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác  
Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.  
Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.  
Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.  
Người lớn: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với thành phần của thuốc.  
Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**Để xa tầm tay của trẻ em**  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Vacopharm**  
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An



Hộp 20 gói x 3,7 g thuốc bột



Diosmectit 3g  
**DIOSMECTIT**



THUỐC BỘT

**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g



THUỐC BỘT

**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g



**THÀNH PHẦN:** Diosmectit..... 3g  
Tá dược v.đ..... 1 gói

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản – dạ dày – tá tràng và đại tràng.

Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

**LIỀU DÙNG**

Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều trước khi uống.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác

Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.

Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.

Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.

Người lớn: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**Để xa tầm tay của trẻ em**  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS

SBK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :



**Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An






Hộp 10 gói x 3,7 g thuốc bột



**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g



**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g



**THÀNH PHẦN:** Diosmectit ..... 3g  
Tá dược v.đ ..... 1 gói

**CHỈ ĐỊNH**  
Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản – dạ dày – tá tràng và đại tràng.  
Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

**LIỀU DÙNG**  
Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều trước khi uống.  
Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.  
Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác  
Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.  
Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.  
Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.  
Người lớn: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**  
Mẫn cảm với thành phần của thuốc.  
Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



**DIOSMECTIT**  
Diosmectit 3g



**Để xa tầm tay của trẻ em**  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

TC áp dụng: TCCS  
SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**Vacopharm**  
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM  
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất  
Nhãn gói



S.Đ.K. (V.D): 1100112319 - G.T.C.P.  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 DƯỢC  
 VACOPHARM  
 TP. TÂN AN - T. LONG AN

**Cty Cổ phần Dược VACOPHARM**  
 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An  
 ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,  
 Phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

TC áp dụng: TCCS  
 S&K  
 Số lô SX  
 Ngày SX  
 HD

em.  
 Không dùng chũa tiêu chảy cấp mắt nước và điện giải nặng cho trẻ

**CHÔNG CHỈ DINH:** Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

dầu có thể tăng gấp đôi.

Người lớn: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp tình, liều khởi

Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.

Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.

Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

đều trước khi uống.

**LIỀU DÙNG:** Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy

con tiêu chảy kéo dài.

Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bôi phụ đủ nước và điện giải mà

trắng và đại tràng.

**CHỈ DINH:** Biếu trị tiêu chđng đau của viêm thực quản - dạ dày - tá

Tà được v.d ..... 1 gói  
 3g





## Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

### THUỐC BỘT DIOSMECTIT

#### Thành phần

Diosmectit 3g  
Tá dược v.đ 1 gói

(Glucose monohydrat, natri saccharin, vanilin)

*llh*

**Quy cách đóng gói:** Ép gói, vào hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

#### Dược lực học

Diosmectite là silicat nhôm và magnesi tự nhiên, có cấu trúc từng lớp lá mỏng xếp song song với nhau và có độ quán đẻo cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ niêm mạc đường tiêu hóa.

Diosmectite tương tác với glycoprotein của niêm dịch bao phủ đường tiêu hóa nên làm tăng tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc đường tiêu hóa khi bị các tác nhân lạ xâm hại.

Thuốc có khả năng bám dính và hấp phụ cao tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc tiêu hóa.

Thuốc có khả năng gắn vào độc tố vi khuẩn ruột, do đó làm giảm triệu chứng bệnh tiêu chảy, viêm thực quản-dạ dày-tá tràng và đại tràng; nhưng đồng thời cũng có khả năng gắn vào các thuốc khác, làm chậm hấp thu hoặc làm mất tác dụng, đặc biệt tetracyclin và trimethoprim.

#### Dược động học

Diosmectite không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa và bị thải trừ hoàn toàn theo phân.

#### Chỉ định

Điều trị triệu chứng đau của viêm thực quản – dạ dày – tá tràng và đại tràng.

Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bồi phụ đủ nước và điện giải mà còn tiêu chảy kéo dài.

#### Liều dùng

Hòa thuốc vào khoảng 50 ml nước ấm, lắc hoặc khuấy đều trước khi uống.

Uống sau bữa ăn với người bệnh viêm thực quản.

Uống xa bữa ăn với các chỉ định khác

Trẻ em: Dưới 1 tuổi: ngày 1 gói, chia 2-3 lần.

Từ 1-2 tuổi: ngày 1-2 gói, chia 2-3 lần.

Trên 2 tuổi: ngày 2-3 gói, chia 2-3 lần.

Người lớn: 1 gói/lần, ngày 3 lần. Trong tiêu chảy cấp tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

#### Chống chỉ định

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

Không dùng chữa tiêu chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em.

#### Thận trọng

Khi có sốt, không dùng Diosmectite quá 2 ngày.

Nếu tiêu chảy mất nước cần bù nước kết hợp dùng thuốc bằng đường uống hoặc tiêm truyền dịch tĩnh mạch, số lượng nước cần bù tùy theo mức độ bị tiêu chảy, tuổi tác và cơ địa người bệnh.



Cần thận trọng khi dùng Diosmectite để điều trị tiêu chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn tiếp tục trong tiêu chảy cấp.

#### **Tác dụng phụ**

Táo bón (nhưng rất hiếm), trong trường hợp này điều trị vẫn tiếp tục với liều lượng giảm.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**Phụ nữ có thai và cho con bú:** dùng được

**Người lái xe và vận hành máy móc:** thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

#### **Tương tác thuốc**

Diosmectite có thể hấp phụ một số thuốc khác, do đó có thể ảnh hưởng đến thời gian và tỷ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống Diosmectite khoảng 2-3 giờ.

#### **Sử dụng quá liều**

Dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc tiêu chảy. Cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

#### **Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng**

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C.
- TC áp dụng: TCCS.

**Để xa tầm tay trẻ em.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ**

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM**

**59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**

**Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311**

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,**

**Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.**

Long An, ngày 25 tháng 05 năm 2011

KT. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG

*Nguyễn Văn Loanh*



KS. Phan Thị Minh Thu