

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN
HỒ SƠ THÔNG TIN THUỐC

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc **QC 22/2017/PN-BYT**

Của: **Công ty cổ phần dược Pha Nam**

Địa chỉ: **Số 436 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **0862651638**

Đăng ký thông tin thuốc: **Trimafort**

Hình thức thông tin thuốc: **Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế**

Số giấy tiếp nhận: **0214/17/QLD-TT**

Ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: **19/07/2017**

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt





Thuốc dạ dày Trimafort

Sản xuất bởi

DAEWOONG
PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Thuốc dạ dày
Trimafort
Thành phần
Chỉ định
Chống chỉ định
Liều dùng
Tác dụng phụ
Lưu ý
Bảo quản
Hạn sử dụng
Số lượng
Số lô



Thuốc dạ dày Trimafort

GIẢM CƠN ĐAU DẠ DÀY



Điều trị các triệu chứng:
Tăng tiết axit dịch vị, ợ nóng,
đầy hơi, ợ hơi, buồn nôn,
ợ mửa, đau dạ dày



Thuốc dạ dày Trimafort

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gói uống số 3 Trimafort với 3 thành phần mang lại hiệu quả cao

- $Mg(OH)_2$ phối hợp với $Al(OH)_3$ nên Trimafort hiệu quả cho đường tiêu hóa - không gây táo bón hoặc tiêu chảy
- Simethicon có tác dụng phá bọt nên chống đầy hơi rất hiệu quả

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói Trimafort 10ml chứa:

Nhôm hydroxyd gel.....	3030,3mg
(tương đương 400mg Al_2O_3)	
Magnesi Hydroxyd.....	800mg
Nhũ dịch Simethicon 30%.....	266,7mg
(tương đương 80mg Semethicon)	

CHỈ ĐỊNH:

Tăng tiết acid dịch vị: chướng bụng, đầy hơi, ợ chua, khó tiêu, buồn nôn, ói mửa
Đau dạ dày, nóng rát, khó chịu ở dạ dày ruột
Viêm loét dạ dày, tá tràng cấp và mạn tính

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:

Người lớn: 1gói/lần x 3 lần/ngày. Không dùng quá 6 gói mỗi ngày
Trẻ em: Theo sự chỉ dẫn của BS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

THẬN TRỌNG:

Bệnh nhân suy giảm chức năng thận, phụ nữ có thai và cho con bú
Tránh dùng các thuốc có chứa nhôm lâu ngày do làm giảm lượng phosphat trong máu

TÁC DỤNG PHỤ: Ít gặp (táo bón, tiêu chảy, buồn nôn)

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không dùng chung với Norfloxacin và Ciprofloxacin vì gây sỏi niệu và độc tính trên thận
Không dùng chung với mecalmylamin, methenamin, sodium polystyren sulfonat resin, muối sắt, thuốc kháng H2, tetracylin, fluoroquinolon, ketoconazol, các thuốc dạng viên bao tan ở ruột. Dùng cách xa các thuốc này 1-2 giờ

Sản xuất bởi:

 **DAEWOONG**
PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea



Phân Phối bởi : Công Ty Cổ Phần Dược Pha Nam
Số 436 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh



Hỗn dịch uống

Trimafort

[THÀNH PHẦN] Mỗi gói (10mL) có chứa:

Gel Nhôm hydroxyd	3030,3mg
(612mg Al(OH) ₃ , 400mg Al ₂ O ₃)	
Magnesi hydroxyd	800,4mg
Nhũ dịch simethicon 30%	266,7mg
(80mg Simethicon)	

Tá dược: Hypromellose 2208, Carrageenan, Microcrystalline cellulose & Carboxymethylcellulose Sodium, Potassium citrate, dung dịch D-Sorbitol (70%), Chlorhexidin acetat, Steviosid, Kem menthol nhân tạo, Mùi chanh nhân tạo, nước tinh khiết

[MÔ TẢ] Hỗn dịch uống màu trắng mùi chanh, vị bạc hà

[CHỈ ĐỊNH] Tăng tiết acid dịch vị, ợ nóng, khó chịu ở dạ dày ruột, đầy hơi, buồn nôn, ói mửa, đau dạ dày, ợ hơi.

[LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG]

Người lớn: Uống 1 gói (10ml) / lần, uống 3 lần mỗi ngày, giữa các bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ.
Trẻ em: theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

[CHỐNG CHỈ ĐỊNH]

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
Bệnh nhân suy thận nặng

[THẬN TRỌNG]

Thận trọng chung:

- Tuân theo chỉ định liều dùng và cách dùng.
- Nếu các triệu chứng không được cải thiện sau 2 tuần điều trị, ngưng dùng thuốc và tham vấn ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- Không uống quá 60mL mỗi ngày mà không có ý kiến của bác sĩ.

Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân rối loạn chức năng thận
- Bệnh nhân đang dùng thuốc khác.

[PHỤ NỮ CÓ THAI, PHỤ NỮ CHO CON BÚ]

Không dùng thuốc này cho phụ nữ 3 tháng đầu thai kỳ.

[TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC]

- Dùng chung với Tetracyclin phải cách xa nhau 2-3 giờ
- Không dùng đồng thời với Flouroquinolon do thuốc sẽ làm giảm độ hấp thu của Flouroquinolon. Sử dụng chung với Norfloxacin hoặc Ciprofloxacin bệnh nhân sẽ có dấu hiệu sỏi niệu và độc tính trên thận.
- Dùng chung với Ketoconazol phải cách xa 3 giờ.
- Không dùng thuốc chung với mecamlamin, methenamin, sodium polystyren sulfonat resin

[TÁC DỤNG NGOẠI Ý]

Tiêu chảy, táo bón do thuốc hiếm khi xảy ra
* Thông báo cho bác sĩ bất kỳ tác dụng ngoại ý nào xảy ra do dùng thuốc này

[ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC]

- Trimafort là công thức chứa thuốc kháng acid dịch vị và simethicon . Nhôm hydroxyd là thuốc kháng acid tác động chậm, trong khi magnesi hydroxyd là thuốc kháng acid tác động nhanh.

- Muối magnesi kháng acid còn có tác dụng nhuận tràng nên thường được phối hợp với muối nhôm kháng acid để giảm tác dụng gây táo bón của muối nhôm.

- Simethicon là chất phá bọt, phá vỡ các bóng hơi trong dạ dày, giúp hơi dễ thoát ra ngoài, giảm đầy bụng, khó chịu ở dạ dày.

[ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG]

- Nhôm hydroxyd tan chậm trong dạ dày và phản ứng với acid hydrochloric trong dạ dày tạo thành nhôm chlorid và nước. Khoảng 17-30% nhôm chlorid tạo thành được hấp thu qua đường tiêu hóa và thải trừ nhanh qua thận ở người có chức năng thận bình thường. Nhôm hydroxyd không hấp thu sẽ liên kết với phosphat ở ruột tạo muối nhôm phosphat không tan và một số tạo nên muối carbonat, muối acid béo, tất cả các muối này được thải qua phân.

- Magnesi hydroxyd phản ứng với acid hydrochloric trong dạ dày tạo thành magnesi chlorid và nước . Khoảng 15-30% lượng magnesi chlorid vừa tạo ra được hấp thu và sau đó được thải trừ qua nước tiểu ở người có chức năng thận bình thường. Còn lượng magnesi hydroxyd nào chưa chuyển hóa thành magnesi chlorid thì có thể được chuyển hóa ở ruột non và được hấp thu không đáng kể.

[QUÁ LIỀU]

Trong trường hợp dùng quá liều cần lập tức đến ngay bác sĩ hoặc trung tâm cấp cứu gần nhất ngay cả khi chưa có triệu chứng nào.

Triệu chứng: Người bình thường chỉ có biểu hiện tiêu chảy. Bệnh nhân thiếu năng thượng thận sẽ có triệu chứng ngộ độc magnesi với những biểu hiện như: khô miệng, ngủ gà, thần thờ và suy hô hấp.

Điều trị: Rửa dạ dày và dùng các loại thuốc tẩy xổ ngoại trừ thuốc xổ có chứa magnesi.

[ĐÓNG GÓI] Hộp 20 gói x 10ml

[BẢO QUẢN] Bảo quản nơi khô mát ở nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng

[HẠN DÙNG] 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

[TIÊU CHUẨN] Tiêu chuẩn nhà sản xuất

“Tránh xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”



Nhà sản xuất :

DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

35-14 Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup,
Hwaseong-Si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc