

CARBOPHOS 400mg, viên nén nhai THAN THỰC VẬT

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

- Giữ lại tờ hướng dẫn này. Bạn có thể cần đọc lại nó.
- Nhờ dược sĩ tư vấn nếu bạn cần thêm thông tin hoặc lời khuyên.
- Bạn phải đến gặp bác sĩ nếu các triệu chứng của bạn không tiến triển tốt hoặc trở nên tệ hơn.
- Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào không được đề cập đến trong tờ hướng dẫn sử dụng này hoặc các tác dụng phụ trở nên nghiêm trọng, hãy báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Nội dung Tờ hướng dẫn :

1. VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400 MG LÀ GÌ VÀ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ?
2. CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI DÙNG VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400MG ?
3. CÁCH DÙNG VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400 MG ?
4. CÁC TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ XẢY RA ?
5. CÁCH BẢO QUẢN VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400 MG ?
6. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400MG LÀ GÌ VÀ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ?

CHẤT HẤP PHỤ ĐƯỜNG RUỘT (A: bộ máy tiêu hóa và quá trình chuyển hóa)

Thuốc này được chỉ định cho người lớn để điều trị các triệu chứng khó tiêu đặc biệt là đầy hơi đường ruột.

2. CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI DÙNG VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400MG?

Nếu bác sĩ đã từng thông báo bạn không dung nạp một số loại đường, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc này.

• Trường hợp không dùng viên nén nhai CARBOPHOS 400 mg

Không sử dụng thuốc này khi dị ứng với một trong số các thành phần của thuốc.

TRONG TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ, NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỜ BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TƯ VẤN.

Các lưu ý đặc biệt khi dùng viên nén nhai CARBOPHOS 400 mg

Khuyến cáo đặc biệt

• Trong trường hợp đầy bụng, đầy hơi, tránh ăn các loại rau quả khô (đậu lăng, đậu Hà lan..), một số loại rau xanh (bắp cải, cải Bruxen, củ cải...).

• Trường hợp có kèm tiêu chảy, cần phải:

- Tự bù nước và điện giải với nhiều loại thức uống, chứa muối hoặc đường, để bổ sung lại lượng nước đã mất do tiêu chảy (lượng nước trung bình một ngày cần cho người trưởng thành là 2 lít)

- Trong khi tiêu chảy, hạn chế ăn một số thức ăn, rau quả đặc biệt hoặc các món cay, đồ ăn thức uống lạnh, chủ yếu ăn thịt nướng, cơm.

• Trong trường hợp tiểu đường hoặc đang ăn kiêng với chế độ ít đường, hãy tính thêm 0,5g sucrose trong mỗi viên nén nhai.

• Bệnh nhân mắc các bệnh di truyền hiếm gặp như không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose - galactose hay thiếu hụt men sucrase - isomaltase không nên dùng thuốc này.

• Dùng chung với các thuốc khác

Thuốc này có thể làm giảm hấp thu một số thuốc khác, do đó nên dùng cách xa nhau (ít nhất 2 giờ).

ĐỂ TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC CÓ HẠI CÓ THỂ XẢY RA VỚI MỘT SỐ THUỐC, BẠN NÊN CHỦ ĐỘNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NẾU ĐANG TIẾP NHẬN MỘT LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ KHÁC.

Phụ nữ có thai và cho con bú

• Phụ nữ có thai

Thuốc này chỉ được dùng trong thai kỳ khi được bác sĩ chỉ định. Nếu bạn phát hiện mình đang mang thai khi đang điều trị, nhờ bác sĩ tư vấn để biết nên tiếp tục không.

• Phụ nữ cho con bú

Có thể dùng thuốc này trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ.

THÔNG THƯỜNG, TRONG THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ, TỐT NHẤT NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI DÙNG BẤT CỨ THUỐC NÀO.

Thông tin quan trọng về một số thành phần trong viên nén nhai CARBOPHOS 400mg

Đường (saccharose): 0,5 g / viên nén nhai.

3. CÁCH DÙNG VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400MG

Liều dùng

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

Nhai 1-2 viên nén nhai và nuốt với nước, dùng sau bữa ăn hoặc khi đau.

Cách dùng

Dùng đường uống

Nếu bạn dùng nhiều viên nén nhai CARBOPHOS 400mg có thể bị táo bón.

Nếu bạn có thắc mắc khác về cách sử dụng thuốc này, hãy nhờ bác sĩ hoặc dược sĩ tư vấn.

4. TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ XẢY RA

THUỐC NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN MỘT SỐ TÁC DỤNG PHỤ (ÍT HOẶC NHIỀU) Ở MỘT SỐ NGƯỜI, đáng lưu ý nhất là làm phân sậm màu. Trong trường hợp điều trị kéo dài và dùng liều cao, có nguy cơ làm tăng nồng độ calcium trong máu và thiếu hụt ở thận.

Trường hợp quá liều: Nếu bạn dùng nhiều viên nén nhai CARBOPHOS 400mg có thể bị táo bón.

Trường hợp ngừng sử dụng thuốc: Không có ảnh hưởng bất lợi nào buộc bệnh nhân ngừng sử dụng thuốc.

BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ NẾU CÓ BẤT CỨ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN NÀO XẢY RAKHI SỬ DỤNG THUỐC.

5. BẢO QUẢN VIÊN NÉN NHAİ CARBOPHOS 400MG

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm.

Để xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.

Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không được dùng khi quá hạn sử dụng in trên bao bì.

Bất cứ sản phẩm hay nguyên vật liệu nào không còn sử dụng cần phải xử lý theo yêu cầu của địa phương. Thuốc không được bỏ qua đường nước thải hoặc rác sinh hoạt. Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ cách xử lý thuốc không còn dùng nữa. Các biện pháp này giúp bảo vệ môi trường.

6. CÁC THÔNG TIN KHÁC

Thành phần của viên nén nhai CARBOPHOS 400 mg

Hoạt chất:

Than thực vật400mg
trong 1 viên nén nhai.

Tá dược : Saccharose, calcium carbonate, bột hương cam thảo tự nhiên, Calcium phosphate trung tính, polyvidone, magnesium stearate.

1 viên nén nhai chứa 0,5g saccharose và 118mg calcium.

Hình thức đóng gói viên nén nhai CARBOPHOS 400mg

Viên nén nhai. Ống 20 viên. Hộp 2 ống.

Chủ sở hữu và khai thác:

LABORATOIRE TRADIPHAR

176, rue de l'arbrisseau – 59000 Lille –
France

Nhà sản xuất:

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
RODAEL

1, route de Socx – Zac du Bierendyck –
59380 Bierne - France

Tờ hướng dẫn này được phê duyệt lần cuối vào 5/2011.

Thông tin chi tiết về thuốc này hiện có trên trang web của ANSM (Pháp).