

NEW DIATABS Viên nén  
Hộp 25 vỉ x 4 viên

BXVIE0484100FL02

Số lô SX/ Lot #:   
NSX/ Mfg   
HD/ Exp

# New DIATABS®

Attapulgite 600 mg  
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy

Hộp 25 v

Box of 25 strips x 4 tablets

# DIATABS®

Attapulgite 600 mg  
Adjunct to diarrhea treatment



VIETNAM, INC. GSP  
WHO-GMP, GLP, GSP  
Chanh, HCMC, Vietnam  
emark of United Laboratories, Inc.

## New DIATABS®

Attapulgite 600 mg  
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén




## New DIATABS®

**COMPOSITION**  
Each tablet contains:  
Activated Attapulgite

**INDICATIONS**  
For symptomatic treatment of acute and chronic diarrhea in nonspecific bowel diseases.  
Irritable bowel syndrome.

Dosage, contraindications and other information refer to the package insert.

Store at temperatures not exceeding 30°C.



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
READ THE PACKAGE INSERT  
CAREFULLY BEFORE USE

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén

# New DIATABS®

Attapulgite 600 mg  
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy



Sản xuất tại  
CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA VIỆT NAM  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Áp 2, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: 08-38100800  
Đăng ký nhãn hiệu: United Laboratories, Inc.

## New DIATABS®

**THÀNH PHẦN**  
Mỗi viên chứa:  
Attapulgite hoạt hóa .....600 mg

**CHỈ ĐỊNH**  
· Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp và mạn tính trong các bệnh đại tràng không đặc hiệu.  
· Hội chứng kích thích ruột.

Liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác, xin xem toa hướng dẫn sử dụng.  
Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XAM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG





**NEW DIATABS Viên nén**  
Hộp 125 vỉ x 4 viên

New  
**DIATABS®**  
Attapulgite 600 mg  
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy  
Hộp 125 vỉ x 4 viên nén



New  
**DIATABS®**

**COMPOSITION**  
Each tablet contains:  
Activated Attapulgite ..... 600 mg

**INDICATIONS**  
For symptomatic treatment of acute and chronic diarrhea in nonspecific bowel diseases.  
Irritable bowel syndrome.

Dosage, contraindications and other information, please refer to the package insert.  
Store at temperatures not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**READ THE PACKAGE INSERT**  
**CAREFULLY BEFORE USE**



New  
**DIATABS®**  
Attapulgite 600 mg  
Adjunct to diarrhea treatment

Box of 125 strips x 4 tablets

Manufactured by  
UNITED PHARMA VIETNAM, INC.  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Commune 2, Binh Chanh, HCMC, Vietnam  
TEL: 08-387100800  
®Registered trademark of United Laboratories, Inc.







New


# DIATABS®

Attapulgite 600 mg

Hỗ trợ điều trị tiêu chảy

Hộp 125 vỉ x 4 viên nén  
Thuốc dùng cho bệnh viện

Sản xuất tại  
CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA VIỆT NAM  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Áp 2, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: 08-38100800  
®Đăng ký nhãn hiệu: United Laboratories, Inc.



# New DIATABS®



THÀNH PHẦN

Mỗi viên chứa:  
Attapulgite hoạt hóa .....600 mg

**CHỈ ĐỊNH**

Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp và mạn tính trong các bệnh đại tràng không đặc hiệu.  
Hội chứng kích thích ruột.


Liều dùng, chống chỉ định và các thông tin khác, xin xem toa hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

SDK:


DIATAID  
Vào với giá 916 916 916  
Số 123 4 5 6 7 8 9 10





# NEW DIATABS Viên nén Hộp 4 vỉ x 4 viên

Box 16 tablets  
Size: 80 x 76 x 28 mm



# NEW DIATABS Viên nén Bìa kẹp

**DIATABS<sup>®</sup>**  
New  
Attapulgitte 600 mg  
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy

**DIATABS<sup>®</sup>**  
New  
Attapulgitte 600 mg  
Adjunct to diarrhea treatment

4 viên nén

4 tablets

Manufactured by  
UNITED PHARMA VIETNAM, INC.  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Commune 2, Binh Chanh, HCMC, Vietnam  
TEL: 08-38100800  
©Registered trademark of United Laboratories, Inc.

**THÀNH PHẦN**  
Mỗi viên chứa:  
Attapulgitte hoạt hóa ..... 600 mg

**CHỈ ĐỊNH**  
- Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp và mạn tính trong các bệnh đại tràng không đặc hiệu.  
- Hội chứng kích thích ruột.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**  
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: uống 2 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 14 viên trong 24 giờ.  
- Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: uống 1 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 7 viên trong 24 giờ.  
- Trẻ em từ 3 đến dưới 6 tuổi: uống ½ viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 3 viên rưỡi trong 24 giờ.  
- Trẻ em dưới 3 tuổi: theo liều chỉ định của bác sĩ.

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.  
**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

SDK:

**COMPOSITION**  
Each tablet contains:  
Activated Attapulgitte ..... 600 mg

**INDICATIONS**  
- For symptomatic treatment of acute and chronic diarrhea in nonspecific bowel diseases.  
- Irritable bowel syndrome.

**DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE**  
- Adults and Children 12 years old and over: administer orally 2 tablets after every bowel movement. Not to exceed 14 tablets in 24 hours.  
- Children 6 to below 12 years old: administer orally 1 tablet after every bowel movement. Not to exceed 7 tablets in 24 hours.  
- Children 3 to below 6 years old: administer orally ½ tablet after every bowel movement. Not to exceed 3 and a half tablets in 24 hours.  
- Children up to 3 years old: Use and dose must be directed by a doctor.

Store at temperatures not exceeding 30°C.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE**


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
BENEDECTO VIETNAM  
GENERAL PHARMA  
VIETNAM  
H. PH. BÌNH CHÁNH-TP. HỒ CHÍ MINH

CCVIE0484000FL02



# NEW DIATABS Viên nén Foil

146 mm



Tất cả thông tin về số lô, hạn dùng sẽ được in phun hoặc dập nổi trong quá trình sản xuất theo thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc số 04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2008

New  
**DIATABS®**  
Attapulgit 600 mg  
Viên nén  
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy

- GIẢM số lần đi tiêu
- CẢI THIỆN độ đặc của phân
- GIẢM chứng đau bụng khi tiêu chảy

**THÀNH PHẦN**

Mỗi viên chứa:  
Attapulgit hoạt hóa ..... 600 mg  
**Tá dược:** Tinh bột tiến gelatin hóa, tinh bột, Magnesium Stearate.

**MÔ TẢ**

New Diatabs chứa attapulgit hoạt hóa có khả năng hấp phụ hiệu quả để thải trừ độc tố, vi khuẩn và virus đường ruột gây tiêu chảy và các nhiễm trùng đường tiêu hóa khác.

New Diatabs hấp thu nước của dịch tiết trong quá trình viêm làm cải thiện độ đặc của phân. Mặt khác, New Diatabs bao phủ và bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa khi bị viêm.

**CHỈ ĐỊNH**

- Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp và mạn tính trong các bệnh đại tràng không đặc hiệu.
- Hội chứng kích thích ruột.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: uống 2 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 14 viên trong 24 giờ.
- Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: uống 1 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 7 viên trong 24 giờ.
- Trẻ em từ 3 đến dưới 6 tuổi: uống ½ viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 3 viên rưỡi trong 24 giờ.
- Trẻ em dưới 3 tuổi: theo liều chỉ định của bác sĩ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Quá mẫn với attapulgit.  
Attapulgit không được dùng trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em.  
Không nên sử dụng thuốc cho những bệnh nhân có thương tổn hẹp ở đường tiêu hóa.

**THẬN TRỌNG**

- Chỉ dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi khi có chỉ dẫn của bác sĩ.

- Không nên sử dụng thuốc khi có sốt cao, trong phân có nhầy hoặc máu trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
- Nếu triệu chứng vẫn còn sau 2 ngày điều trị, xin tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Phải đồng thời bổ sung nước và chất điện giải ở những bệnh nhân bị tiêu chảy kèm mất nước.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Attapulgit thường được coi là an toàn.

**TÁC DỤNG PHỤ**

Attapulgit có thể gây táo bón – thường nhẹ và thoáng qua.  
Nhôm được hấp thu vào cơ thể có thể gây thiếu hụt phosphor khi dùng kéo dài hoặc liều cao.  
Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ**

Trong trường hợp quá liều, nên ngưng dùng attapulgit ngay và rửa dạ dày.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Khi dùng các dạng thuốc uống cùng lúc với attapulgit có thể làm giảm hấp thu các thuốc này dẫn đến giảm hiệu quả điều trị. Vì vậy, attapulgit nên được dùng ít nhất 2 đến 3 giờ trước hoặc sau khi uống các thuốc khác.

**TRÌNH BÀY**

Hộp 25 vỉ x 4 viên nén.

**BẢO QUẢN**

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

**HẠN DÙNG**

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất tại  
CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA VIỆT NAM  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Ấp 2, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: 08-38100800  
®Đăng ký nhãn hiệu: United Laboratories, Inc.





New  
**DIATABS**<sup>®</sup>  
Attapulgite 800 mg  
Tablet  
Adjunct to diarrhea treatment

- REDUCES frequency of bowel movement
- IMPROVES consistency of loose or watery stools
- RELIEVES cramps due to diarrhea

**COMPOSITION**

Each tablet contains:

Activated Attapulgite .....600 mg

**Excipients:** Pregelatinized Starch, Starch, Magnesium Stearate.

**DESCRIPTIONS**

New Diatabs activated attapulgite exerts highly effective adsorptive property to eliminate toxins, bacteria and enteroviruses that cause diarrhea and other gastrointestinal infections.

New Diatabs absorbs watery part of inflammatory secretions to help improve consistency of stools. In addition, New Diatabs coats and protects the inflamed mucous membrane of the intestinal tract.

**INDICATIONS**

- For symptomatic treatment of acute and chronic diarrhea in nonspecific bowel diseases.
- Irritable bowel syndrome.

**DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE**

- Adults and Children 12 years old and over: administer orally 2 tablets after every bowel movement. Not to exceed 14 tablets in 24 hours.
- Children 6 to below 12 years old: administer orally 1 tablet after every bowel movement. Not to exceed 7 tablets in 24 hours.
- Children 3 to below 6 years old: administer orally ½ tablet after every bowel movement. Not to exceed 3 and a half tablets in 24 hours.
- Children up to 3 years old: Use and dose must be directed by a doctor.

**CONTRAINDICATIONS**

Hypersensitive to attapulgite.  
In children with acute diarrhea, use is not recommended.  
Patients with stenotic lesions in the gastrointestinal tract.

**PRECAUTIONS**

- Use of the drug for children under 6 years of age only when directed by a doctor.

- Attapulgite should not be used for patients with high fever, mucous or bloody stools unless directed by a doctor.
- If symptoms persist after 2 days, consult a doctor.
- Sufficient rehydration and electrolytes must be supplemented concomitantly for diarrheal patients with dehydration (fluid loss).

**PREGNANCY AND LACTATION**

Attapulgite is considered safe.

**SIDE-EFFECTS**

Attapulgite may cause constipation – usually mild and transient. Using attapulgite in a long time or with high dose can cause phosphor insufficiency because of increasing aluminium absorption of the body. Please inform your doctor of all undesirable effects upon drug administration.

**OVERDOSE AND TREATMENT**

In the event of overdose, attapulgite should be discontinued and the stomach should be emptied by gastric lavage.

**DRUG INTERACTIONS**

Concurrent use of oral medications with attapulgite may impair absorption of these medications resulting in decreased therapeutic effectiveness. It is recommended that attapulgite be administered at least 2 to 3 hours before or after other oral medications.

**PRESENTATION**

Box of 25 strips x 4 tablets.

**STORAGE**

Store at temperatures not exceeding 30°C.

**SHELF-LIFE**

36 months from manufacturing date.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE  
FOR MORE INFORMATION, PLEASE ASK FOR DOCTOR'S ADVICE**

Manufactured by  
UNITED PHARMA VIETNAM, INC.  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Commune 2, Binh Chanh, HCMC, Vietnam  
Tel: 08-38100800  
®Registered trademark of United Laboratories, Inc.



NVIE0484000FL02



New  
**DIATABS®**  
Attapulgite 600 mg  
Viên nén  
Hỗ trợ điều trị tiêu chảy

- GIẢM số lần đi tiêu
- CẢI THIỆN độ đặc của phân
- GIẢM chứng đau bụng khi tiêu chảy

**THÀNH PHẦN**

Mỗi viên chứa:

Attapulgite hoạt hóa ..... 600 mg

**Tá dược:** Tinh bột tiến gelatin hóa, tinh bột, Magnesium Stearate.

**MÔ TẢ**

New Diatabs chứa attapulgite hoạt hóa có khả năng hấp phụ hiệu quả để thải trừ độc tố, vi khuẩn và virus đường ruột gây tiêu chảy và các nhiễm trùng đường tiêu hóa khác.

New Diatabs hấp thu nước của dịch tiết trong quá trình viêm làm cải thiện độ đặc của phân. Mặt khác, New Diatabs bao phủ và bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa khi bị viêm.

**CHỈ ĐỊNH**

- Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp và mạn tính trong các bệnh đại tràng không đặc hiệu.
- Hội chứng kích thích ruột.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: uống 2 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 14 viên trong 24 giờ.
- Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: uống 1 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 7 viên trong 24 giờ.
- Trẻ em từ 3 đến dưới 6 tuổi: uống ½ viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 3 viên rưỡi trong 24 giờ.
- Trẻ em dưới 3 tuổi: theo liều chỉ định của bác sĩ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Quá mẫn với attapulgite.

Attapulgite không được dùng trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em. Không nên sử dụng thuốc cho những bệnh nhân có thương tổn hẹp ở đường tiêu hóa.

**THẬN TRỌNG**

- Chỉ dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi khi có chỉ dẫn của bác sĩ.

- Không nên sử dụng thuốc khi có sốt cao, trong phân có nhầy hoặc máu trừ khi có chỉ định của bác sĩ.
- Nếu triệu chứng vẫn còn sau 2 ngày điều trị, xin tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Phải đồng thời bổ sung nước và chất điện giải ở những bệnh nhân bị tiêu chảy kèm mất nước.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Attapulgite thường được coi là an toàn.

**TÁC DỤNG PHỤ**

Attapulgite có thể gây táo bón – thường nhẹ và thoáng qua.

Nhóm được hấp thu vào cơ thể có thể gây thiếu hụt phosphor khi dùng kéo dài hoặc liều cao. Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ**

Trong trường hợp quá liều, nên ngưng dùng attapulgite ngay và rửa dạ dày.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Khi dùng các dạng thuốc uống cùng lúc với attapulgite có thể làm giảm hấp thu các thuốc này dẫn đến giảm hiệu quả điều trị. Vì vậy, attapulgite nên được dùng ít nhất 2 đến 3 giờ trước hoặc sau khi uống các thuốc khác.

**TRÌNH BÀY**

Hộp 125 vỉ x 4 viên nén. Hộp 4 vỉ x 4 viên nén.

**BẢO QUẢN**

Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C.

**HẠN DÙNG**

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**  
**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

Sản xuất tại  
CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA VIỆT NAM  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Áp 2, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: 08-38100800  
©Đăng ký nhãn hiệu: United Laboratories, Inc.





New

# DIATABS®

Attapulgitte 600 mg  
Tablet

Adjunct to diarrhea treatment

- REDUCES frequency of bowel movement
- IMPROVES consistency of loose or watery stools
- RELIEVES cramps due to diarrhea

#### COMPOSITION

Each tablet contains:

Activated Attapulgitte ..... 600 mg

**Excipients:** Pregelatinized Starch, Starch, Magnesium Stearate.

#### DESCRIPTIONS

New Diatabs activated attapulgitte exerts highly effective adsorptive property to eliminate toxins, bacteria and enteroviruses that cause diarrhea and other gastrointestinal infections.

New Diatabs absorbs watery part of inflammatory secretions to help improve consistency of stools. In addition, New Diatabs coats and protects the inflamed mucous membrane of the intestinal tract.

#### INDICATIONS

- For symptomatic treatment of acute and chronic diarrhea in nonspecific bowel diseases.
- Irritable bowel syndrome.

#### DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE

- Adults and Children 12 years old and over: administer orally 2 tablets after every bowel movement. Not to exceed 14 tablets in 24 hours.
- Children 6 to below 12 years old: administer orally 1 tablet after every bowel movement. Not to exceed 7 tablets in 24 hours.
- Children 3 to below 6 years old: administer orally ½ tablet after every bowel movement. Not to exceed 3 and a half tablets in 24 hours.
- Children up to 3 years old: Use and dose must be directed by a doctor.

#### CONTRAINDICATIONS

Hypersensitive to attapulgitte.  
In children with acute diarrhea, use is not recommended.  
Patients with stenotic lesions in the gastrointestinal tract.

#### PRECAUTIONS

- Use of the drug for children under 6 years of age only when directed by a doctor.

- Attapulgitte should not be used for patients with high fever, mucous or bloody stools unless directed by a doctor.
- If symptoms persist after 2 days, consult a doctor.
- Sufficient rehydration and electrolytes must be supplemented concomitantly for diarrheal patients with dehydration (fluid loss).

#### PREGNANCY AND LACTATION

Attapulgitte is considered safe.

#### SIDE-EFFECTS

Attapulgitte may cause constipation – usually mild and transient. Using attapulgitte in a long time or with high dose can cause phosphor insufficiency because of increasing aluminium absorption of the body. Please inform your doctor of all undesirable effects upon drug administration.

#### OVERDOSE AND TREATMENT

In the event of overdose, attapulgitte should be discontinued and the stomach should be emptied by gastric lavage.

#### DRUG INTERACTIONS

Concurrent use of oral medications with attapulgitte may impair absorption of these medications resulting in decreased therapeutic effectiveness. It is recommended that attapulgitte be administered at least 2 to 3 hours before or after other oral medications.

#### PRESENTATION

Box of 125 strips x 4 tablets. Box of 4 strips x 4 tablets.

#### STORAGE

Store at temperatures not exceeding 30°C.

#### SHELF-LIFE

36 months from manufacturing date.

#### KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ THE PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE  
FOR MORE INFORMATION, PLEASE ASK FOR DOCTOR'S ADVICE

Manufactured by  
UNITED PHARMA VIETNAM, INC.  
ISO 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP  
Commune 2, Binh Chanh, HCMC, Vietnam  
Tel: 08-38100800

®Registered trademark of United Laboratories, Inc.



PM code