

sự cân), rối loạn các giác quan, có thể bị sốt kèm theo khát, đa niệu, mất nước, vô cảm, ngưng tăng trưởng và nhiễm trùng đường tiểu. Các biện pháp điều trị quá liều do uống nhầm bao gồm: rửa dạ dày lập tức hoặc gây nôn để tránh hấp thu thuốc vào máu. Dùng dầu paraffine để làm tăng đào thải thuốc qua phân. Tiến hành kiểm tra nhiều lần Canxi huyết. Nếu Canxi huyết vẫn còn cao, có thể dùng phosphate và corticoid, và dùng các biện pháp tăng bài niệu thích hợp.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Nhà sản xuất.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ THỜI HẠN GHI TRÊN NHÃN.

BẢO QUẢN:

Giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

GIỮ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

TRÌNH BÀY:

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén nhai.

NHÀ SẢN XUẤT:

The Schazoo Pharmaceutical Laboratories (Pvt.) Limited
Kalalwala, 20Km Lahore-Jaranwala Road, Pakistan.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.*

GOLDTOMAX FORTE

(Viên nén nhai chứa canxi và vitamin D3)

THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén nhai có chứa:

Hoạt chất: calcium carbonate 1250mg và colecalciferol (vitamin D3) 125 IU.

Tá dược: mannitol, aspartame, saccharin sodium, gelatin, hương vị hoa quả hỗn hợp, avicel pH 102, acid citric monohydrate, talc.

CHỈ ĐỊNH:

Goldtomax Forte là công thức bổ sung canxi và vitamin D3 các chất cần thiết cho xương. Thuốc chứa các yếu tố quan trọng cần thiết giúp hấp thu Canxi và đảm bảo chăm sóc cho xương tốt nhất.

- Chứa vitamin D3 để cơ thể dễ dàng hấp thu canxi
- Hấp thụ canxi và chuyển hóa hiệu quả hơn khi có mặt vitamin D3.

Thuốc được chỉ định để:

- ❖ Phòng và điều trị bệnh loãng xương, rối loạn khiến xương yếu và dễ gãy. Các yếu tố di truyền có tác động lên sự tiến triển của bệnh loãng xương, phụ nữ, người cao tuổi, người hút thuốc lá và nghiện rượu là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.
- ❖ Phòng và điều trị bệnh nhuyễn xương (xương bị mềm ra).
- ❖ Đáp ứng nhu cầu bổ sung canxi, vitamin D đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng (trẻ em, thanh thiếu niên), trong thời kỳ mang thai và cho con bú, dùng cho người già.
- ❖ Phòng ngừa tình trạng thiếu hụt canxi, vitamin D (dùng cho người đang áp dụng chế độ ăn kiêng giảm béo, bệnh nhân đang điều trị gãy xương).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Nhai nát viên thuốc trước khi chiêu với một cốc nước. Nên dùng sau bữa ăn.

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

- ❖ Một viên mỗi ngày: trong đa số các trường hợp thiếu hụt và/hoặc tăng nhu cầu canxi ở thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú và người cao tuổi, trong trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu canxi và vitamin D, trong phòng bệnh loãng xương hoặc nhuyễn xương.
- ❖ Hai viên mỗi ngày: trong điều trị bệnh loãng xương hoặc nhuyễn xương, trong các trường hợp nghiêm trọng gây thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu canxi và vitamin D.

Trẻ em dưới 12 tuổi:

dạng viên nén nhai không phù hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi. Nên dùng dạng si rô hoặc thuốc nhỏ giọt
Hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- ❖ Dị ứng với bất kì thành phần nào của thuốc
- ❖ Tăng canxi trong máu
- ❖ Không dùng đồng thời với các chế phẩm có chứa canxi và vitamin D
- ❖ Trẻ em dưới 12 tuổi

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC:

Trong các trường hợp tăng canxi niệu nhẹ, chứng suy thận mãn hoặc có triệu chứng tích tụ canxi ở thận, nên theo dõi nồng độ canxi trong nước tiểu.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- ❖ Thuốc làm tăng độc tính của dẫn xuất Digitalin nên phải theo dõi kiểm tra nghiêm ngặt bằng điện tâm đồ.
- ❖ Trong trường hợp điều trị phối hợp với Diphosphonat hay Natri florua nên dùng Canxi cách khoảng với các thuốc

này (vì có nguy cơ giảm hấp thu Diphosphonat hay Natri florua đường tiêu hóa).

- ❖ Trong trường hợp điều trị với Tetracylin uống, nên dùng cách khoảng với Goldtomax Forte ít nhất 3 giờ để tránh ảnh hưởng trên sự hấp thu Tetracylin.
- ❖ Trong trường hợp điều trị với thuốc lợi tiểu nhóm Thiazid: nên để ý đến nguy cơ tăng Canxi huyết do giảm đào thải Canxi đường niệu.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thuốc được khuyến dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Rối loạn tiêu hóa hiếm gặp. Ở liều cao có thể có triệu chứng của tình trạng tăng Canxi huyết và tăng Canxi niệu bao gồm biếng ăn, buồn nôn, ói mửa, táo bón, đau bụng, khô miệng, khát nước và đa niệu.

Ghi chú: XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ý GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:

Dấu hiệu quá liều Canxi: biếng ăn, khát nước, tiểu nhiều, táo bón, cao huyết áp. Triệu chứng cận lâm sàng : tăng Canxi huyết, tăng Canxi niệu, rối loạn quan trọng các chức năng thận. Ngộ độc mãn tính sẽ gây tăng Canxi huyết thứ phát với vô hóa vỏ thận, cơ tim, phổi và tụy tạng.

Dấu hiệu ngộ độc cấp tính vitamin D: chán ăn, nhức đầu, buồn nôn, táo bón.

Dấu hiệu ngộ độc mãn tính vitamin D: loạn dưỡng (yếu ớt,