

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
BIOLACTYL[®]
THUỐC BỘT

GMP WHO

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói chứa: Bột đông khô men vi khuẩn sinh lactic 50 mg
(Chứa: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus,
Streptococcus lactis, Lactobacillus casei 1 tỷ vi sinh sống)
Tá dược: Maltodextrin vừa đủ 1 g

DẠNG TRÌNH BÀY:

Hộp 14 gói x 1 g.

TÍNH CHẤT:

- Trong ruột người có nhiều vi khuẩn thuộc nhiều loại tạo thành quần thể gọi là tạp khuẩn ruột. Trong tạp khuẩn, ngoài vi khuẩn gây bệnh còn có các vi khuẩn có ích tạo nên sự cân bằng cho hệ vi sinh đường ruột. Nếu vì lý do nào đó: rượu, stress, nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh hay hoá trị liệu làm cho sự cân bằng trong hệ tạp khuẩn ruột bị phá vỡ, đồng thời có sự tăng sinh quá mức các vi khuẩn gây bệnh sẽ đưa đến các rối loạn như: tiêu chảy, khó tiêu, trướng bụng...
- Biolactyl chứa các vi khuẩn sinh lactic có ích - sẽ giúp ngăn ngừa và điều trị các rối loạn trên để tạo thể cân bằng cho hệ vi khuẩn đường ruột.

CHỈ ĐỊNH:

Biolactyl được dùng trong các trường hợp sau:

- Rối loạn tiêu hoá do điều trị bằng kháng sinh hay hoá liệu pháp.
- Rối loạn tiêu hoá và thôi rữa ở ruột.
- Viêm ruột cấp tính hay mãn tính: tiêu chảy, táo bón.
- Bổ sung, bảo vệ các vi khuẩn có ích cộng sinh trong ruột.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dung nạp với Maltodextrin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thuốc có thể dùng an toàn và chưa thấy có tác dụng không mong muốn.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TR0002-4

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em: Trung bình 1 đến 2 gói mỗi ngày, uống pha trong một ít nước, tốt nhất lúc bụng đói hoặc trước bữa ăn.
- Nhũ nhi: ½ đến 1 gói mỗi ngày, pha trong sữa, nước súp hoặc nước đường.
- Tùy theo các trường hợp bệnh lý, có thể sử dụng tăng liều:
 - + Người lớn và trẻ em: 2 - 4 gói mỗi ngày.
 - + Nhũ nhi: 1 - 2 gói mỗi ngày.

THẬN TRỌNG:

- Biolactyl có thể dùng an toàn và không cần có lưu ý đặc biệt nào khi sử dụng.
- **Phụ nữ có thai và cho con bú:** có thể dùng Biolactyl cho phụ nữ mang thai và cho con bú.
- **Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** thuốc không gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên uống chung với Tetracyclin vì Lactobacillus acidophilus có thể ngăn cản sự hấp thu Tetracyclin.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều Biolactyl.

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.

BẢO QUẢN: dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TR0002-4



IMEXPHARM

Sản xuất theo nhượng quyền của DB Pharma - Pháp
tại **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**
Số 4, Đường 30/4, P. 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Hotline: 1800.555.535 E-mail: imp@imexpharm.com