



## MẪU NHÃN VÀ TỜ HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC

Tên, địa chỉ cơ sở đăng ký và sản xuất:

**CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC**

6A 3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tên thuốc: **BETAHISTIN MEYER 16**

Dạng thuốc: Thuốc viên nén bao phim.


Nồng độ, hàm lượng:

-Betahistin dihydroclorid

16 mg

Thuốc hoá dược.

Đăng ký lần đầu.



*Năm 2010*



Lần đầu: 18/01/2013

MẪU ĐĂNG KÝ TOA THUỐC BETAHISTIN MEYER 16

SĐK:  
Tiêu chuẩn: TCCS

BETAHISTIN MEYER 16

**THÀNH PHẦN:**

Betahistin dihydroclorid 16 mg

Tá dược: Lactose, microcrystallin cellulose, polyvinyl pyrolidon, aerosil, crospovidon, magnesi stearat, talc, HPMC 606, HPMC 615, PEG 6000, titan dioxyd vừa đủ 1 viên.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nén bao phim.

**QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên nén bao phim.

**CHỈ ĐỊNH:**

-Điều trị triệu chứng chóng mặt do tiền đình.

-Điều trị hội chứng Ménière. Hội chứng này thường được biểu hiện bằng chóng chóng mặt, ù tai, nôn ói, nhức đầu và đôi khi kèm theo mất thính lực.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Liều thông thường cho người lớn là uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần sau mỗi bữa ăn. Liều nên được điều chỉnh tùy theo tuổi và mức độ nặng nhẹ của bệnh.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

-Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

-Loét dạ dày-tá tràng.

-U tủy thượng thận.

**THẬN TRỌNG:**

-Người có tiền sử loét dạ dày hoặc đang có vết loét đường tiêu hóa.

-Người bệnh hen suyễn.

-Phụ nữ có thai.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Chưa phát hiện có tương tác với bất kỳ loại thuốc nào.

**TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Thuốc này chỉ dùng cho phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai trong trường hợp xét thấy ích lợi mang lại lớn hơn so với những tai biến có thể gặp.

**TRƯỜNG HỢP LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Thuốc không ảnh hưởng đáng kể.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

-Tiêu hóa: hiếm khi gặp buồn nôn, nôn.

-Hiếm gặp nổi mẩn ngoài da.

*Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

-Triệu chứng: các triệu chứng giống các triệu chứng gây bởi thuốc histamin.

-Xử lý: dùng thuốc kháng histamin, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.**



**MEYER-BPC**  
**CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC**

Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre-Việt nam

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Văn Nèn




## MẪU ĐĂNG KÝ VỊ THUỐC BETAHISTIN MEYER 16

<b>EYER 16</b> 16 mg	<b>Betahistin MEYER 16</b> Betahistin dihydroclorid 16 mg	<b>Betahistin MEYER 16</b> Betahistin dihydroclorid 16 mg
MEYER-BPC SDK:	TC:TCCS MEYER-BPC	CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC SDK:
<b>Betahistin MEYER 16</b> Betahistin dihydroclorid 16 mg	<b>Betahistin MEYER 16</b> Betahistin dihydroclorid 16 mg	<b>Betahistin MEYER 16</b> Betahistin dihydroclorid 16 mg
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC SDK:	TC:TCCS MEYER-BPC	CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC SDK:
<b>EYER 16</b> 16 mg	<b>Betahistin MEYER 16</b> Betahistin dihydroclorid 16 mg	<b>Betahistin MEYER 16</b> Betahistin dihydroclorid 16 mg
MEYER-BPC SDK:	TC:TCCS MEYER-BPC	CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC SDK:



TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. Nguyễn Văn Nôn



# MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC BETAHISTIN MEYER 16



HỘP 10 VI X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

Số lô SX:  
Ngày SX:  
Hạn dùng:

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
 Liều thông thường cho người lớn là uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần sau mỗi bữa ăn. Liều nên được điều chỉnh tùy theo tuổi và mức độ nặng nhẹ của bệnh.  
**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, tránh ánh sáng.  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**  
**NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI KIẾN BÁC SĨ.**

HỘP 10 VI X 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

**Betahistin MEYER 16**  
 Betahistin dihydroclorid 16 mg



**THÀNH PHẦN:**  
 Betahistin dihydroclorid 16 mg  
 Tá dược vừa đủ 1 viên.

**CHỈ ĐỊNH:**  
 - Điều trị triệu chứng chóng mặt do tiền đình.  
 - Điều trị hội chứng Ménière. Hội chứng này thường được biểu hiện bằng chứng chóng mặt, ù tai, nôn ói, nhức đầu và đôi khi kèm theo mất thính lực.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**  
 - Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.  
 - Loét dạ dày-tá tràng.  
 - U tủy thượng thận

**CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC**  
 Số 6A3 quốc lộ 80 p. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Việt Nam

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 CÔNG TY  
 LIÊN DOANH  
 MEYER-BPC  
 TP. BẾN TRE - T. BẾN TRE

**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
 Nguyễn Văn Thanh

DS. Nguyễn Văn Nền