



228/80



Made in India by: MEYER HEALTHCARE PVT. LTD. Dill Oil, Fennel Oil with Simethicone

Colicare DROPS



15ml

Relieves
**INFANT COLIC,
GRIPING PAIN
& FLATULENCE**

Made in India by:
MEYER HEALTHCARE PVT. LTD.
10 D, II nd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-58, India

- Tên thuốc: COLICARE drops
- Hoạt chất, hàm lượng hoặc nồng độ: Mỗi 15ml chứa Simethicone 600 mg, Dill Oil 0.075 ml, Fennel Oil 0.0105 ml
- Qui cách đóng gói: chai 15ml/Hộp
- Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định: Xem tờ hướng dẫn sử dụng
- Dạng bào chế: nhũ tương để uống
- Số đăng ký: XX-XXXX-XX
- Số lô SX: XXXX
- NSX: XX/XX/XX, HD: XX/XX/XX
- Sau khi mở nắp, gói nắp chặt, bảo quản ở điều kiện yêu cầu, hạn dùng của thuốc là 36 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
- Nhà sản xuất: MEYER HEALTHCARE PVT. LTD. 10 D, II nd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-58, India
- Doanh nghiệp nhập khẩu: Công ty XXX
- Xuất xứ: Ấn Độ
- "LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG"
- "Để xa tầm tay trẻ em"
- "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
- "Các thông tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo"

Batch No.:
Mfg Date:
Exp Date:

FOR INFANTS DROPS Colicare

Dill Oil, Fennel Oil with Simethicone

Colicare DROPS



15ml

Relieves
**INFANT COLIC,
GRIPING PAIN
& FLATULENCE**

15 ml

Each 15ml contains
Simethicone Emulsion U.S.P
eqvt. to Simethicone U.S.P 600 mg
Dill Oil B.P 0.075 ml
Fennel Oil USP-NF 0.0105 ml
Excipients q.s.

Specification: In-house
DOSAGE:

INFANTS (below 6 months)
5-10 drops 4 times daily, 15 minutes before meal
INFANTS (6-12 months):
10-20 drops 4 times daily,
15 minutes before meal
CHILDREN (over 1 year)
20-25 drops 4 times daily,
15 minutes before meal
Or as directed by the physician
Use calibrated dropper provided in this pack. Replace cap tightly after

INDICATIONS, CONTRA-INDICATION, ADMINISTRATION:
Please see pack insert
Keep in Cool dry Place, below 30°C, protect from direct sunlight
Keep out of reach of children
Please read the enclosed pack insert carefully before use



Each 15ml contains
Simethicone Emulsion U.S.P
eqvt. to Simethicone U.S.P 600 mg
Dill Oil B.P 0.075 ml
Fennel Oil USP-NF 0.0105 ml
Excipients q.s.
Specification: In-house
DOSAGE:
INFANTS (below 6 months) 5-10 drops 4 times daily, 15 minutes before meal
INFANTS (6-12 months): 10-20 drops 4 times daily, 15 minutes before meal
CHILDREN (over 1 year): 20-25 drops 4 times daily, 15 minutes before meal, or as directed by the physician

Dill Oil, Fennel Oil with Simethicone

Colicare DROPS

Relieves
**INFANT COLIC,
GRIPING PAIN
& FLATULENCE**



Made in India by
MEYER HEALTHCARE PVT LTD
10 D, II nd Phase, Peenya Industrial Area Bangalore-58, India
Keep in Cool dry Place, below 30°C, protect from direct sunlight
Keep out of reach of children
Please read the enclosed pack insert carefully before use
SHAKE WELL BEFORE USE
Batch No.:
Mfg Date:
Exp Date:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 18/01/11



COLICARE
Drops



Tên thuốc: COLICARE Drops

Thành phần: Mỗi 15 ml chứa:

Nhũ tương Simethicone U.S.P

Tương đương với simethicone U.S.P 600 mg

Dill oil B.P 0.075 ml

Fennel oil USP-NF 0.0105 ml

Tá dược: Sucrose, Sodium Methyl Paraben, Sodium Propyl Paraben, Xanthan Gum, Sodium Citrate Dihydrate, Citric Acid Monohydrate.

Dạng bào chế: Nhũ tương để uống.

Quy cách đóng gói: Chai 15 ml

Chỉ định: Điều trị các triệu chứng đầy bụng, chướng bụng trong các bệnh: trào ngược dạ dày thực quản, chứng khó tiêu, giảm cơn đau bụng do co thắt cơ trơn đường tiêu hoá ở trẻ em.

Liều dùng, cách dùng, đường dùng

Liều dùng:

Trẻ em (dưới 6 tháng)

5 - 10 giọt, 4 lần mỗi ngày, 15 phút trước khi cho trẻ ăn.

Trẻ em (6 - 12 tháng)

10 - 20 giọt, 4 lần mỗi ngày, 15 phút trước khi cho trẻ ăn.

Trẻ em (hơn 1 năm)

20 giọt 4 lần mỗi ngày. 15 phút trước khi cho trẻ ăn.

Hoặc theo chỉ dẫn của Bác sĩ.

Sử dụng ống nhỏ giọt với kích cỡ qui định kèm theo hộp.

Cách dùng: LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG. Đậy nắp cẩn thận sau khi dùng.

Đường dùng: Uống

Chống chỉ định: Chống chỉ định với bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng khi dùng thuốc

Chỉ dùng thuốc sau khi loại trừ cơn đau bụng có dấu hiệu ngoại khoa. Nếu nghi ngờ phải đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Không sử dụng quá 12 liều trong 1 ngày trừ khi có chỉ định và theo dõi của thầy thuốc.

PN mang thai và cho con bú: Thuốc này dùng cho trẻ em.

Lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng

Tương tác thuốc: Chưa có tương tác thuốc nào giữa Colicare drops với thuốc khác được báo cáo.

Tác dụng không mong muốn

Thuốc này an toàn và gần như không gây tác dụng không mong muốn.

"Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Quá liều và cách xử trí

Những thành phần dùng trong công thức Colicare thì được dung nạp tốt.

Trong trường hợp quá liều, ngưng dùng thuốc ngay và tham khảo ý kiến Bác sĩ.

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ"

"Đề xa tâm tay trẻ em"

Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Sau khi mở nắp: nếu thuốc được bảo quản ở điều kiện khô mát tránh ánh sáng, dưới 30°C và nắp được gài chặt sau khi sử dụng thì Colicare drops vẫn giữ được độ ổn định trong 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất:

MEYER HEALTHCARE PVT. LTD.

10-D, 2nd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-58. India



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh