



# SILYGAMMA® 150

Silymarin



## Thông tin sản phẩm

### THÀNH PHẦN

Cao khô được chiết xuất từ quả cúc gai (35-40:1 methanol) tương đương với 150 mg silymarin, tính theo silibinin. Ví 25 viên bao, hộp 4 vỉ.

### CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan mãn tính, xơ gan và tổn thương gan do nhiễm độc.

Không dùng trong điều trị nhiễm độc cấp tính.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn và thiếu niên từ 12 tuổi trở lên uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên với lượng nước vừa đủ (khoảng 1 ly) trước hoặc trong bữa ăn trừ khi có các chỉ định khác.

Bệnh nhân nên tuân thủ theo khuyến cáo sau: Bác sĩ điều trị quyết định thời gian điều trị. Phải thông báo cho Bác sĩ nếu các phản ứng không mong muốn xuất hiện dai dẳng.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

**Silygamma** chống chỉ định đối với trường hợp có tiền sử mẫn cảm với quả Cúc gai (milk thistle) hoặc với các cây thuộc họ Cúc hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.

### CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Những bệnh nhân không dung nạp galactose do di truyền dạng hiếm, thiếu hụt lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng **Silygamma**.

Song song với việc điều trị bằng thuốc phải tránh xa các nguyên nhân gây tổn thương gan (rượu).

Phải thông báo cho bác sĩ các trường hợp vàng da (sự biến đổi màu da từ vàng nhạt đến đậm, trông trắng mắt có màu vàng).

Không có những nghiên cứu đầy đủ trên trẻ em. Do đó **Silygamma** không được sử dụng cho trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi.

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Silymarin làm giảm hoạt tính của enzyme CYP3A4 in vitro.

Nếu sử dụng Silymarin cùng với các thuốc chuyển hóa bởi enzyme CYP3A4 thì có thể sẽ làm thay đổi dược động học của các thuốc đó.

Sự ảnh hưởng của của các isoenzymes khác trong hệ thống enzyme cytochrome P450 cũng phải được xem xét.

Những nghiên cứu cụ thể trên thuốc **Silygamma** chưa được báo cáo. Tuy nhiên, nên theo dõi khi sử dụng đồng thời **Silygamma** với các thuốc có đặc tính như trên.

### TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không dùng **Silygamma** cho phụ nữ có thai.

Không dùng **Silygamma** cho phụ nữ cho con bú do thiếu các nghiên cứu thích hợp.

**Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:** không có

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các vấn đề về tiêu hóa, ví dụ như hiếm gặp tác dụng tẩy xổ nhẹ khi sử dụng thuốc.

Các phản ứng quá mẫn như nổi mề đay hay khó thở rất hiếm gặp.

### XỬ LÝ KHI QUÊN THUỐC

Không dùng gấp đôi liều lượng để bù liều quên uống. Tiếp tục dùng **Silygamma** với liều tương tự như trước đây vào đúng giờ quy định thông thường và cố gắng dùng thuốc đều đặn trong thời gian tới


**BẢO QUẢN :** Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, trong bao bì gốc và tránh ánh sáng.

**Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em.**

Sản xuất bởi :

*[Signature]*  
29/08/2015

DRAGENOPHARM APOTHEKER PÜSCHL GMBH  
Göllstraße 1, D-84529 Tittmoning, Đức



SDK : VN-16542-13

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ : VPĐD WÖRWAG PHARMA VIỆT NAM  
lầu 4, 157 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3; TP HCM  
ĐT : (08) 3820 9675 - Fax : (08) 3820 7335

