

289/49

H3/A157 XSA

MẪU NHÃN VĨ SẮC HÂM GINKGO BILOBA



ĐỒ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 06/02/2017

10 vỉ x 10 viên nang mềm

Ginkgo Biloba

Ginkgo biloba Siccus Extractum Folium 40 mg



Ginkgo Biloba

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:
- Cao khô lá bạch quả 40 mg
(Extractum folium Ginkgo biloba Siccus)
Tà dược: vỏ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:
- Các rối loạn mạch máu não và mạch máu ngoại biên.
- Một số rối loạn về thị giác (bệnh võng mạc do tiểu đường) và tai mũi họng (chóng mặt ù tai, giảm thính lực do liên quan đến vãn mạch), rối loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác do thiếu máu cục bộ.
- Hội chứng Raynaudid.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Uống 2 viên/lần, 2 lần/ngày.
- Uống trước bữa ăn.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi sử dụng với phụ nữ cho con bú, người đang dùng thuốc kháng đông.
- Thuốc này không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng.
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN: TCCS SDK:
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN
Số 521, Khu Phố An Lợi, P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, Bình Dương.
ĐT: 0650 3589036 Fax: 0650 3589297

10 blisters x 10 softgels

Ginkgo Biloba

Cao khô lá bạch quả 40 mg



Số lô SX: xxx NSX: xxx HD: xxx

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba 40mg CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba 40mg CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba 40mg CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba 40mg CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba 40mg CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba 40mg CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN

Ginkgo Biloba Ginkgo biloba 40mg CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM MỄ DI SUN

Ngày SX:
Số Lô SX:

HD:

MEDISUN Pharmaceutical Joint Stock Company
Số 521, An Lợi Block, Lợi Hòa ward, Ben Cat
burg, Binh Duong, P.
Tel: 0650 3589036 Fax: 0650 3589297

KEEP OUT THE REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET
BEFORE USE

VISA:
SPECIFICATION: Manufacturer

STORAGE: Dry place, under 30°C, avoid the sunlight.
Please read the leaflet enclosure.

CONTRAINDICATIONS, SIDE-EFFECTS,
AND OTHER INFORMATION:
of hypertension

CAUTION:
- Caution should be used breastfeeding women, who are taking anticoagulants.
- It is not used alternative drug treatment

DOSEAGE - USAGE:
- Take 2 softgels/time x 2 times/day.
- Before the meal.

INDICATIONS:
- Cerebrovascular disorders and peripheral vascular
- Visual disorders (retinopathy by diabetic) and otolaryngology (dizziness, tinnitus, reduce hearing by related vasomotor), circulatory disorders due to sensory nerve ischemia.
- Raynaudid syndrome.

COMPOSITION: Each softgels contains:
- Ginkgo biloba Siccus Extractum Folium: 40 mg
Excipients: q.s. 1 softgel.



Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

GINKGO BILOBA

[Thành phần]:

Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô lá bạch quả (*Extractum folium Ginkgo biloba Siccus*): 40 mg

Tá dược: vừa đủ 1 viên (Sáp ong trắng, Dầu cọ, Lecithin, Aerosil, Soybean oil, Methyl paraben, Propyl paraben, Gelatin, Sorbitol liquid, Glycerin, Kali sorbat, Vanillin, Titan dioxyd, Tartrazin yellow, Oxyd sắt đen, Patent blue, Glycin, Acid citric).

【Tính chất dược lực】 : Chiết suất đậm đặc và đã tiêu chuẩn hóa từ lá khô của cây Ginkgo biloba. Ginkgoacea làm tăng tuần hoàn động mạch ở các chi và bình thường hóa tính thấm của mao mạch trong chứng phù nề tự phát, tăng lưu lượng máu đến não, hoạt hóa sự chuyển hóa năng lượng của tế bào bằng cách gia tăng tiêu thụ glucose ở não bộ, và bình thường hóa sự tiêu thụ oxy ở não. Thuốc cũng làm giảm nguy cơ chứng huyết khối thuộc vi tuần hoàn, và có những tác dụng lợi ích đặc biệt đối với hệ tuần hoàn của người cao tuổi.

【Dược động học】 : Hoạt chất chính là chiết xuất tiêu chuẩn hóa của Ginkgo biloba được chuẩn độ có 24% heterosid của ginkgo, 6% di và sesquiterpen (ginkgolid A, B, C và bilobalid). Ở người, chỉ có những thông số dược động của các thành phần terpen là đã được làm rõ. Các ginkgolid A và B và bilobalid có độ khả dụng sinh học qua đường uống là 80 -90%. Đạt nồng độ tối đa sau 1 đến 2 giờ; quá trình bán thải kéo dài khoảng 4 giờ (bilobalid, ginkgolid A) đến 10 giờ (ginkgolid B). Các chất này không bị phân giải trong cơ thể và chủ yếu được thải qua nước tiểu, một lượng nhỏ được thải qua phân.

【Chỉ định】 :

- Các rối loạn mạch máu não và mạch máu ngoại biên.
- Một số rối loạn về thị giác (bệnh võng mạc do tiểu đường) và tai mũi họng (chóng mặt, ù tai, giảm thính lực do liên quan đến vận mạch), rối loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác do thiếu máu cục bộ.
- Hội chứng Raynaud.

【Liều dùng – cách dùng】 :

- Uống 2 viên/lần, 2 lần/ngày.
- Uống trước bữa ăn.

【Thận trọng】 :


- Thận trọng khi sử dụng với phụ nữ cho con bú, người đang dùng thuốc kháng đông.
- Thuốc này không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

【Chống chỉ định】 :

- Trẻ em dưới 12 tuổi
- Phụ nữ có thai
- Người rối loạn chảy máu, đang chảy máu, suy giảm trí nhớ do thiếu năng não bẩm sinh, thần kinh phân liệt, pha nhồi máu cấp.
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

【Tác dụng không mong muốn】 :

Rất hiếm: rối loạn tiêu hóa, rối loạn ở da, nhức đầu.



Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

【Sử dụng cho người mang thai và cho con bú】 :

Phụ nữ có thai:

Chống chỉ định dùng thuốc ở phụ nữ có thai.

Phụ nữ cho con bú:

Việc sử dụng thuốc này cho các bà mẹ nuôi con bú không được khuyến khích, bởi vì không rõ thuốc có vào sữa mẹ hay không.

【Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc】 : Thuốc không gây buồn ngủ nên có thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

【Tương tác】 : Thuốc có thể tương tác với thuốc kháng đông và các thuốc ảnh hưởng đến sự kết tập tiểu cầu. Không dùng với thuốc chống động kinh Valproat, Phenytoin.

【Quá liều】 : Chưa có thông tin về quá liều. Không có thông tin tham khảo đáng tin cậy và không có các thông báo từ dữ liệu thử nghiệm.

【Bảo quản】 : Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.


【Tiêu chuẩn】 : Tiêu chuẩn cơ sở

【Hạn dùng】 : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

【Đóng gói】 : Hộp 10 vi x 10 viên nang mềm.



**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC.
ĐỂ THUỐC XA TÂM VỚI TRẺ EM**

Logo công ty: 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

Địa chỉ: Số 521, Khu Phố An Lợi, Phường Hoà Lợi, TX.Bến Cát, T.Bình Dương.

Số điện thoại: 0650 3589036

Số fax: 0650 3589297

Website: medisun.com.vn

Email: medisun@medisun.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN



DS.Lê Minh Hoàn

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lê Minh Hùng

