

# MẪU NHÃN HỘP & TUÝP

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 18/01/2013

Sản phẩm : **AROTABIN 5g**  
 Kích thước hộp : 95 x 20 x 28 mm  
 Kích thước tuýp : 97 x 15.9 mm  
 Tỷ lệ : 70%  
 Nội dung : như mẫu

llh



Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập trên tuýp



Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

**Thuốc kháng virút dùng tại chỗ.**

**AROTABIN** Kem bôi da

(Acyclovir)

SDK:

**[Thành phần]**

Mỗi tuýp 5g chứa:

Hoạt chất:

Acyclovir .....250mg

Tá dược:

Cetosteryl alcohol, Vaseline, Parafin lỏng, Polyoxyl -20-cetostearyl ether, Propylen glycol, Methylparaben, Propylparaben, Nước tinh khiết.

**[Dạng bào chế]**

Kem bôi ngoài da.

**[Chỉ định]**

Điều trị những trường hợp nhiễm virút *Herpes simplex* và *Varicella-zoster*.

**[Liều lượng và cách dùng]**

AROTABIN nên được dùng 5 lần mỗi ngày, cách nhau khoảng 4 tiếng, bỏ qua liều ban đêm. Bôi thuốc vào vùng da bị tổn thương hoặc sắp bị tổn thương càng sớm càng tốt, ngay sau khi có dấu hiệu bị nhiễm virút. Nên dùng thuốc liên tục 5 ngày. Nếu tổn thương không lành sau 5 ngày, nên dùng thuốc thêm 5 ngày nữa.

**[Chống chỉ định]**

Không dùng thuốc cho những bệnh nhân bị quá mẫn với acyclovir.

**[Thận trọng]**

Không có lưu ý đặc biệt gì khi dùng thuốc AROTABIN bôi ngoài da.

**[Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú]**

Chỉ nên dùng acyclovir cho người mang thai khi lợi ích của việc điều trị hơn hẳn rủi ro có thể xảy ra với bào thai.

Chưa được biết Acyclovir bôi ngoài da có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Hấp thu toàn thân sau khi bôi là rất nhỏ.

**[Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc]**

Không ảnh hưởng.

**[Tương tác thuốc]**

Amphotericin B và Ketoconazol làm tăng hiệu lực chống virus của acyclovir.

**[Tác dụng không mong muốn]**

Cảm giác rất bỏng hoặc như bị kim châm có thể xảy ra thoáng qua sau khi dùng AROTABIN.

Một vài bệnh nhân bị nổi ban hoặc bị khô và tróc da nhẹ.

**Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**





*llh*

**[Sử dụng quá liều]**

Cho đến nay chưa có triệu chứng quá liều nào được ghi nhận khi dùng acyclovir đường bôi ngoài da.

**[Bảo quản]**

Giữ thuốc trong hộp kín, nơi khô mát, ở nhiệt độ dưới 30°C.

**[Thời hạn sử dụng]**

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng*

**[Đóng gói]**

1 tuýp (5g)/ hộp.



*Sản xuất theo nhượng quyền của:*

**DAEWOO PHARM. CO., LTD.**

*Tại:* **CTY TNHH PHIL INTER PHARMA**

25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.

*llh*



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thanh*

