

Men vi sinh



Baci-subti

Hỗ trợ điều trị:

- Tiêu chảy, viêm ruột cấp và mãn tính
- Trẻ em đi ngoài phân sống
- Rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc dùng kháng sinh kéo dài



THÀNH PHẦN: Mỗi gói 1 gam chứa:

- Bacillus subtilis R0179: $2 \cdot 10^8$ CFU
- Fructose Oligosaccharide (FOS): 100 mg
- Tá dược (Lactose, Hương thơm): vừa đủ 1g

DƯỢC LỰC HỌC:

Bacillus subtilis R0179 tồn tại trong thuốc ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các men tiêu hóa ở dịch vị phá hủy. Ở ruột, bào tử nảy mầm và phát triển thành thể hoạt động, gắn vào thành ruột, phát triển và chống lại vi khuẩn gây bệnh qua cơ chế sau:

- Bacillus subtilis R0179 tổng hợp nhiều chất có hoạt tính sinh học có lợi cho cơ thể như các enzym thay phân, các vitamin, axit amin... Chúng cung cấp ngay cho cơ thể một số men cần thiết, làm cho tiêu hóa trở lại bình thường trong khi hệ vi khuẩn ở ruột chưa lập lại trạng thái cân bằng.
- Các thành sinh tồn và tế bào chết của vi khuẩn gây bệnh đường ruột.
- Tiết các kháng sinh ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, tác dụng lên cả vi khuẩn Gram (-), Gram (+) và nấm gây bệnh.
- Ở thành ruột, Bacillus subtilis R0179 có enzym giống như lysozyme có khả năng dung giải trực tiếp một số vi khuẩn gây bệnh như: E.coli, Staphylococcus.

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ điều trị: Rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc dùng thuốc kháng sinh kéo dài như phân sống, đầy bụng, khó tiêu...

Trẻ em đi ngoài phân sống

Viêm ruột cấp và mãn tính, tiêu chảy, táo bón.

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn và trẻ em: Uống 1 - 2 gói/ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút.
- Trong các trường hợp đầy bụng, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy, phân sống, loạn khuẩn đường ruột do trực tiếp an, rượu bia... Uống 3 - 4 gói/ngày, cách 3 - 4 giờ dùng 1 gói

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thuốc có dạng bào sung vi khuẩn nên không có trụ y và cảnh báo đặc biệt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Cho đến nay chưa ghi nhận có tác dụng phụ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.

TIÊU CHUẨN: TCCS



BIOPHARCO

Thuốc được sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

VP: 26 Hàn Thuyên - Nha Trang - Khánh Hòa
Nhà máy GMP: Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa

Điện thoại liên hệ: **058.3813067**

Email: **biopharco@dnng.vnn.vn**

Số giấy tiếp nhận Hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược: .../2016/XNQC-QLD, cấp ngày .../.../...

Handwritten signature

23/05/2016



Baci-subti

Viên nang 500 mg

INH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:

<i>Bacillus subtilis</i> R0179.....	≥ 10 ⁹ CFU
Ictose Oligosaccharide (FOS).....	100 mg
- Tá dược (Lactose, Magnesi Stearat).....	vừa đủ 500 mg

DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Viên nang cứng - Vĩ 10 viên, Hộp 6 vĩ.

DƯỢC LỰC HỌC:

Bacillus subtilis R0179 tồn tại trong thuốc ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các men tiêu hóa ở dịch vị phá hủy. Ở ruột, bào tử nảy mầm và phát triển thành thể hoạt động, gắn vào thành ruột, phát triển và chống lại vi khuẩn gây bệnh qua cơ chế sau:

- *Bacillus subtilis* R0179 tổng hợp nhiều chất có hoạt tính sinh học có lợi cho cơ thể như các enzym thủy phân, các vitamin, axit amin ... Chúng cung cấp ngay cho cơ thể một số men cần thiết, làm cho tiêu hóa trở lại bình thường trong khi hệ vi khuẩn ở ruột chưa lập lại trạng thái cân bằng.
- Cảnh tranh sinh tồn và ức chế các vi khuẩn gây bệnh đường ruột.
- Tiết các kháng sinh ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, tác dụng lên cả vi khuẩn Gram (-), Gram (+) và nấm gây bệnh.
- Ở thành bào tử, *Bacillus subtilis* R0179 có enzym giống như lysozyme có khả năng dung giải trực tiếp một số vi khuẩn gây bệnh như: *E.coli*, *Staphylococcus* ...

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ điều trị:

- Rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc dùng thuốc kháng sinh kéo dài như phân sống, đầy bụng, khó tiêu ...
- Trẻ em đi ngoài phân sống.
- Viêm ruột cấp và mãn tính, tiêu chảy, táo bón.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em: Uống 1 - 2 viên/ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút.
- Trong các trường hợp đầy bụng, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy, phân sống, loạn khuẩn đường ruột do thức ăn, rượu bia ...: Uống 3 - 4 viên/ngày, cách 3 - 4 giờ dùng 1 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thuốc ở dạng bổ sung vi khuẩn nên không có lưu ý và cảnh báo đặc biệt.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Cho đến nay chưa ghi nhận có tác dụng phụ.
- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều.
- Nếu dùng thuốc quá liều khuyến cáo, bỏ qua liều tiếp theo, sau đó tiếp tục liệu trình như thông thường.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258. 3828134 - Fax: 0258. 3828135

Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
ĐT: 0258. 3744263 - Fax: 0258. 3744265



GMP WHO

Email: biopharco@ngp.vn

Website: www.biopharco2.com.vn