



MẪU HỘP VIÊN NANG MỀM BOGANIC (Hộp 5 vỉ)

8 DD / M43

Viên nang mềm

Nhuyễn gan - lợi mật

BOGANIC FORTE

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Viên nang mềm

BOGANIC FORTE

Nhuyễn gan - lợi mật

WHO GMP

Traphaco

Hộp 5 vỉ x 10 viên

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

án đầu 28/12/2013

Handwritten signature

THÀNH PHẦN: Cao đặc Actáo 200 mg
(Tương đương với 10 g dược liệu Actáo)
Cao đặc Rau đắng 150 mg
(Tương đương với 1 g dược liệu Rau đắng đắng)
Cao đặc Bim bim 16 mg
(Tương đương với 160 mg dược liệu Bim bim)
Tá dược 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
Phong và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, ngộ chất.
Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, táo bón.
Di ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
Vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Liều thông thường: - **Người lớn:** mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 3 lần.
- **Trẻ em trên 6 tuổi:** mỗi lần 1 viên, ngày 2 - 3 lần.

Soft capsule

BOGANIC FORTE

Hepatobiliary tonic

WHO GMP

Traphaco

5 blisters x 10 soft capsules

Soft capsule

BOGANIC FORTE

Hepatobiliary tonic

5 blisters x 10 soft capsules

TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XỬ LÝ TAY TRỊ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Văn Bình - Bắc Kinh - Hà Nội
Tel: (84-4) 36510724 / Fax: (84-4) 36511643
Tư vấn khách hàng: 18006612
Số 1 Xuân Yên - Ngõ 15, Đường Nguyễn Hữu
Hoàng - Láng - Phường Mai - Hà Nội

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

KT hộp: 125 mm x 56 mm x 73 mm



KT vỉ: 106 mm x 61 mm. Số lô SX và HD in dập nổi trên vỉ.



MÀU HỘP VIÊN NANG MỀM BOGANIC (Hộp 2 vỉ)

Viên nang mềm
BOGANIC FORTE
 Nhuận gan - lợi mật
 BẮC QUẬN
 Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Viên nang mềm

BOGANIC FORTE

Nhuận gan - lợi mật





Hộp 2 vỉ x 10 viên

THÀNH PHẦN:
 Cao độc Actisô 200 mg
(Tương đương với 10 g dược liệu Actisô)
 Cao độc Rau đắng đất 150 mg
(Tương đương với 1 g dược liệu Rau đắng đất)
 Cao độc Bim bim 16 mg
(Tương đương với 160 mg dược liệu Bim bim)
 Tà dược vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:
 - Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
 - Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
 - Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón.
 - Di ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
 - Vừa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.

Soft capsule

BOGANIC FORTE

Hepatobiliary tonic





2 blisters x 10 soft capsules

LIỀU DỤNG - CÁCH DỤNG: *Liều thông thường:*
 - Người lớn: mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.
 - Trẻ em trên 8 tuổi: mỗi lần 1 viên, ngày 2-3 lần.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810734 / Fax: (84-4) 36811542
 Tư vấn khách hàng: 18006612
 Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

SĐK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

TÁC DỤNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
 Xem tờ rơi hướng dẫn sử dụng.

KT hộp: 125 mm x 27 mm x 73 mm



KT vỉ: 106 mm x 61 mm. Số lô SX và HD in dập nổi trên vỉ.



MAU HỘP VIÊN NANG MỀM BOGANIC (Hộp 1 vỉ)

Viên nang mềm Hộp 1 vỉ x 10 viên

BOGANIC FORTE

Nhuận gan - lợi mật




Traphaco

BOGANIC FORTE
Nhuận gan - lợi mật

Hộp 1 vỉ x 10 viên nang mềm

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Viên nang mềm

BOGANIC FORTE

Nhuận gan - lợi mật

THÀNH PHẦN:

Cao đặc Actisô	200 mg
<i>(Tương đương với 10 g dược liệu Actisô)</i>	
Cao đặc Rau đắng đất	150 mg
<i>(Tương đương với 1 g dược liệu Rau đắng đất)</i>	
Cao đặc Bìm bìm	16 mg
<i>(Tương đương với 160 mg dược liệu Bìm bìm)</i>	
Tã dược	vừa đủ
..... 1 viên	

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem toa hướng dẫn sử dụng.

CHỈ ĐỊNH:

- Suy giảm chức năng gan, đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, vàng da, khó tiêu, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Dự ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do bệnh gan gây ra.
- Vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

- Liều thông thường:**
- **Người lớn:**
Mỗi lần 1-2 viên, ngày 3 lần.
 - **Trẻ em trên 8 tuổi:**
mỗi lần 1 viên, ngày 2-3 lần.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội Tel: (84-4) 36810724 / Fax: (84-4) 36811542
Tư vấn khách hàng: 18006612
Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

SDK:

Số lô SX:

NSX:

HD:

M

Hộp 1 vỉ x 10 viên nang mềm

BOGANIC FORTE
Nhuận gan - lợi mật

KT hộp: 73 mm x 125 mm x 22 mm



KT vỉ: 106 mm x 61 mm. Số lô SX và HD in dập nổi trên vỉ.



Hồ sơ đăng ký Viên nang mềm Boganic Forte đăng ký sx Traphaco Hoàng Liệt

Địa hướng dẫn sử dụng

BOGANIC Forte

Nhuận gan – Lợi mật – Thông tiểu – Giải độc

Trình bày: Hộp 1 vi, 2 vi, 5 vi x 10 viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao đặc Actisô (<i>Extractum Cynarae scolymi</i>) (tương đương với 10 g dược liệu Actiso)	200 mg
Cao đặc Rau đắng đất (<i>Extractum Glini oppositifolii</i>) (tương đương với 1 g dược liệu Rau đắng đất)	150 mg
Cao đặc Bìm bìm (<i>Extractum Pharbitidis</i>) (tương đương với 160 mg dược liệu Bìm bìm)	16 mg
Tá dược (Gelatin, glycerin, sorbitol, lecithin, sáp ong trắng, aerosil, dầu đậu nành, palm oil, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt nâu, nipagin, nipasol, ethyl vanillin, nước tinh khiết)	Vừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG:

Actiso (*Cynara scolymus*) chứa các dược chất chính Cynarin, các polyphenol, đường inulin, muối khoáng. Cynarin có tác dụng tăng mật, tăng lực, kích thích ăn ngon, trợ tim, lợi tiểu, chống độc. Các polyphenol có tác dụng giảm cholesterol huyết, bảo vệ gan. Insullin cho người bị bệnh đái đường. Actiso được dùng để chữa: suy giảm chức năng gan, chứng vàng da, cholesterol huyết cao, vữa xơ động mạch.

Rau đắng đất (*Glinus oppositifolius*): chứa spergulagenin A - một sapogenin triterpenoid bão hòa, trihydroxy cetone; có tác dụng lợi tiêu hóa, kháng sinh, lợi tiểu và nhuận gan.

Bìm Bìm (*Pharbitis nil*): chứa glucosid là pharbitin, có tá dụng nhuận tràng, thông tiểu, sát trùng.

Sự phối hợp của 3 vị thuốc làm tăng hiệu lực và tác dụng:

Nhuận gan- lợi mật- thông tiểu- giải độc

CHỈ ĐỊNH:

- Suy giảm chức năng gan đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.
- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.
- Viêm gan gây mệt mỏi, khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mề đay do gan gây ra.
- Vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.

LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:

Liều thông thường:

Người lớn: Mỗi lần 1- 2 viên, ngày 3 lần

Trẻ em trên 8 tuổi: mỗi lần 1 viên, ngày 2- 3 lần.



Hồ sơ đăng ký Viên nang mềm Boganic Forte đăng ký sx Traphaco Hoàng Liệt

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người bị viêm tắc mắt.
- Người tỳ vị hư hàn (phân lỏng nát hoặc tiêu chảy).

Ghi chú: Đối với người tiểu đường có thể dùng viên Boganic bao phim hoặc Boganic nang mềm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Khanh

