

CORTONYL[®] OPC

CÔNG THỨC:

Natri camphosulfonat.....2,5g
 Lạc tiên (*Herba Passiflorae foetidae*).....5,0g
 Tá dược (acid benzoic, đường trắng, ethanol 96%, nước tinh khiết)...vd 25ml

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Natri camphosulfonat là dẫn chất của Camphor, có ưu điểm là dễ tan trong nước, cùng với Lạc tiên được bào chế thành dạng thuốc nước nên nhanh chóng được hấp thu qua ống tiêu hóa sau khi uống.

DƯỢC LỰC HỌC:

Natricamphosulfonat có tác dụng kích thích hô hấp và trợ tim do cơ chế kích thích thần kinh trung ương (ưu tiên trên hành não).

Lạc tiên thường được dùng dưới dạng thuốc sắc, cao lỏng, siro hoặc cồn thuốc có tác dụng an thần, gây ngủ, giảm đau đầu, chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngủ hay mơ, hồi hộp.

CHỈ ĐỊNH:

Trợ tim, ngất do suy tim.
 Mất ngủ, lao lực, an thần.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 20-50 giọt pha với khoảng 30ml nước.
 Trẻ em: ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 10-15 giọt pha với khoảng 15ml nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người đang lái xe, vận hành máy móc.
 Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Cần tham khảo ý kiến thầy thuốc khi dùng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc có tác dụng an thần, không được dùng cho người đang lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Có thể có buồn nôn, nôn, đau bụng.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Cho đến nay, chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Triệu chứng quá liều Lạc tiên: Nhức đầu, choáng váng, rối loạn thị giác.
 Triệu chứng quá liều Natricamphosulfonat: buồn nôn, nôn, nhức đầu, cảm giác nóng sốt, lẫn lộn, mê sảng, co giật, hôn mê, khó thở, suy hô hấp.
 Phương pháp cấp cứu ngộ độc là các biện pháp điều trị triệu chứng và chăm sóc hỗ trợ.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY: Thuốc nước. Hộp 1 chai 25ml.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
 ĐT: 08.37517111 - 08.38778899 Fax: 08.38752048

Sản xuất tại Nhà Máy Dược Phẩm OPC

Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
 Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com

Cortonyl/DK-14/AL-01/17