


Tài liệu cho công chúng



# Cystine B6 BAILLEUL

## Điều trị các vấn đề bệnh lý liên quan RỤNG TÓC và loạn dưỡng MÓNG

BÚM  
20/01/2016



**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nén bao phim chứa: L-Cystin 500 mg. Pyridoxin hydrochlorid 50 mg. Tá dược: Natri carboxymethyl-cellulose, bột talc, cellulose vi tinh thể (Avicel PH 102<sup>®</sup>), magnesi stearat, Sepifilm LP 010, Sepisperse AP 3083 vàng, sáp carnauba.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nén bao phim. **CHỈ ĐỊNH:** Cystine B6 Bailleul được chỉ định trong: Mọi vấn đề bệnh lý liên quan đến tóc: rụng tóc, tóc chẻ, tóc dễ gãy... Đặc biệt, rụng tóc tùng mảng, rụng tóc lan tỏa cấp tính (sau sang chấn, phẫu thuật, nhiễm trùng, hậu sản, dùng một số thuốc), rụng tóc do nội tiết tố nam. Loạn dưỡng móng: móng dễ gãy, móng quá mềm, móng bị tách đỏi, móng mọc chậm... Ngoài ra, cũng nên dùng trong nấm móng vì thuốc làm móng mọc nhanh hơn, giúp tăng hiệu quả của thuốc kháng nấm. Chậm liền seo giác mạc. **LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:** **Liều dùng:** Chia làm 2 lần trong ngày, dùng trong 2-3 tháng (thời gian cần thiết về phương diện sinh lý học để lông, tóc, móng mọc lại). Trẻ em cân nặng dưới 15kg: 1 viên mỗi ngày. Trẻ em cân nặng trên 15kg: 2 viên mỗi ngày. Người lớn: 4 viên mỗi ngày. **Trong rụng tóc do nội tiết tố nam** (chứng rụng tóc thường gặp nhất, chiếm tỉ lệ đến 90%; có thể gặp ngay cả ở phụ nữ): 4 viên mỗi ngày, trong 2 tháng liên tục và nghỉ 1 tháng, hoặc dùng 15 ngày mỗi tháng. **Cách dùng:** Nuốt viên thuốc với nhiều nước, dùng trong khi ăn. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Cystin niệu. Kết hợp Cystine B6 Bailleul với Levodopa. **THẨM TRỌNG KHI DÙNG:** Không có lưu ý gì đặc biệt. **TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC:** Chống chỉ định kết hợp Cystine B6 Bailleul với Levodopa, do tác động của Levodopa bị pyridoxin ức chế nếu dùng Levodopa không có sự hiện diện của chất ức chế men dopadecarboxylase ngoại biên. **MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:** Nói chung luôn luôn hỏi ý kiến bác sĩ hay được sĩ trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào nếu bạn đang có thai hay cho con bú. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **QUÁ LIỀU:** Chưa có báo cáo về dùng quá liều Cystine B6 Bailleul. **Khuyến cáo:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp thuốc. Để xa tầm tay trẻ em. **Bảo quản:** Bảo quản thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C, để nơi khô ráo và tránh ánh sáng. **Hạn dùng:** 60 tháng kể từ ngày sản xuất. **NHÀ SẢN XUẤT:** Laboratoires GALÉNIQUES VERNIN. 20 rue Louis Charles Vernin. 77190 Dammarie – Les – Lys – Pháp.



VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

Lầu 4, Tòa nhà C, 150 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7  
Tel : 84. 8. 54 135 188 - Fax : 84. 8. 54 135 185

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của CQLD/BYT: ..... Ngày in tài liệu: .....

Nhà nhập khẩu & phân phối: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ  
04 Lô A Trường Sơn, P. 15, Q. 10, TP. HCM  
Tel: 84. 8. 39 703 69

# Cystine B6 BAILLEUL

**Thành phần:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

L-cystin . . . . .	500,00 mg
Pyridoxin hydrochlorid . . . . .	50,00 mg
Tá dược: Natri carboxymethylcellulose, bột talc, cellulose vi tinh thể (Avicel PH 102 <sup>®</sup> ), magnesi stearat, sepifilm LP 010, Sepisperse AP 3083 vàng, sáp carnauba.	

**Dạng bào chế của thuốc:** Viên nén bao phim

**Quy cách đóng gói:** Hộp chứa 1 vỉ ép nhiệt PVC/nhôm × 20 viên nén bao phim.

**Chỉ định:** Cystine B6 Bailleul được chỉ định trong:

- Mọi vấn đề bệnh lý liên quan đến tóc: rụng tóc, tóc chẽ, tóc dễ gãy... đặc biệt, rụng tóc từng mảng, rụng tóc lan tỏa cấp tính (sau sang chấn, phẫu thuật, nhiễm trùng, hậu sản, dùng một số thuốc), rụng tóc do nội tiết tố nam.
- Loạn dưỡng móng: móng dễ gãy, móng quá mềm, móng bị tách đôi, móng mọc chậm... Ngoài ra, cũng nên dùng trong nấm móng vì thuốc làm móng mọc nhanh hơn, giúp tăng hiệu quả của thuốc kháng nấm.
- Chậm liền sẹo giác mạc.

**Liều dùng, cách dùng, đường dùng:**

- Đường dùng: đường uống
- Liều dùng: chia làm 2 lần trong ngày, dùng trong 2 – 3 tháng (thời gian cần thiết về phương diện sinh lý học để lông tóc móng mọc lại)
  - Trẻ em cân nặng dưới 15 kg: 1 viên mỗi ngày.
  - Trẻ em cân nặng trên 15 kg: 2 viên mỗi ngày.
  - Người lớn: 4 viên mỗi ngày.
  - Trong rụng tóc do nội tiết tố nam (chứng rụng tóc thường gặp nhất, chiếm tỉ lệ đến 90%; có thể gặp ngay cả ở phụ nữ): 4 viên mỗi ngày, trong 2 tháng liên tục và nghỉ 1 tháng hoặc dùng 15 ngày mỗi tháng.
- Cách dùng: nuốt viên thuốc với nhiều nước, dùng trong khi ăn..

**Chống chỉ định**

- Cystin niệu.
- Kết hợp Cystine B6 Bailleul với levodopa.

**Thận trọng khi dùng thuốc:** Không có lưu ý gì đặc biệt.

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang cho con bú**

Nói chung, luôn nên hỏi ý kiến bác sĩ hay được sĩ trước khi uống bất cứ loại thuốc nào nếu bạn đang có thai hay cho con bú.

**Sử dụng cho người đang vận hành máy, đang lái tàu, xe...:** Không có

**Tương tác thuốc:**

Chống chỉ định kết hợp Cystine B6 Bailleul với levodopa: do tác động của Levodopa bị Pyridoxin ức chế nếu dùng Levodopa không có sự hiện diện của chất ức chế men dopadecarboxylase ngoại biên.

**Tác dụng không mong muốn:**

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**Các đặc tính dược lực học:**

Thuốc cung cấp acid amin chứa lưu huỳnh và Vitamin B6.

**Các đặc tính dược động học:** Chưa có dữ liệu.

**Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo về dùng quá liều Cystine B6 Bailleul.

**Khuyến cáo:**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp thuốc.

**ĐỀ XÁ TÀM TAY TRẺ EM.**

**Điều kiện bảo quản thuốc:**

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ không quá 30oC, để nơi khô ráo và tránh ánh sáng.

**Hạn dùng của thuốc:** 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng của Nhà sản xuất:

**LABORATORIES GALÉNIQUES VERNIN**

20, rue Louis Charles Vernin

77190 Dammarie-Les-Lys - France