

HOASTEX®

Sirô Thuốc

CÔNG THỨC:	gói 5ml	chai 90ml
Húng chanh (<i>Folium Plectranthi amboinici</i>).....	2,500g	45,00g
Núc nác (<i>Cortex Oroxyli</i>).....	0,625g	11,25g
Cineol (<i>Cineolum</i>).....	4,650mg	83,70mg
Tá dược (đường trắng, natri benzoat, polysorbat 80).....	vd 5ml	vd 90ml

CÔNG NĂNG: Hoastex có chứa các thành phần như sau.

Húng chanh: vị the cay, hơi chua, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng lợi phế, trừ đàm, giải cảm, làm ra mồ hôi, thoái nhiệt, tiêu độc. Thành phần chứa chủ yếu là tinh dầu và các flavon có tác dụng ức chế mạnh sự phát triển của các vi khuẩn, đặc biệt là một số vi khuẩn gây bệnh ho như phế cầu khuẩn và tụ cầu khuẩn vàng. Thường dùng chữa cảm cúm, sốt, ho, viêm họng, viêm phế quản, hen, ho gà, khản tiếng.

Núc nác: vị đắng, tính mát, có tác dụng giải nhiệt, tiêu độc, sát trùng, lợi phế, giảm ho, giảm đau. Thành phần có chứa chủ yếu là các flavonoid có tính kháng khuẩn, kháng viêm, kháng dị ứng. Thường dùng chữa viêm họng, hen, ho khản tiếng.

Cineol: có tác dụng sát khuẩn, chữa ho, cảm cúm, viêm nhiễm đường hô hấp.

CHỈ ĐỊNH:

Trị ho. Giảm ho trong viêm họng, viêm phế quản, viêm khí quản... (viêm đường hô hấp).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ sơ sinh đến dưới 2 tuổi: mỗi lần uống 2-5ml hoặc ½ gói - 1 gói 5ml, ngày uống 3 lần.

Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi: mỗi lần uống 5-10ml hoặc 1 - 2 gói 5ml, ngày uống 3 lần.

Trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn: mỗi lần uống 15ml hoặc 3 gói 5ml, ngày uống 3 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Không.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Được sử dụng.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Cho đến nay, chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không mong muốn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Cho đến nay, chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về dùng thuốc quá liều.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY: Sirô thuốc.

Hộp 1 chai thủy tinh 90ml; Hộp 30 gói 5ml.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.37517111 - 08.38778899 Fax: 08.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC

Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com