

Bequantene 100mg
Dexpanthenol (Vitamin B5) 100mg

GMP WHO

Bequantene 100mg

Dexpanthenol (Vitamin B5) 100 mg

2 vỉ x 10 viên nén

MEDIPLANTEX

GMP WHO

Bequantene 100mg
Dexpanthenol (Vitamin B5) 100 mg

GMP WHO

Thành phần: Mỗi viên chứa
Dexpanthenol (Vitamin B5).....100 mg
Tá dược.....vừa đủ 1 viên nén

Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Bequantene 100mg
20 Tablets

Composition: Each tablet contains
Dexpanthenol (Vitamin B5).....100 mg
Excipientsq.s.f 1 tablet

Indication, contra- indication, dosage, administration and other informations:
See the leaflet enclosed

Specification: Manufacturer's

Storage: Stored in a dry place, protected from light, below 30°C

**KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY DIRECTION BEFORE USE**

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Bequantene 100mg

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK/Reg. No:

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
358 đường Giải phóng, Hà nội, Việt nam
SX tại NM DP số 2: Trung Hậu, Tiến Phong, Mê Linh, Hà Nội



Bequantene [®] 100mg Dexpanthenol	Bequantene [®] 100mg Vitamin B5	Bequantene [®] 100mg Dexpanthenol	Bequantene [®] 100mg Vitamin B5
Bequantene [®] 100mg Vitamin B5	Bequantene [®] 100mg Dexpanthenol	Bequantene [®] 100mg Vitamin B5	Bequantene [®] 100mg Dexpanthenol
Bequantene [®] 100mg Dexpanthenol	Bequantene [®] 100mg Vitamin B5	Bequantene [®] 100mg Dexpanthenol	Bequantene [®] 100mg Vitamin B5

Hà nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 5/1/9/2016

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

TỔNG GIÁM ĐỐC
THS. Phùng Minh Dũng

Rx Thuốc bán theo đơn

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Viên nén BEQUANTENE

Thành phần: mỗi viên có chứa

Dexpanthenol100,0 mg

Tá dược: Aerosil, tinh bột sắn, lactose, tricalci phosphat, natri starch glycolat, eratab, polyvinyl pyrrolidon, magnesi stearat, talc, croscarmellose natri vừa đủ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nén

Dược lực học:

- Dexpanthenol được chuyển hóa trong cơ thể thành acid pantothenic. Acid pantothenic là tiền chất của coenzym A cần cho phản ứng acetyl- hóa (hoạt hóa nhóm acyl) trong tân tạo glucose, giải phóng năng lượng từ carbohydrat, tổng hợp và thoái biến acid béo, tổng hợp sterol và nội tiết steroid, porphyrin, acetylcholin và những hợp chất khác. Dexpanthenol cũng cần thiết cho chức năng bình thường của biểu mô.

- Khi gây thiếu hụt acid pantothenic thực nghiệm (bằng cách dùng acid omega methylpantothenic, một chất đối kháng chuyển hóa, hoặc bằng chế độ ăn không có acid pantothenic) ta thấy các triệu chứng như ngủ gà, mệt mỏi, nhức đầu, dị cảm ở chân và tay kèm theo tăng phản xạ và yếu cơ chi dưới, rối loạn tiêu hóa, thay đổi tính khí và tăng nhạy cảm với nhiễm khuẩn.

Dược động học:

- Dexpanthenol là dẫn chất alcol của acid D-pantothenic.

- Sau khi uống Dexpanthenol dễ dàng chuyển hóa thành acid pantothenic, chất này phân bố rộng rãi trong mô cơ thể, chủ yếu dưới dạng co enzym A. Nồng độ cao nhất thấy trong gan, tuyến thượng thận, tim, thận. Sữa người mẹ cho con bú, ăn chế độ bình thường, chứa khoảng 2 microgam acid pantothenic trong 1ml.

- Khoảng 70% liều acid pantothenic uống thải trừ ở dạng không đổi trong nước tiểu và khoảng 30% trong phân.

Chỉ định:

- Điều trị chứng rụng tóc lan tỏa (hói)

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn: 3 viên/ngày, uống trong 6 tuần

Chống chỉ định:

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Rất hiếm gặp các biểu hiện dị ứng ở da.

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải trong khi sử dụng thuốc.

Thận trọng:

Dexpanthenol có thể kéo dài thời gian chảy máu nên phải sử dụng rất cẩn trọng ở người bệnh ưa chảy máu hay có nguy cơ chảy máu khác.

- Thuốc có chứa lactose monohydrate: bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu men Lactase Lapp hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này.

Thời kỳ có thai và đang cho con bú:

- Thời kỳ có thai: Không có dữ liệu báo cáo tin cậy về khả năng gây quái thai ở động vật. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy: hiện nay chưa có báo cáo về khả năng gây dị dạng hay gây hại đến sự hình thành bào thai. Tuy nhiên, việc theo dõi ảnh hưởng của thuốc đối với phụ nữ có thai phơi nhiễm với thuốc này là không đủ để loại bỏ bất kỳ nguy cơ nào.

Do đó, tốt hơn là không sử dụng thuốc này trong thai kỳ.

- Phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có dữ liệu về việc sử dụng thuốc cho con bú, do đó tốt hơn không nên dùng trong thời kỳ cho con bú.

Tương tác thuốc:

- Không dùng Dexpanthenol cùng với hoặc trong vòng 12 giờ sau khi dùng neostigmin hoặc những thuốc tác dụng giống thần kinh đối giao cảm khác. Tuy không quan trọng về mặt lâm sàng, nhưng tác dụng co đồng tử của các chế phẩm kháng cholinesterase dùng cho mắt (ví dụ như ecothiopat iodid, isofluorophat) có thể tăng lên do acid pantothenic.

- Không dùng Dexpanthenol trong vòng 1 giờ sau khi dùng succinylcholin, vì Dexpanthenol có thể kéo dài tác dụng gây giãn cơ của succinylcholin.

Quá liều xử trí: Chưa có thông tin

Người lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên.

Hạn dùng: 36 tháng

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ bán theo đơn của bác sỹ

Để xa tầm tay trẻ em

Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của thầy thuốc

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTECH

358 Giải Phóng -Phường Liệt-Thanh Xuân- Hà Nội

SX tại: Trung Hậu- Tiền Phong -Mê Linh- Hà Nội



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Đ. Minh Hùng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Hà Luân Sơn