

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

1, Nhãn hộp

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/02/2018

Hy

Đảm bảo: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
Tiêu chuẩn: TCS

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HD:

MÁT GAN - TIÊU ĐỘC

TIOGA

Hộp 2 vỉ x 20 viên bao đường



Nguyên gốc thảo dược

GMP - WHO

Rx Thuốc kê đơn

TIOGA
MÁT GAN - TIÊU ĐỘC

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Đ/c: 93 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 024.37666912 - Fax: 024.37666914

Chỉ định:
- Mất gan, rối loạn trong các trường hợp: Viêm gan, xơ gan, chức năng gan yếu.
- Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm dùng trị mụn nhọt, mụn ngứa, phát ban, rôm sảy...
- Chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các thông tin khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Thành phần: 162 mg cao khô lượng tương đương với:	
- Acteosol	10,33 mg
- đường với 110mg là tủa Acteosol	1,0 g
- Tinh dầu	0,54 g
- Hoa	0,25 g
- Nước	0,17 g
- Chất khác	1 viên

Rx Thuốc kê đơn

TIOGA
MÁT GAN - TIÊU ĐỘC

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Đ/c: 93 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội
ĐT: 024.37666912 - Fax: 024.37666914

GMP - WHO

Hộp 2 vỉ x 20 viên bao đường

2, Nhãn vỉ

TIOGA **TIOGA** **TIOGA**

MÁT GAN - TIÊU ĐỘC CN CÔNG TY CPDP TRƯỜNG THỌ MÁT GAN - TIÊU ĐỘC

SDK: SDK: SDK:

TIOGA **TIOGA** **TIOGA**

CPDP TRƯỜNG THỌ MÁT GAN - TIÊU ĐỘC CN CÔNG TY CPDP TRƯỜNG THỌ M

SDK: SDK: SDK: S

TIOGA **TIOGA** **TIOGA**

MÁT GAN - TIÊU ĐỘC CN CÔNG TY CPDP TRƯỜNG THỌ MÁT GAN - TIÊU Đ

SDK: SDK: SDK: SD

TIOGA **TIOGA** **TIOGA**

CPDP TRƯỜNG THỌ MÁT GAN - TIÊU ĐỘC CN CÔNG TY CPDP TRƯỜNG THỌ MÁ

SDK: SDK: SDK: SDK

HD:

Số lô SX:



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

GMP - WHO

Viên bao đường

TIOGA

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo cho ngay bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thuốc bán theo đơn

1. Tên sản phẩm: TIOGA

2. Thành phần, hàm lượng của thuốc:

Mỗi viên chứa 162 mg cao khô dược liệu tương đương với: (Cao đặc actisô 33,33 mg (tương đương 1166 mg lá tươi Actisô), Sài đất 1,0 g, Thương nhĩ tử 0,34 g, Kim ngân hoa 0,25 g, Hạ khô thảo 0,17 g).

Tá dược: Amidon, lactose, avicel, sodium starch glycolat, aerosil, PVP K30, magnesi stearat, đường trắng, calci carbonat, bột talc, titan dioxyd, sắt nâu oxyd, sắt đỏ oxyd, parafin rắn, nipagin, nipasol.

3. Mô tả sản phẩm: Viên nén bao đường màu nâu, nhân bên trong màu nâu xám, mùi dược liệu, vị ngọt đắng sau hơi chua.

4. Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?

Thuốc dùng trong các trường hợp sau:

- Viêm gan, xơ gan, chức năng gan yếu.
- Mụn nhọt, mẩn ngứa, phát ban, rôm sảy...

6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng: Dùng đường uống:

- Người lớn: Uống 2-3 viên/lần, ngày 2-3 lần.
- Trẻ em: Uống 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?

- Không dùng thuốc cho người tỳ vị hư hàn, ỉa chảy, người viêm tắc mật, người đái tháo đường.

8. Tác dụng không mong muốn?

Chưa có tài liệu ghi nhận

9. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Chưa có tài liệu ghi nhận.

10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Uống ngay khi nhớ ra

11. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30⁰C.

12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có tài liệu ghi nhận.

13. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Nếu có bất thường nên đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, chăm sóc.

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Chưa có báo cáo.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ:

Nếu có bất thường nên đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, chăm sóc.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

16. Hạn dùng của thuốc:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

17. Tên, địa chỉ, biểu tượng của cơ sở sản xuất:

Chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

93 Linh Lang – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 02437666912

Fax: 02437666914

Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ

Lô M1 – đường N3 – KCN Hòa Xá – TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định

Biểu tượng nhà sản xuất:



18. Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

010
C
C
D
D
T
R
I
D

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

GMP - WHO

Viên bao đường

TIOGA

Tên thuốc: TIOGA

Thành phần:

Cao khô dược liệu	162 mg	
Trương đương với:		
Cao đặc actisô (<i>Extractum Cynrae spissum</i>) (trương đương lá tươi Actisô)	33,33 mg (1166 mg)	N
Sài đất (<i>Herba Wedeliae</i>)	1,0 g	
Thương nhĩ tử (<i>Fructus Xanthii strumarii</i>)	0,34 g	
Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>)	0,25 g	
Hạ khô thảo (<i>Spica Prunellae</i>)	0,17 g	

Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tá dược gồm: Amidon, lactose, avicel, sodium starch glycolat, aerosil, PVP K30, magnesi stearat, đường trắng, calci carbonat, bột tale, titan dioxyd, sắt nâu oxyd, sắt đỏ oxyd, parafin rắn, nipagin, nipasol.

Dạng bào chế: Viên bao đường.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên.

Chỉ định:

- Mát gan, lợi mật dùng trong các trường hợp: Viêm gan, xơ gan, chức năng gan yếu.
- Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm dùng trị mụn nhọt, mẩn ngứa, phát ban, rôm sảy...

Cách dùng và liều dùng:

- Người lớn: Uống 2 - 3 viên/lần, 2 - 3 lần/ ngày.
- Trẻ em: Uống 1 - 2 viên/lần, 2 - 3 lần/ ngày.

Chống chỉ định:

- Không dùng thuốc cho người tỳ vị hư hàn, ỉa chảy, người viêm tắc mật, người đái tháo đường.

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có báo cáo.

Kiêng kỵ: Chưa có báo cáo.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có báo cáo

Tác dụng không mong muốn: Hiện tại chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy thuốc có hiện tượng bạc màu, hồng hoặc có những dấu hiệu khác lạ và báo ngay cho nhà sản xuất biết.

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

776
NG T
PH
C PH
NG
4 - 1



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THỌ
Lô M1 – đường N3 – KCN Hòa Xá – TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3670733

Fax: 0228.3671098

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Handwritten mark



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

