

## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

### LEGALON® 70 PROTECT MADAUS

#### Viên nang

Hoạt chất: Cao khô của quả cây Silybummarianum.

**Đọc tất cả tờ hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi dùng thuốc vì nó chứa thông tin quan trọng cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc thêm hoặc cần thêm lời khuyên xin hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.**

- Hãy giữ tờ hướng dẫn sử dụng này. Bạn có thể cần đọc lại nó.
- Bạn phải đến gặp bác sĩ nếu các triệu chứng xấu đi hoặc không cải thiện.

#### Thành phần

1 viên nang chứa 86,50-93,35 mg cao khô của cây Silybummarianum (36-44:1), tương ứng với 54,1 mg silymarin (HPLC), được tính dưới dạng silibinin (dung môi chiết : ethyl acetat).

Tá dược: Povidon, mannitol, polysorbat 80, tinh bột natri glycolat (type A), magnesi stearat, oxid sắt màu đỏ E 172, oxid sắt màu đen E 172, titan dioxit E 171, gelatin, natri laurilsulfat.

#### Chỉ định

LEGALON® 70 PROTECT MADAUS là một dược thảo dùng để điều trị bệnh về gan. Nó được dùng điều trị hỗ trợ trong tổn thương gan do nhiễm độc ở những bệnh nhân bị bệnh viêm gan mạn tính hoặc xơ gan.

Lưu ý: Điều trị bằng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS chỉ hữu ích khi loại trừ được chất độc gây tổn thương gan (ví dụ rượu).

#### Chống chỉ định

##### Không được dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS

Nếu bạn bị quá mẫn cảm (dị ứng) với quả cây Silybummarianum hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

#### Thận trọng

##### Lưu ý đặc biệt khi dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS

Việc điều trị bằng thuốc này không phải là biện pháp thay thế để tránh khỏi nguyên nhân gây tổn thương gan (ví dụ rượu).

Hỏi ý kiến bác sĩ nếu thấy vàng da (da nhuộm màu vàng nhẹ đến vàng sẫm, lòng trắng mắt đổi màu vàng).

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng thuốc này cho trẻ em. Vì vậy, không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

##### Dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS với thức ăn và thức uống

Không có hạn chế đặc biệt.

##### Phụ nữ có thai

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS cho phụ nữ có thai. Vì vậy, trong trường hợp này không nên dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS.

##### Cho con bú

Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS cho phụ nữ cho con bú. Vì vậy, trong trường hợp này không nên dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS.

##### Lái xe và sử dụng máy móc

Không có hạn chế đặc biệt.

##### Đang dùng thuốc khác

Xin thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn đang dùng hoặc mới đây đã dùng bất kỳ thuốc nào khác, ngay cả những thuốc không phải do kê đơn.

##### Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

Chưa được biết.



### **Liều dùng và cách dùng**

Phải luôn dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS chính xác như bác sĩ đã chỉ dẫn cho bạn. Bạn nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không biết chắc.

Liều thường dùng là 2 viên nang, 3 lần/ ngày, tương ứng với 420 mg silymarin.

Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn có ấn tượng là tác dụng của LEGALON® 70 PROTECT MADAUS quá mạnh hoặc quá yếu.

Đường dùng: Đường uống

### **Quá liều và xử trí**

Cho đến nay chưa rõ các dấu hiệu quá liều hoặc ngộ độc. Các tác dụng phụ có thể tăng lên. Nếu cần, hãy để bác sĩ của bạn quyết định biện pháp điều trị triệu chứng.

### **Nếu bạn quên dùng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS**

Không được dùng một liều gấp đôi để bù cho các liều đơn đã quên.

### **Tác dụng khi việc điều trị bằng LEGALON® 70 PROTECT MADAUS bị ngừng lại:**

Chưa được rõ.

### **Tác dụng không mong muốn**

Giống như tất cả các thuốc, LEGALON® 70 PROTECT MADAUS có thể có các tác dụng phụ.

Trong trường hợp hiếm gặp đã ghi nhận rối loạn tiêu hóa, ví dụ như tác dụng nhuận trường nhẹ. Phản ứng quá mẫn cảm rất hiếm gặp như ban hoặc khó thở có thể xảy ra; trong trường hợp như thế ngừng điều trị và đến gặp bác sĩ.

**Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào không được đề cập trong tờ hướng dẫn này xin thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.**

### **Bảo quản LEGALON® 70 PROTECT MADAUS**

Bảo quản dưới 30°C

Đề thuốc xa tầm tay của trẻ em.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

### **Hạn dùng**

60 tháng kể từ ngày sản xuất

### **Quy cách đóng gói**

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Hộp 6 vỉ x 10 viên nang

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

### **Nhà sản xuất**

MADAUS GmbH

Trụ sở chính: 51101 Cologne, Germany.

Nhà máy sản xuất: Luetticher Strasse 5, 53842, Troisdorf, Germany.

Tel.: +49 221 8998-0

Telefax: +49 221 8998-701

E-mail: [info@rottapharm-madaus.de](mailto:info@rottapharm-madaus.de)

Ngày hiệu chỉnh tờ hướng dẫn sử dụng: 20/06/2014



TUQ. CỤC TRƯỞNG  
P.TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Huy Hùng*

