

PM Joint - Care

Thành phần: mỗi viên nang có chứa

Glucosamin Sulfate potassium chloride	500mg
tương đương 375mg Glucosamine Sulfate, tương đương 295mg Glucosamine	
Lecithin	35mg
<i>Cao khô tương đương với:</i>	
Grapeseed (Vitis vinifera) seed (Hạt Nho)	1000mg
Green Tea (Camellia sinesis) leaf (Lá Trà Xanh)	250mg

Không đường, tinh bột, bột men, lactose, gluten, màu thực phẩm, hương liệu

Hình dạng thuốc: Viên nang cứng

Đóng gói: 12 viên/vi; 60 viên/hộp.

Chỉ định: Giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

Liều dùng: Dùng cho người trên 18 tuổi: uống 2 viên/lần, 2-3 lần/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: không dùng trong thời gian này.

Sử dụng quá liều: Ở liều rất cao, Glucosamine có thể gây ra sự rối loạn trong tiêu hóa, ví dụ như phân lỏng, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Nếu gặp hiện tượng này nên ngừng dùng thuốc và chờ cho hết những triệu chứng này trước khi sử dụng tiếp thuốc ở đúng liều chỉ định.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: chưa thấy có.

Thận trọng: Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng PM Joint-Care. Nếu triệu chứng không cải thiện, phải hỏi ý kiến bác sĩ của bạn. Sản phẩm có nguồn gốc từ hải sản. Mỗi viên nang chứa 64,6mg Potassium. Những người mắc bệnh thận hoặc đang dùng thuốc tim mạch hay thuốc huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này. Để xa tầm tay trẻ em.

Tác dụng không mong muốn: Tác dụng phụ với da: có thể gây ra nổi mụn, ngứa, phát ban đỏ, chàm mề đay, đặc biệt ở những người có dị ứng với hải sản- những người có dị ứng với hải sản không nên dùng thuốc này. Ngoài ra, thuốc có chứa Glucosamin có vai trò trong việc chuyển hóa gluco, nên theo lý thuyết có thể gây ra tác dụng không mong muốn tới các bệnh nhân tiểu đường, tuy nhiên một nghiên cứu 3 năm không thấy có phản ứng phụ trong các bệnh nhân tiểu đường; nhưng nói chung dữ liệu về nhóm này trong sử dụng Glucosamine còn ít. Vì vậy các bệnh nhân tiểu đường cần có bác sỹ theo dõi khi đang sử dụng thuốc này.

Hạn dùng, bảo quản: Hạn dùng 03 năm kể từ ngày sản xuất. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C, ở nơi khô, tối và mát, xa hơi nóng và ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Số Đăng ký sản phẩm Dược phẩm tại Úc: AUST L No. 119484.

Số Đăng ký sản phẩm Dược phẩm tại Việt Nam: Visa No. VN-13000-11.

Tiêu chuẩn chất lượng: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Sản phẩm của:



PharmaMetics Products Level 28, No. 303 Collins St. Melbourne, VIC 3000 Australia

Email: info@maxbiocare.com

Website: www.maxbiocare.com

Sản xuất bởi:

Probiotec Pharma Pty Ltd. No 73-83 Cherry Lane, Laverton North VIC 3026 Australia.

