

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8/11/2013



NHÃN HỘP  
9.9.2013

Hộp 1 lọ 13 ml

Mở tại đây

SĐX: TCCL: TCCS

THUỐC NHỎ MẮT ROHTO

Chỉ định:

Mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác (thời đi: mắt tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, mắt ngứa, viêm mi, phỏng bệnh về mắt khi bôi bụi hoặc do bụi, mờ mắt rồi vào mắt, khấp phấp mắt trong khi chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, giữ ấn cho mắt.

Chống chỉ định:

Không dùng cho người bị tăng nhãn áp và mắt cảm với các thành phần của thuốc.

Liều dùng và cách dùng:

Nhỏ mắt mỗi lần 2 - 3 giọt, mỗi ngày 5 đến 6 lần.

Chú ý:

• Để thuốc ngoài tầm tay trẻ em • Đặc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng • Bảo quản nơi khô mát (dưới 30°C), tránh ánh sáng trực tiếp • Các thông tin khác để nghỉ xem trong hướng dẫn sử dụng kèm theo.



Sản xuất bởi: **CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**  
Số 14/1822, An Hòa 1/5, khu công nghiệp Việt Nam, Cầu Lộ,  
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. ĐT liên lạc: 06-30228222  
ROHTO PHARMACEUTICAL CO. LTD.  
OSAKA, JAPAN

Trụ sở chính:

Chứa Panthenol  
THUỐC NHỎ MẮT  
**NEW ROHTO**  
Mỏi mắt và xung huyết

Contains Panthenol  
**NEW ROHTO**  
FOR EYESTRAIN  
AND  
CONGESTION



NSX:  
HSD:  
Số lô SX:



Thành phần hoạt chất (Trong 13 ml):

Panthenol	13,00 mg
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6)	6,50 mg
Potassium L-Aspartate	130,00 mg
Dipotassium Glycyrrhizinate	13,00 mg
Chlorpheniramine Maleate	1,30 mg
Sodium Chondroitin Sulfate	13,00 mg
Tetrahydrozoline Hydrochloride	1,30 mg



6-27

NHÃN LỘ  
Ngày: 28/01/2013

100%



300%



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ngày: 07.02.2013



XIN ĐỌC KỸ ĐƠN NÀY TRƯỚC KHI DÙNG THUỐC. GIỮ ĐƠN ĐỂ TRA CỨU KHI CẦN.

Chứa Panthenol  
**NEW V. ROHTO**<sup>®</sup>  
THUỐC NHỎ MẮT  
TRỊ MỎI MẮT, ĐỎ MẮT VÀ GIỮ ẨM CHO MẮT.



**THÀNH PHẦN (Trong 13 ml)**

**Hoạt chất:**

Panthenol.....	13,00 mg
Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6).....	6,50 mg
Potassium L-Aspartate.....	130,00 mg
Dipotassium Glycyrhizinate.....	13,00 mg
Chlorpheniramine Maleate.....	1,30 mg
Sodium Chondroitin Sulfate.....	13,00 mg
Tetrahydrozoline Hydrochloride.....	1,30 mg

**Tá dược:** ε-Aminocaproic Acid, l-Menthol, d-Camphor, Eucalyptus Oil, Coolmint No.71212, d-Borneol, Geraniol, Benzalkonium Chloride Concentrated Solution 50, Chlorobutanol, Disodium Edetate, Sodium Chloride, Polysorbate 80, Ethanol, nước tinh khiết.

**Công thức đa hoạt tính dựa trên hỗn hợp cân bằng của 7 thành phần hoạt chất.**

Hoạt chất	Tác dụng	
• Panthenol	★ Gia tăng sự trao đổi chất của tế bào mắt.	Nuôi dưỡng mắt, giúp phòng ngừa, chữa chứng mỏi mắt.
• Vitamin B6	★ Gia tăng sự trao đổi chất của tế bào mắt.	
• Potassium L-Aspartate	★ Tăng cường và kích hoạt hô hấp mô mắt.	
• Tetrahydrozoline Hydrochloride	★ Loại trừ xung huyết kết mạc.	Đem lại đôi mắt trong sáng.
• Chlorpheniramine Maleate	★ Kháng histamin.	Làm hết ngứa mắt.
• Dipotassium Glycyrhizinate	★ Có tác dụng kháng viêm mạnh.	Hữu hiệu trong việc phòng ngừa các bệnh về mắt.
• Sodium Chondroitin Sulfate	★ Có tác dụng duy trì độ ẩm cho mắt.	

**CHỈ ĐỊNH**

Mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác (thí dụ: mù tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, mắt ngứa, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt, khắc phục tình trạng khó chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, giữ ẩm cho mắt.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Không dùng cho người bị tăng nhãn áp và mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

**LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG**

Nhỏ mắt mỗi lần 2 - 3 giọt, mỗi ngày 5 - 6 lần.

**LƯU Ý KHI SỬ DỤNG**

**1. Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng trong các trường hợp:**

- (1) Đau mắt nặng.
- (2) Có thể gây dị ứng ở những người có tiền căn dị ứng với thuốc nhỏ mắt.
- (3) Đang theo một quá trình điều trị.
- (4) Tăng nhãn áp.

**2. Trước khi dùng thuốc, chú ý:**

- (1) Dùng đúng theo liều chỉ định; nếu quá liều, có thể gây xung huyết.
- (2) Trẻ em dùng thuốc theo sự hướng dẫn của người lớn.
- (3) Không để mi mắt chạm vào miệng lọ để tránh nhiễm trùng hoặc làm vẩn đục dung dịch do các chất tiết hoặc mầm vi sinh vật. Không dùng thuốc bị đổi màu.
- (4) Không nhỏ thuốc khi đang mang kính tiếp xúc mềm.
- (5) Chỉ dùng thuốc này để nhỏ mắt.



Không để mi mắt chạm vào miệng lọ.

**3. Trong và sau khi dùng thuốc, chú ý:**

- (1) Nếu thuốc gây xung huyết mắt, ngứa, sưng, hoặc các triệu chứng khác, ngưng dùng và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
- (2) Nếu không khỏi mờ mắt hoặc các triệu chứng không cải thiện sau khi dùng, ngưng dùng và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

**4. Những lưu ý khi bảo quản và sử dụng:**

- (1) Vặn chặt nắp lọ sau khi dùng.
- (2) Bảo quản nơi khô mát (dưới 30 °C), tránh ánh nắng trực tiếp.
- (3) Để tránh nhầm lẫn và giảm chất lượng, không đựng thuốc vào chai lọ khác.
- (4) Không dùng chung lọ thuốc với người khác để tránh lây nhiễm.
- (5) Một vài hoạt chất có thể kết tinh ở miệng lọ do điều kiện bảo quản thuốc. Hãy lau miệng lọ bằng gạc sạch trước khi dùng.
- (6) Sau khi mở nắp, nên sử dụng càng nhanh càng tốt vì thuốc có thể bị lây nhiễm trong khi sử dụng.



Bảo quản nơi mát tránh ánh nắng trực tiếp.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ LÝ**

Dùng đúng liều quy định, nếu quá liều có thể gây xung huyết. Nếu xảy ra, ngưng sử dụng, và xin chỉ dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ.

**TƯƠNG TÁC THUỐC**

Trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ, tránh dùng cùng lúc với các loại thuốc nhỏ mắt khác.

**TÁC DỤNG NGOẠI Ý**

Thuốc có thể gây dị ứng như ngứa mắt, xung huyết trong một số trường hợp. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 13 ml.  
Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.  
Để xa tầm tay trẻ em.  
Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng  
(08) 3822 9322  
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00  
(trừ ngày lễ, thứ bảy, Chủ Nhật)

TCCL: TCCS



Sản xuất bởi:  
**CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**  
Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore,  
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Trụ sở chính:  
**ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD**  
OSAKA, JAPAN



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thanh*