

Zedcal®

Oral Suspension

BỔ SUNG CALCI, MAGNESI, KẼM, VITAMIN D₃

THÀNH PHẦN: Mỗi 5ml chứa:

Calcium carbonate B.P	
Tương đương với Calcium nguyên tố	150,00 mg
Magnesium Hydroxide B.P	
Tương đương với Magnesium nguyên tố	25,00 mg
Zinc Gluconate U.S.P	
Tương đương với Kẽm nguyên tố	2,00 mg
Vitamin D ₃ B.P	200,00 I.U

Tá dược: Sucrose BP, Sodium Methyl Paraben BP, Sodium Propyl Paraben BP, Sodium carboxy Methyl Cellulose BP, Aluminium Magnesium Silicate USP, dung dịch Sorbitol (70%) BP, tinh dầu cam (5 folds), Peppermint Oil BP, Polysorbate 80 BP, Sodium Hydroxide BP, Propylene glycol BP, Nước tinh khiết BP, Butylated hydroxyanisole BP, Citric acid Monohydrate BP.

MÔ TẢ: Calcium và sức khỏe.

Việc cung cấp đủ lượng calcium trong bữa ăn là cần thiết cho xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ tim, cơ và thần kinh khỏe mạnh. Calcium đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi mô, kiểm soát huyết áp và độ acid. Những người kiêng các sản phẩm từ sữa sẽ không nhận đủ lượng calcium cần thiết. Chỉ 2 muỗng cà phê đầy Zedcal cung cấp lượng Calcium nhiều hơn một ly (250 ml) sữa béo, nhưng Zedcal khác sữa là hoàn toàn không có chất béo và đường. Để sử dụng calcium một cách hiệu quả cần kết hợp với magnesium, kẽm, và vitamin D₃.

CHỈ ĐỊNH :

Zedcal là một dạng thuốc dùng bổ sung calci và các hợp chất phối hợp với calci trong thuốc dùng khi thiếu vitamin D₃ và các khoáng chất trong giai đoạn trẻ đang lớn.

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ"

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em : (1-3 tuổi) 5 ml/lần x 1 lần mỗi ngày.

Trẻ em : (4-8 tuổi) 5 ml/lần x 2 lần mỗi ngày.

Trẻ vị thành niên : (9-18 tuổi) 5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Hoặc theo chỉ định của Bác sĩ.

ZEDCAL nên dùng trước bữa ăn chính 15 – 20 phút và có thể dùng liên tục khi cần thiết.

TÁC DỤNG PHỤ: Thuốc này thì an toàn và gần như không gây tác dụng không mong muốn.

"Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

THẬN TRỌNG : Zedcal không nên dùng cho bệnh nhân tăng Calci niệu hoặc bị sỏi thận.

Thận trọng với bệnh nhân đang điều trị bệnh tim với glycoside.

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân có tiền sử bệnh sỏi thận, bệnh thận hoặc suy thận.

TƯƠNG TÁC THUỐC : Corticosteroid làm giảm sự hấp thu calci.

Calci làm tăng tác động lên tim của Digoxin.

Calci cũng ảnh hưởng lên sự hấp thu của Tetracycline & Ciprofloxacin.

Tránh dùng chung Calci và Sắt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH : Chống chỉ định với bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng

QUÁ LIỀU VÀ XỬ LÝ : Những thành phần dùng trong công thức Zedcal thì được dung nạp tốt.

Trong trường hợp quá liều có thể dẫn tới tăng calci huyết, tăng vitamin D và tăng calci niệu.

Trong trường hợp quá liều, ngưng dùng thuốc ngay và tham khảo ý kiến Bác sĩ.

TRÌNH BÀY: Chai 100 ml / 200ml trong hộp carton.

LẮC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG

BẢO QUẢN : Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Đựng để tủ lạnh.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ khi sản xuất

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Sau khi mở nắp nếu thuốc được bảo quản ở Bảo quản dưới 30° C, nơi khô thoáng. Tránh ánh sáng, và nắp được gài chặt sau khi sử dụng thì Zedcal vẫn giữ được độ ổn định trong 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất tại Ấn Độ bởi :

MEYER ORGANICS PVT. LTD.

10 D, 2nd Phase, Peenya Ind. Area, Bangalore – 560 058. INDIA.

Văn phòng đăng ký : A-177, Wagle Estate, Thane – 400 604. (Mumbai) ẤN ĐỘ.

