

*Để xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

**CÔNG THỨC:** Cho 1 viên.

- Thành phần hoạt chất:

Cao Cabovis 124,62 mg tương đương với:

Thạch cao ( <i>Gypsum fibrosum</i> ).....	200 mg
Hoàng cầm ( <i>Radix Scutellariae</i> ).....	150 mg
Cát cánh ( <i>Radix Platycodi grandiflori</i> ).....	100 mg
Cam thảo ( <i>Radix et Rhizoma Glycyrrhizae</i> ).....	50 mg
Bột mịn Đại hoàng ( <i>Rhizoma Rhei powder</i> ).....	200 mg
Borneol (Băng phiến) ( <i>Borneolum syntheticum</i> ).....	25 mg
Ngũu hoàng nhân tạo ( <i>Bovis Calculus artifactus</i> ).....	5 mg

- Thành phần tá dược: tinh bột ngô, lactose, magnesi stearat, vỏ nang cứng.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nang cứng.

Mô tả sản phẩm: viên nang cứng, bóng, một đầu màu nâu đậm, một đầu màu nâu nhạt, bên trong có chứa bột màu nâu, mùi thơm được liệu đặc trưng, vị đắng.

**CHỈ ĐỊNH:**

Thanh nhiệt giải độc, trị các chứng do nóng nhiệt trong người gây nên như: viêm họng, sưng đau chân răng, lở loét miệng, mụn nhọt, táo bón...

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 - 3 lần. Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Uống sau bữa ăn với nước ấm.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Phụ nữ có thai, người bệnh sỏi thận, bàng quang, gan mật.

Người thể hàn, đau bụng đi ngoài do lạnh.

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:**

Không dùng quá liều chỉ định.

**SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Không được sử dụng.

**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Không ảnh hưởng.

**TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ:**

a) Tương tác của thuốc: Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

b) Tương kỵ của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:**

Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048  
Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC  
tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH  
Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương  
Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com