



# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp (hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng)

Nhãn vỉ FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp (vỉ 10 viên nang cứng)

Số lô SX, HD in nổi trên vỉ



**CÔNG THỨC:**

Bột mịn Mã tiền chế ứng tương đương 0,7mg Strychnin  
(*Powderum Semen Strychni praeparatum*)

Cao Hy thiêm.....88mg

Tương ứng với Hy thiêm (*Herba Siegesbeckiae*) 852mg

Cao Ngũ gia bì chân chim .....18mg

Tương ứng với Ngũ gia bì chân chim 232mg  
(*Cortex Schefferae heptaphyllae*)

Cao Tam thất .....10mg

Tương ứng với Tam thất 50mg  
(*Radix Panaxis notoginseng*)

Tá dược .....vừa đủ 1 viên  
(tinh bột ngô, lactose, magnesi stearat, vỏ nang cứng)

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các chứng đau dây thần kinh liên sườn, đau vai, gáy, đau các chi, đau lưng, đau nhức các khớp.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Người lớn: uống mỗi lần 2 viên ngày 2 lần. Uống sau khi ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG,**

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

**SBK:**

**KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH.**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

FENGSHI-OPC

VIÊN PHONG THẤP





# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

## Nhãn hộp FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp (hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)

**CÔNG THỨC:**  
 Bột mịn Mã tiền chế..... lượng tương đương 0,7mg Strychnin  
 (*Powderum Semen Strychni praeparatum*)  
 Cao Hy thiêm.....88mg  
 Tương ứng với Hy thiêm(*Herba Stigoesbeckiae*) 852mg  
 Cao Ngũ gia bì chân chim.....18mg  
 Tương ứng với Ngũ gia bì chân chim 232mg  
 (*Cortex Schafferiae heptaphyllae*)  
 Cao Tam thất.....10mg  
 Tương ứng với Tam thất (*Radix Panaxis notoginseng*) 50mg  
 Tế dược.....vừa đủ 1 viên  
 (tinh bột ngô, lactose, magnesi stearat, vỏ nang cứng)

**CHỈ ĐỊNH:**  
 Điều trị các chứng đau dây thần kinh  
 liên sườn, đau vai, gáy, đau các chi,  
 đau lưng, đau nhức các khớp.  
**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
 Người lớn: uống mỗi lần 2 viên, ngày  
 2 lần. Uống sau khi ăn.



**FENGSHI-OPC**  
VIÊN PHONG THẤP

风湿胶囊

HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

# FENGSHI OPC

VIÊN PHONG THẤP



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
1017 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP.HCM, ĐT: 09.37517111

GMP-WHO

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS. **SĐK:**

**KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH.**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số lô SX: \_\_\_\_\_  
Ngày SX: \_\_\_\_\_  
HD: \_\_\_\_\_

GMP-WHO

Sản xuất tại: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC Ấp Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tân Uyên, Bình Dương.

# FENGSHI OPC

VIÊN PHONG THẤP

HỘP 5 VỈ X 10 VIÊN NANG CỨNG

风湿胶囊

**FENGSHI-OPC**  
VIÊN PHONG THẤP





**MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC**

**Tờ hướng dẫn sử dụng**

**FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp**

**CÔNG THỨC:** cho 1 viên

- Bột mịn Mã tiền chế (*Powderum Semen Strychni praeparatum*) ..... lượng tương đương 0,7mg Strychnin
- Cao Hy thiêm ..... 88 mg
- Tương ứng với Hy thiêm (*Herba Siegesbeckiae*) 852 mg
- Cao Ngũ gia bì chân chim ..... 18 mg
- Tương ứng với Ngũ gia bì chân chim (*Cortex Schefflerae heptaphyllae*) 232 mg
- Cao Tam thất ..... 10 mg
- Tương ứng với Tam thất (*Radix Panaxis notoginseng*) 50 mg
- Tá dược (Tinh bột Ngô, Lactose, Magnesi stearat, Vỏ nang cứng) ..... vd 1 viên

**LÂM SÀNG:**

Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp có tác dụng giảm đau, tê, chống viêm, dẫn cơ, giảm giới hạn vận động khớp trên bệnh nhân thấp ngoài khớp, đau thấp nhiều cơ.

FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp thích hợp cho người thể hàn, đối với người thể nhiệt khi sử dụng thuốc nên dùng thêm thức ăn, uống mát.

FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp không có tác dụng phụ gây hại, không độc khi dùng ở liều điều trị.

FENGSHI-OPC Viên Phong Thấp làm thay đổi trị số VS theo chiều hướng giảm, nhưng không làm thay đổi các trị số cận lâm sàng: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, acid uric, không ảnh hưởng lên chức năng gan thận sau 12 ngày điều trị.

**CHỈ ĐỊNH:**

Điều trị các chứng đau dây thần kinh liên sườn, đau vai, gáy, đau các chi, đau lưng, đau nhức các khớp.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần. Uống sau khi ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Không dùng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, bệnh nhân suy gan, suy thận.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Không dùng quá liều chỉ định.

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không được sử dụng.

**TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Nhức đầu, khát nước, cồn cào dạ dày, táo bón, nóng bừng mặt, buồn ngủ. Các triệu chứng trên chiếm tỷ lệ thấp, tự hết, không ảnh hưởng đến sinh hoạt làm việc.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa có báo cáo.

**DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:** Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.


**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



PHÓ CỤC TRƯỞNG

*Nguyễn Văn Thanh*



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Áp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp – Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com