

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

472/166

http://nhathuocgg.com/ W-33694-19 FN 2923(801) 08/12/18

1- Nhãn hộp:

- THÀNH PHẦN: Mỗi gói bột 3g có chứa:
(lượng đương 0.041g cao khế).....0.5g
- Bệnh thưng (Rizoma *Bullatae* stiratae).....0.5g
- Bệnh thưng (Rizoma *Panicum lactiflorae*).....0.5g
- Bệnh thưng (Rizoma *Alcalydon macrocephala*) 0.5g
- Cam thảo (Radix *Glycyrrhizae*).....0.1g
- Nhân sâm (Radix *Ginseng*).....2.0g
- Hoàng liên (Rhizoma *Coptidis*).....2.0g
- Mộc hương (Radix *Succisaiae* japonica).....1.0g
- Hương phụ (Rhizoma *Cyperi*).....0.5g
- Ô tặc chi (Fructus *Sapala*).....2.0g
- Tá dược:.....vừa đủ 1 gói

SDK
LÀ SX
NSX
HD

Ⓡ Thuốc kê đơn

Thuốc bột

Hadugast

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRĂNG

20 gói x 3g



CHỈ ĐỊNH:
Điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng, cải thiện các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Mỗi lần uống 1 gói, ngày 3 lần. Hòa vào nước sôi để nguội (đông đá bột), uống trước bữa ăn.

BAO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY THẾ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Phân phối bởi:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG
Đ/C: P.1104 Tôn nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel:024.62752510 - Fax:024.62752498
Website: www.hoanggiangpharma.com.vn

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CP DƯỢC VYT Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, HD
ĐT: 0220.3953.848 - Fax: 0220.3953.848



Hadugast

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRĂNG

Ⓡ Thuốc kê đơn

Thuốc bột

Hadugast

ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRĂNG

20 gói x 3g



2- Nhãn gói:

Hadugast
ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRĂNG

gói 3g

Hadugast
ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRĂNG

Chỉ định: Điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng, cải thiện các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai.

Liều dùng - Cách dùng:
Mỗi lần uống 1 gói, ngày 3 lần. Hòa vào nước sôi để nguội (đông đá bột), uống trước bữa ăn.

BAO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY THẾ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô sxt:
HD:

Phân phối bởi: **CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG**
Đ/C: P.1104 Tôn nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel:024.62752510 - Fax:024.62752498
Website: www.hoanggiangpharma.com.vn
Cơ sở sản xuất: **CÔNG TY CP DƯỢC VYT Y TẾ HẢI DƯƠNG**
Đ/C: 102 Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Hải Dương

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/10/2019



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thuốc: ^{Rx} HADUGAST

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

1. Thành phần, hàm lượng: Mỗi gói bột có chứa:

STT	Thành phần	Hàm lượng
1.	Bạch cập (<i>Rhizoma Bletillae striatae</i>) (tương đương 0,041g cao khô)	0,5g
2.	Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) (tương đương 0,041g cao khô)	0,5g
3.	Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>) (tương đương 0,041g cao khô)	0,5g
4.	Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) (tương đương 0,0083g cao khô)	0,1g
5.	Nhân sâm (<i>Radix Ginseng</i>) (tương đương 0,164g cao khô)	2,0g
6.	Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>) (tương đương 0,164g cao khô)	2,0g
7.	Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>) (tương đương 0,083g cao khô)	1,0g
8.	Hương phụ (<i>Rhizoma Cyperi</i>) (tương đương 0,041g cao khô)	0,5g
9.	Ô tặc cốt (<i>Os sepiae</i>)	2,0g
Tá dược: Nipagin, Nipasol, Lactose monohydrat, Povidon K30.		vừa đủ 1 gói



2. Dạng bào chế:

- Thuốc bột. Chế phẩm là dạng bột khô tơi, màu vàng nâu, mùi thơm dược liệu, vị đắng.

3. Chỉ định:

Thuốc dùng điều trị:

- Điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng, cải thiện các triệu chứng trào ngược dạ dày, thực quản.

4. Cách dùng, liều dùng:

4.1. Liều dùng:

- Mỗi lần uống 1 gói, ngày 3 lần.

4.2. Cách dùng:

- Dùng thuốc theo đường uống.

- Hòa vào nước sôi để nguội (uống cả bột). Uống trước các bữa ăn

5. Chống chỉ định:

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Phụ nữ có thai.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Chưa có báo cáo.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai. Phụ nữ cho con bú có thể dùng, chỉ dùng thuốc khi cần thiết.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bất lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc:

- Chưa có báo cáo.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Chưa ghi nhận được báo cáo về tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
- Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí:

11.1. Quá liều:

- Dùng thuốc quá liều làm tăng nguy cơ xảy ra các tác dụng không mong muốn của thuốc.

11.2. Xử trí:

- Ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

12. Quy cách đóng gói:

Hộp 20 gói x 3g, kèm theo hướng dẫn sử dụng.

13. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- *Điều kiện bảo quản:* Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

- *Hạn dùng:* 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- *Tiêu chuẩn chất lượng:* TCCS.

14. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102, Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Tỉnh Hải

Dương

ĐT/Fax : 0220.3853848



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh**

