

**R**

**IRESSA®**  
gefitinib 250 mg

Mỗi viên chứa 250 mg gefitinib.  
Viên nén bao phim. Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.  
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và những thông tin khác:  
*xin đọc tờ Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc.*  
Không bảo quản quá 30°C. Bảo quản trong bao bì gốc.

**THUỐC BÁN THEO ĐƠN. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Nhà sản xuất: **AstraZeneca UK Limited**, Silk Road Business Park,  
Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Anh.

Xuất xứ: Anh.  
Số lô SX, NSX, HD: xem "LOT", "MADE", "EXP" trên bao bì.  
SDK: VN-XXXX-XX

DNNK: .....  
Địa chỉ: .....

AstraZeneca

LOT  
MADE at glnk VPharmac Security Features  
Exp: 03/2019 YJ Yell Print/Yamishi heat area  
Reserved for variable data

250 mg  
30 tablets

PO39627  
RQ39627  
RVN627  
PO39627

Manufactured by AstraZeneca UK Limited  
Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, United Kingdom  
IRESSA is a trademark of the AstraZeneca group of companies  
© AstraZeneca 2014

Reserved for  
Packaging

AstraZeneca

**R**

**IRESSA®**  
gefitinib 250 mg

**30 tablets**  
**250 mg**

Do not store above 30°C. Store in the original package.  
Dosage: One 250 mg tablet daily or as directed by your doctor.  
Contains lactose.

PRESCRIPTION ONLY MEDICINE  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Reserved Area

Varnish-Free

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
Lần đầu: 19/1/2019



Tamper Evident Label Position

Tamper Evident Security Label may not be applied to all packs

BS1  
NN 21266

19/1/19

17/98

Handwritten signature

Viewed from lidding foil side




Reserved Area for Variable Data



**\*NB FOR HAPA ARTWORK PLEASE MATCH VARIABLE DATA AREA TO THE ARTWORK**

	Schawk Job No.:	454222-A01	<b>Printable Colours:</b>  Black	<b>Non Print:</b>  Technical Info  Profile	
	Date:	22-12-14			
	Ops Component Code:	P039628			
	Drawing Ref:	T4410LV1P			
	Pharma Code:	N/A			
	Description:	Iressa 250mg Foil: Print Mat VN			
	Created By:	KW			



Bar prints 100mm @ 100%

Body text size	Smallest text size
6.0 pt	6.0 pt

*NAS*

← unwind direction  
winding diagram no. 3



This area left text free  
for applying variable data/registration numbers etc.



This area left text free  
for applying variable data/registration numbers etc.

LOT XXXX  
EXP DD-MM-YY  
MADE DD-MM-YY

CUSTOM WHITE (10%  
CYAN) REPRESENTS  
SOLID WHITE WHICH IS  
PRE-PRINTED

 PGU Marblesfield Works	Product + Market	Part No	Basic Code	Dimensions (mm)	Created by	Amended by	Amended by	Amended by	Colour(s)
	Flow wrap foil (Iressa)	P012182	D012182	Rpt Length 180 00	Initials	Initials	Initials	Initials	PMS 343 Green White Backwash
		No of Files		Width 171 00	TT				
1 of 1	Height 00 00	Date	Date	Date	Date				
					11.10.02				

*Handwritten signature/initials*

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

**IRESSA®**

**Gefitinib 250 mg**

Viên nén bao phim

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Đề xa tầm tay trẻ em.*

*Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

*Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.*

### THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC:

Mỗi viên chứa:

Hoạt chất: Gefitinib 250 mg

Tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể, croscarmellose natri, povidon, natri laurilsulfate, magnesi stearat, hypromellose, macrogol 300, titan dioxyd, oxyd sắt vàng, oxyd sắt đỏ.

### MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Viên nén bao phim.

Viên nén bao phim, hai mặt lõm, hình tròn, màu nâu, một mặt có khắc "IRESSA 250" và một mặt trơn.

### QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.

### THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ:

IRESSA được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân người lớn ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ. Đây là bệnh ung thư do hình thành tế bào ác tính (ung thư) ở trong mô phổi.

### NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG:

Luôn sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ. Hỏi lại thông tin với bác sỹ hoặc dược sỹ nếu bệnh nhân không chắc chắn.

Liều khuyến cáo là một viên 250 mg mỗi ngày.

Uống thuốc cùng một thời điểm mỗi ngày.

Bệnh nhân có thể uống thuốc trong hoặc ngoài bữa ăn.

Không dùng thuốc kháng acid (thuốc làm giảm nồng độ acid trong dạ dày) trong vòng 2 giờ trước hoặc sau 1 giờ kể từ khi uống thuốc IRESSA.

Hòa tan viên thuốc trong nửa ly nước (không chứa ga) nếu bệnh nhân khó nuốt nguyên viên thuốc. Không dùng bất kỳ các chất lỏng khác. Không nghiền viên thuốc. Khuấy đều nước cho đến khi viên thuốc hoà tan.

Có thể mất đến 20 phút để hòa tan viên thuốc. Uống dịch thuốc ngay lập tức. Sau đó, tráng với một nửa ly nước và uống để đảm bảo rằng bệnh nhân đã uống hết thuốc.



17/12

**Trường hợp bệnh nhân lỡ uống nhiều hơn liều thuốc qui định:**

Nếu bệnh nhân lỡ dùng nhiều viên thuốc so với liều khuyến cáo, bệnh nhân cần báo bác sỹ hoặc dược sỹ ngay lập tức.

Nếu bệnh nhân có bất kỳ thắc mắc về việc dùng thuốc này, nên tham vấn bác sỹ hoặc dược sỹ.

**KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:**

Không nên dùng thuốc này nếu bệnh nhân dị ứng với gefitinib hoặc bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc.

Không nên dùng thuốc nếu bệnh nhân đang trong thời kỳ cho con bú.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Cũng như các thuốc khác, thuốc này có thể gây ra tác dụng không mong muốn mặc dù điều này không phải xảy ra ở tất cả bệnh nhân.

Tham vấn bác sỹ ngay lập tức nếu bệnh nhân có phản ứng không mong muốn liệt kê dưới đây – bệnh nhân có thể cần được điều trị y tế khẩn cấp.

- Phản ứng dị ứng (ít gặp), đặc biệt nếu gặp các triệu chứng như sưng mặt, lưỡi hoặc cổ họng, khó nuốt, viêm thanh quản và khó thở.
- Hết hơi, hoặc đột ngột không thở được, có khả năng xảy ra khi bị ho hoặc sốt. Điều này nghĩa là bệnh nhân bị viêm phổi, còn gọi là bệnh phổi mô kẽ. Có thể xảy ra ở 1/100 bệnh nhân dùng thuốc Iressa và có thể đe dọa tính mạng.
- Phản ứng da nghiêm trọng (hiếm gặp) ảnh hưởng đến diện tích lớn bề mặt cơ thể. Dấu hiệu bao gồm đỏ da, đau, loét, giộp da và bong tróc da. Môi, mũi, mắt và cơ quan sinh dục ngoài có thể bị ảnh hưởng.
- Mất nước (thường gặp) có nguyên nhân là do ỉa chảy kéo dài hoặc trầm trọng, nôn ói (đang bệnh), buồn nôn (cảm thấy bệnh) hoặc mất cảm giác ngon miệng.
- Có vấn đề ở mắt (ít gặp), như là đau, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhạy cảm với ánh sáng, thay đổi thị lực hoặc lông mi quặm. Điều này có nghĩa là bệnh nhân bị loét trên bề mặt mắt (giác mạc).

Tham vấn bác sỹ ngay khi có thể nếu bệnh nhân có bất kỳ phản ứng không mong muốn dưới đây:

Phản ứng không mong muốn rất thường gặp (ảnh hưởng > 1/ 10 bệnh nhân):

- Tiêu chảy
- Nôn ói
- Buồn nôn
- Phản ứng da như phát ban giống nổi mụn, mà thỉnh thoảng ngứa với da khô và/hoặc nứt da.
- Mất cảm giác ngon miệng
- Yếu ớt
- Miệng khô, đỏ, đau.
- Tăng enzym gan như là alanin aminotransferase trong xét nghiệm máu; nếu enzym tăng cao quá, bác sỹ có thể yêu cầu ngừng dùng thuốc Iressa.

Phản ứng không mong muốn thường gặp (ảnh hưởng từ 1-10 người/100 bệnh nhân):

- Mắt khô, đỏ hoặc ngứa.
- Mí mắt đỏ và đau.
- Móng có vấn đề
- Rụng tóc

*MA2*

*MA2*

- Sốt
- Chảy máu (ví dụ như chảy máu mũi hoặc có máu trong nước tiểu).
- Protein trong nước tiểu (hiển thị trong xét nghiệm nước tiểu).
- Tăng bilirubin và enzym gan khác được gọi là aspartat aminotransferase trong xét nghiệm máu; nếu kết quả xét nghiệm quá cao, bác sĩ có thể yêu cầu ngừng dùng thuốc Iressa.
- Tăng nồng độ creatinin trong xét nghiệm máu (liên quan đến chức năng thận).
- Viêm bàng quang (cảm giác bỏng rát khi đi tiểu và thường xuyên có nhu cầu tiểu gấp).

Phản ứng không mong muốn ít gặp (ảnh hưởng từ 1-10 người/1000 bệnh nhân):

- Viêm tụy. Các dấu hiệu bao gồm đau rất nặng ở phần trên của vùng bụng, buồn nôn và nôn ói dữ dội.
- Viêm gan. Các dấu hiệu bao gồm cảm giác không khỏe, có hoặc không có vàng da (da và mắt có màu vàng). Ít gặp tác dụng không mong muốn này; tuy nhiên, một số bệnh nhân đã bị tử vong.
- Thủng dạ dày-ruột.

Phản ứng không mong muốn hiếm gặp (ảnh hưởng từ 1-10 người/10.000 bệnh nhân):

- Viêm mạch máu trong da. Điều này có thể biểu hiện bằng vết thâm tím hoặc những mảng phát ban không xanh tái ở trên da.
- Viêm bàng quang xuất huyết (cảm giác bỏng rát khi đi tiểu và thường xuyên có nhu cầu tiểu gấp, có máu trong nước tiểu).

**NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY:**

Hãy báo bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bệnh nhân đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ loại thuốc khác.

Đặc biệt là báo bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bệnh nhân đang dùng bất cứ loại thuốc nào sau đây:

- Phenytoin hay carbamazepin (thuốc điều trị động kinh).
- Rifampicin (thuốc điều trị bệnh lao).
- Itraconazol (thuốc điều trị nhiễm nấm).
- Barbiturat (thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ).
- Thuốc thảo dược có chứa cỏ St John (tên latin là Hypericum perforatum, được sử dụng điều trị bệnh trầm cảm và lo âu).
- Các thuốc ức chế bơm proton, thuốc đối kháng H<sub>2</sub> và các thuốc kháng acid (thuốc điều trị bệnh loét, khó tiêu, ợ nóng và làm giảm acid trong dạ dày).

Những loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến cơ chế tác dụng của Iressa.

- Warfarin (thuốc chống đông đường uống, để ngăn ngừa cục máu đông). Nếu bệnh nhân đang dùng thuốc có chứa hoạt chất này, bác sĩ có thể cần phải cho làm các xét nghiệm máu thường xuyên hơn.

Nếu gặp phải bất kỳ phản ứng không mong muốn liệt kê ở trên, hoặc nếu bệnh nhân không chắc chắn, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng Iressa.

**CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC:**

Việc cần phải làm gì trong trường hợp quên dùng thuốc còn phụ thuộc vào khoảng bao lâu mới đến thời điểm dùng liều kế tiếp.

Nếu lớn hơn hoặc bằng 12 giờ tính từ thời điểm dùng liều kế tiếp thì uống liều đã quên ngay khi bệnh nhân nhớ ra. Sau đó dùng liều kế tiếp như bình thường.

Nếu nhỏ hơn 12 giờ tính từ thời điểm dùng liều kế tiếp: bỏ qua liều đã quên uống. Sal đó dùng liều kế tiếp như bình thường.

Không được uống gấp đôi liều (2 viên cùng một thời điểm) để bù cho liều đã quên.

#### CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO:

Không bảo quản quá 30°C. Bảo quản trong bao bì gốc.

#### DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU:

Ghi nhận tăng tần số và mức độ nghiêm trọng của một số phản ứng không mong muốn, chủ yếu là ã chảy và phát ban ở da.

#### CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO:

Không có điều trị đặc hiệu trong trường hợp quá liều.

Các phản ứng không mong muốn có liên quan đến quá liều nên được điều trị triệu chứng; đặc biệt là nên kiểm soát việc tiêu chảy nặng theo chỉ định lâm sàng.

#### NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

##### *Lưu ý và thận trọng khi sử dụng*

Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng Iressa:

o Nếu bệnh nhân đã từng có bất kỳ vấn đề khác về phổi. Một số bệnh phổi có thể tồi tệ hơn trong khi điều trị với Iressa.

o Nếu bệnh nhân có vấn đề về gan.

##### *Trẻ em và thanh thiếu niên*

Iressa không được chỉ định ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

##### *Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và phụ nữ có khả năng có thai*

Tham vấn bác sĩ trước khi dùng thuốc này nếu bệnh nhân có thai, có thể có thai hoặc đang cho con bú.

Khuyến cáo tránh mang thai trong khi điều trị với Iressa vì Iressa thể gây hại cho thai nhi.

Không dùng Iressa nếu bệnh nhân đang cho con bú vì sự an toàn của em bé.

##### *Khả năng lái xe và vận hành máy móc*

Nếu bệnh nhân cảm thấy yếu ớt trong khi dùng thuốc này, cần trọng khi lái xe hoặc vận hành công cụ hoặc máy móc.

##### *Iressa chứa lactose*

Nếu bệnh nhân được chẩn đoán là không dung nạp một số loại đường, liên hệ với bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

#### KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SĨ:

Tham vấn bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng Iressa

Báo bác sĩ trước khi dùng thuốc này nếu bệnh nhân đang có thai, có thể có thai hoặc đang cho con bú.

Nếu bệnh nhân có bất kỳ phản ứng không mong muốn, báo với bác sĩ, dược sĩ, hoặc y tá. Bao gồm bất kỳ phản ứng không mong muốn mà không liệt kê ở trong phần hướng dẫn sử dụng cho bệnh nhân này.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC:

3 năm kể từ ngày sản xuất.

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Anh.

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:  
dd/mm/yy.

Doc ID-..... Version....

© AstraZeneca 2003-2016

*Iressa is a trade mark of the AstraZeneca group of companies.*

AstraZeneca 



*Handwritten signature*



NAS

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ

Rx Thuốc bán theo đơn

### **IRESSA®**

*Gefitinib 250 mg*

Viên nén bao phim

### **THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG**

Mỗi viên chứa:

Hoạt chất: Gefitinib 250 mg

Tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể, croscarmellose natri, povidon, natri laurilsulfate, magnesi stearat, hypromellose, macrogol 300, titan dioxyd, oxyd sắt vàng, oxyd sắt đỏ.

### **DẠNG BÀO CHẾ**

Viên nén bao phim.

Viên nén bao phim, hai mặt lõm, hình tròn, màu nâu, một mặt có khắc "IRESSA 250" và một mặt trơn.

### **ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ**

Đặc tính dược lực học:

Nhóm dược lý trị liệu: thuốc chống ung thư, ức chế protein kinase, mã ATC: L01XE02.

*Cơ chế tác động và tác dụng dược lực*

Yếu tố phát triển biểu bì (epidermal growth factor – EGF) và thụ thể (EGFR [HER1; ErbB1]) đóng vai trò chủ yếu trong quá trình phát triển và tăng sinh của tế bào bình thường và tế bào ung thư. Đột biến hoạt hóa EGFR trong tế bào ung thư là yếu tố quan trọng trong việc phát triển khối u, ngăn tế bào chết theo chương trình, tăng hình thành các mạch máu mới và thúc đẩy quá trình di căn của bướu.

Gefitinib là hoạt chất có phân tử nhỏ, ức chế chọn lọc tyrosin kinase trên thụ thể của yếu tố phát triển biểu bì và điều trị hiệu quả ở bệnh nhân có khối u mang đột biến hoạt hóa của EGFR tyrosin kinase bất kể bước điều trị. Không có tác động lâm sàng liên quan ở bệnh nhân có khối u không mang đột biến EGFR.

Đột biến hoạt hóa EGFR thường gặp (mất đoạn trên exon 19, L858R) có nhiều dữ liệu đáp ứng hỗ trợ cho nhạy cảm với gefitinib; ví dụ: thời gian sống còn không tiến triển bệnh HR (95% CI) 0,489 (0,336; 0,710) trong nhóm gefitinib so với nhóm hóa trị đôi [WJTOG3405]. Ít dữ liệu đáp ứng với gefitinib hơn ở các bệnh nhân có khối u chứa đột biến ít gặp, các dữ liệu sẵn có cho thấy G719X, L861Q và S768I là các đột biến nhạy thuốc; và T790M đơn độc hoặc đột biến chèn đoạn ở exon 20 đơn độc là các cơ chế đề kháng thuốc.

*DNA của khối u trong hệ tuần hoàn (ctDNA)*

Trong nghiên cứu lâm sàng IFUM, tình trạng đột biến được đánh giá trên mẫu khối u và mẫu ctDNA chiết tách từ huyết tương, bằng cách sử dụng bộ kit xét nghiệm Therascreen EGFR RGQ PCR (của hãng Qiagen). Cả hai mẫu ctDNA và mẫu khối u đều có thể đánh giá cho 652 bệnh nhân trong tổng số 1060 bệnh nhân đã sàng lọc. Tỷ lệ đáp ứng khách quan của nhóm bệnh nhân có xét nghiệm đột biến dương tính trong cả mẫu khối u và mẫu ctDNA là 77% (95% CI: 66%-86%), và trong nhóm bệnh nhân chỉ có đột biến dương tính trên mẫu khối u là 60% (95% CI: 44%-74%).

**Bảng 1: Tóm tắt tình trạng đột biến căn bản của mẫu khối u và ctDNA trên tất cả các bệnh nhân sàng lọc mà có khả năng đánh giá được trên cả 2 loại mẫu.**

Tiêu chí	Diễn giải	Tỷ lệ IFUM % (CI)	IFUM N
Độ nhạy	Tỷ lệ khối u đột biến dương tính mà ctDNA cũng có kết quả đột biến dương tính	65,7 (55,8; 74,7)	105
Độ đặc hiệu	Tỷ lệ khối u đột biến âm tính mà ctDNA cũng có kết quả đột biến âm tính	99,8 (99,0; 100,0)	547

Các dữ liệu này cũng phù hợp với kết quả phân tích thăm dò định trước trong đề cương nghiên cứu. Trên phân nhóm bệnh nhân Nhật Bản trong nghiên cứu lâm sàng IPASS (Goto 2012). Trong nghiên cứu này, ctDNA chiết tách từ huyết thanh, không phải từ huyết tương, được dùng để phân tích đột biến EGFR sử dụng bộ kit EGFR Mutation Test Kit (DxS) (N = 86). Trong nghiên cứu này, độ nhạy là 43,1%, độ đặc hiệu là 100%.

*Độ an toàn và hiệu quả của thuốc trên lâm sàng*

*Điều trị bước 1*

Trong một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên pha III về điều trị bước 1 trên bệnh nhân Châu Á ung thư phổi không tế bào nhỏ dạng tuyến tiến xa (giai đoạn IIIB hay IV), hút thuốc ít trước đây (ngưng hút thuốc  $\geq 15$  năm trước và hút  $\leq 10$  gói-năm) hoặc không bao giờ hút thuốc (xem Bảng 2)

<sup>1</sup>Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật, Mã Lai, Philippines, Singapore, Đài Loan và Thái Lan.

**Bảng 2 Hiệu quả lâm sàng của gefitinib so với carboplatin/ paclitaxel trong nghiên cứu IPASS.**

Nhóm	N	Tỷ lệ đáp ứng khách quan và 95% CI đối với sự khác biệt giữa 2 liệu pháp điều trị <sup>a</sup>	Tiêu chí chính Thời gian sống bệnh không tiến triển (PFS) <sup>ab</sup>	Thời gian sống còn toàn bộ <sup>ab</sup>
Toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu	1217	43,0 % so với 32,2 % [5,3 %; 16,1 %]	HR 0,74 [0,65; 0,85] 5,7m so với 5,8m p<0,0001	HR 0,90 [0,79; 1,02] 18,8m so với 17, 4m p=0,1087

*NAS*

Bệnh nhân có đột biến EGFR dương tính	261	71,2 % so với 47,3 % [12,0 %; 34,9 %]	HR 0,48 [0,36; 0,64] 9,5m so với 6,3m p<0,0001	HR 1,00 [0,76; 1,33] 21,6m so với 21,9m
Bệnh nhân có đột biến EGFR âm tính	176	1,1 % so với 23,5 % [-32,5 %; -13,3 %]	HR 2,85 [2,05; 3,98] 1,5m so với 5,5m p<0,0001	HR 1,18 [0,86; 1,63] 11,2m so với 12,7m
Bệnh nhân chưa rõ đột biến	780	43,3 % so với 29,2 % [7,3 %; 20,6 %]	HR 0,68 [0,58- 0,81] 6,6m so với 5,8m p<0,0001	HR 0,82 [0,70 - 0,96] 18,9m so với 17,2m

a Trị số trình bày là của IRESSA so với carboplatin/paclitaxel.

b “m” nghĩa là tháng trung vị. Số trong dấu ngoặc vuông là khoảng tin cậy 95% cho HR.

N Số bệnh nhân ngẫu nhiên.

HR Tỷ số nguy cơ (Tỷ số nguy cơ <1 là IRESSA lợi thế hơn).

Chất lượng sống khác nhau tùy thuộc vào tình trạng đột biến EGFR. Trong nhóm bệnh nhân có đột biến EGFR, nhiều bệnh nhân điều trị với IRESSA có sự cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống và triệu chứng ung thư phổi so với carboplatin/paclitaxel (xem Bảng 3).

**Bảng 3 Chất lượng sống của nhóm gefitinib so với nhóm carboplatin/paclitaxel trong nghiên cứu IPASS**

Nhóm	N	Tỷ lệ cải thiện FACT-L QoL <sup>a</sup> %	Tỷ lệ cải thiện triệu chứng LCS <sup>a</sup> %
Toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu	1151	(48,0 % so với 40,8 %) p=0,0148	(51,5 % so với 48,5 %) p=0,3037
Bệnh nhân có đột biến EGFR dương tính	259	(70,2 % so với 44,5 %) p<0,0001	(75,6 % so với 53,9 %) p=0,0003
Bệnh nhân có đột biến EGFR âm tính	169	(14,6 % so với 36,3 %) p=0,0021	(20,2 % so với 47,5 %) p=0,0002

Chỉ số hiệu quả lâm sàng được chứng minh bởi tổng điểm FACT-L và LCS.

<sup>a</sup> Trị số trình bày là của IRESSA so với carboplatin/paclitaxel.

N Số bệnh nhân có thể đánh giá phân tích chất lượng cuộc sống.

QoL Chất lượng cuộc sống

FACT-L Thang đánh giá của liệu pháp điều trị ung thư phổi.

## LCS Thang đánh giá ung thư phổi

Trong nghiên cứu IPASS, IRESSA chứng minh hiệu quả vượt trội trên PFS, ORR, QOL và giảm triệu chứng mà không có sự khác biệt đáng kể về khả năng sống còn toàn bộ so với carboplatin/paclitaxel ở nhóm bệnh nhân chưa được điều trị trước đó, bị bệnh ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hay di căn, các khối u này có đột biến hoạt hóa EGFR tyrosin kinase.

*Trên các bệnh nhân đã được điều trị trước đó.*

Trong 1 nghiên cứu lâm sàng pha III (INTEREST) tiến hành ngẫu nhiên trên bệnh nhân NSCLC giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn mà trước đây đã dùng hóa trị có platinum. Trên toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa gefitinib và docetaxel (75mg/m<sup>2</sup>) về thời gian sống còn toàn bộ, thời gian sống bệnh không tiến triển và tỷ lệ đáp ứng khách quan (xem Bảng 4).

**Bảng 4 Hiệu quả lâm sàng của gefitinib so với docetaxel trong nghiên cứu INTEREST**

Nhóm	N	Tỷ lệ đáp ứng khách quan và 95% CI đối với sự khác biệt giữa 2 liệu pháp điều trị <sup>a</sup>	Thời gian sống bệnh không tiến triển <sup>ab</sup>	Tiêu chí chính Thời gian sống còn toàn bộ <sup>ab</sup>
Toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu	1466	9,1 % so với 7,6 % [-1,5 %; 4,5 %]	HR 1,04 [0,93;1,18] 2,2 m so với 2,7 m p=0,4658	HR 1,020 [0,905; 1,150] <sup>c</sup> 7,6 m so với 8,0 m p=0,7332
Bệnh nhân có đột biến EGFR dương tính	44	42,1 % so với 21,1 % [-8,2 %; 46,0 %]	HR 0,16 [0,05;0,49] 7,0 m so với 4,1 m p=0,0012	HR 0,83 [0,41; 1,67] 14,2 m so với 16,6 m p=0,6043
Bệnh nhân có đột biến EGFR âm tính	253	6,6 % so với 9,8 % [-10,5 %;4,4 %]	HR 1,24 [0,94;1,64] 1,7 m so với 2,6 m p=0,1353	HR 1,02 [0,78; 1,33] 6,4 m so với 6,0 m p=0,9131
Bệnh nhân thuộc chủng tộc Châu Á <sup>c</sup>	323	19,7 % so với 8,7 % [3,1 %; 19,2 %]	HR 0,83 [0,64;1,08] 2,9 m so với 2,8 m p=0,1746	HR 1,04 [0,80; 1,35] 10,4 m so với 12,2 m p=0,7711

Bệnh nhân không phải chủng tộc Châu Á	1143	6,2 % so với 7,3 % [-4,3 %; 2,0 %]	HR 1,12 [0,98; 1,28] 2,0 m so với 2,7 m p=0,1041	HR 1,01 [0,89; 1,14] 6,9 m so với 6,9 m p=0,9259
---------------------------------------	------	---------------------------------------	---	---

a Trị số được trình bày là của IRESSA so sánh với docetaxel.

b "m" là tháng trung vị. Số liệu trong dấu ngoặc đơn là khoảng tin cậy 96% trên tỷ số nguy cơ của thời gian sống còn toàn bộ trên toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu, hoặc khoảng tin cậy 95% cho HR.


c Khoảng tin cậy hoàn toàn nằm dưới giới hạn xác định không kém hơn 1,154.

N Số bệnh nhân lựa chọn ngẫu nhiên


HR Tỷ số nguy cơ (HR <1 thì IRESSA có lợi thế hơn)

**Biểu đồ 1 và 2 Hiệu quả của thuốc trong phân nhóm bệnh nhân không thuộc chủng tộc Châu Á trong nghiên cứu INTEREST**

(N = Số bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên)



*Handwritten signature*



Nghiên cứu lâm sàng pha III (ISEL) thực hiện ngẫu nhiên trên bệnh nhân NSCLC tiến triển mà đã dùng 1 hoặc 2 phác đồ hóa trị trước đó và đã kháng trị hoặc không dung nạp với phác đồ điều trị gần nhất. IRESSA phối hợp với liệu pháp chăm sóc nâng đỡ (BSC: Best Supportive Care) được so sánh với giả dược phối hợp với liệu pháp chăm sóc nâng đỡ. IRESSA không làm kéo dài đáng kể thời gian sống còn trên toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Thời gian sống còn khác nhau tùy theo tình trạng hút thuốc và yếu tố chủng tộc (xem Bảng 5).

**Bảng 5 Hiệu quả của gefitinib so với giả dược trong nghiên cứu ISEL**

Nhóm	N	Tỷ lệ đáp ứng khách quan và 95%CI đối với sự khác biệt giữa 2 liệu pháp điều trị <sup>a</sup>	Thời gian đến khi điều trị thất bại <sup>ab</sup>	Tiêu chí chính Thời gian sống còn còn bộ <sup>abc</sup>
Toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu	1692	8,0 % so với 1,3 % [4,7 %; 8,8 %]	HR 0,82 [0,73; 0,92] 3,0 m so với 2,6 m p=0,0006	HR 0,89 [0,77; 1,02] 5,6 m so với 5,1 m p=0,0871
Bệnh nhân có đột biến EGFR dương tính	26	37,5 % so với 0 % [-15,1 %; 61,4 %]	HR 0,79 [0,20; 3,12] 10,8 m so với 3,8m p=0,7382	HR NC NR so với 4,3 m

*Handwritten signature*

Bệnh nhân có đột biến EGFR âm tính	189	2,6 % so với 0 % [-5,6 %; 7,3 %]	HR 1,10 [0,78; 1,56] 2,0 m so với 2,6 m p=0,5771	HR 1,16 [0,79; 1,72] 3,7 m so với 5,9 m p=0,4449
Bệnh nhân không hút thuốc	375	18,1 % so với 0 % [12,3 %; 24,0 %]	HR 0,55 [0,42; 0,72] 5,6 m so với 2,8 m p<0,0001	HR 0,67 [0,49; 0,92] 8,9 m so với 6,1 m p=0,0124
Bệnh nhân có hút thuốc	1317	5,3 % so với 1,6 % [1,4 %; 5,7 %]	HR 0,89 [0,78; 1,01] 2,7 m so với 2,6 m p=0,0707	HR 0,92 [0,79; 1,06] 5,0 m so với 4,9 m p=0,2420
Bệnh nhân thuộc chủng tộc Châu Á <sup>d</sup>	342	12,4 % so với 2,1 % [4,0 %; 15,8 %]	HR 0,69 [0,52; 0,91] 4,4 m so với 2,2 m p=0,0084	HR 0,66 [0,48; 0,91] 9,5 m so với 5,5 m p=0,0100
Bệnh nhân không thuộc chủng tộc Châu Á	1350	6,8 % so với 1,0 % [3,5 %; 7,9 %]	HR 0,86 [0,76; 0,98] 2,9 m so với 2,7 m p=0,0197	HR 0,92 [0,80; 1,07] 5,2 m so với 5,1 m p=0,2942

a Trị số trình bày của IRESSA so với giả dược.

b “m” là tháng trung vị. Số liệu trong dấu ngoặc vuông là dựa vào khoảng tin cậy 95% của HR.

c Mô hình log-rank phân tầng trên toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu; hoặc mô hình tỷ lệ nguy cơ Cox.

d Chủng tộc Châu Á không bao gồm bệnh nhân có gốc Ấn Độ và căn cứ vào nguồn gốc chủng tộc của bệnh nhân và không nhất thiết là nơi họ sinh ra.

N Số bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên

NC Không tính HR thời gian sống còn toàn bộ vì quá ít biến cố

NR Chưa đạt

HR Tỷ số nguy cơ (Tỷ số nguy cơ <1 là IRESSA lợi thế hơn)

Nghiên cứu IFUM là nghiên cứu đa trung tâm, đơn nhánh, tiến hành trên các bệnh nhân da trắng (n=106) bị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR nhạy cảm hoạt hóa để khẳng định rằng hoạt tính của gefitinib ở bệnh nhân da trắng và bệnh nhân Châu Á là tương tự nhau. Theo đánh giá của nghiên cứu viên, trị số ORR là 70% và trung vị PFS là 9,7 tháng. Các dữ liệu này cũng tương tự như các dữ liệu báo cáo trong nghiên cứu IPASS.

*Tình trạng đột biến EGFR và đặc tính lâm sàng*



Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nữ, không hút thuốc, ung thư dạng tuyến cho thấy là yếu tố tiên đoán độc lập về tình trạng đột biến EGFR dương tính trong một phân tích đa biến của 786 bệnh nhân da trắng từ các nghiên cứu gefitinib \* (xem Bảng 6). Bệnh nhân châu Á cũng có một tỷ lệ khối u đột biến dương tính cao hơn.

**Bảng 6 Tóm tắt các phân tích thống kê hồi quy đa biến để xác định yếu tố tiên đoán độc lập cho sự hiện diện của đột biến EGFR ở 786 bệnh nhân da trắng\***

Yếu tố tiên đoán sự hiện diện của đột biến EGFR	Giá trị p	Số chênh (odds) của đột biến EGFR	Giá trị tiên đoán dương (9,5% trong tổng số bệnh nhân tham gia nghiên cứu là có đột biến EGFR dương tính M+)
Tình trạng hút thuốc	<0,0001	Cao gấp 6,5 lần ở bệnh nhân không hút thuốc so với bệnh nhân có hút thuốc	28/70 (40%) bệnh nhân không hút thuốc có đột biến dương tính M+ 47/716 (7%) bệnh nhân hút thuốc có đột biến dương tính M+
Mô học	<0,0001	Cao gấp 4,4 lần ở bệnh nhân ung thư dạng tuyến so với bệnh nhân không có ung thư dạng tuyến	63/396 (16%) bệnh nhân ung thư dạng tuyến có đột biến dương tính M+ 12/390 (3%) bệnh nhân không bị ung thư dạng tuyến có đột biến dương tính M+
Giới tính	0,0397	Cao gấp 1,7 lần ở bệnh nhân nữ so với bệnh nhân nam	40/235 (17%) bệnh nhân nữ có đột biến dương tính M+ 35/551 (6%) bệnh nhân nam có đột biến dương tính M+

\*kết quả thu thập từ các nghiên cứu: INTEREST, ISEL, INTACT 1&2, IDEAL 1&2, INVITE.

#### Đặc tính dược động học:

##### *Hấp thu*

Sau khi uống gefitinib, sự hấp thu tương đối chậm và nồng độ đỉnh gefitinib trong huyết tương đạt từ 3-7 giờ sau khi uống thuốc. Sinh khả dụng tuyệt đối trung bình là 59% ở bệnh nhân ung thư. Thức ăn không làm thay đổi đáng kể nồng độ gefitinib trong cơ thể. Trong một thử nghiệm trên người tình nguyện khỏe mạnh có độ pH dịch vị duy trì > 5, nồng độ gefitinib trong cơ thể giảm 47%, có thể là do giảm độ hòa tan của gefitinib ở dạ dày (xem phần "Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng" và "Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác").

##### *Phân bố*

Thể tích phân bố trung bình của gefitinib ở trạng thái hằng định là 1400 lít, chứng tỏ là thuốc phân bố rộng rãi vào các mô. Khoảng 90% thuốc gắn kết với protein huyết tương. Gefitinib gắn kết với albumin và  $\alpha$ 1-acid glycoprotein trong huyết thanh.

Dữ liệu *in vitro* cho thấy rằng gefitinib là chất nền cho sự vận chuyển qua màng tế bào của protein Pgp.

#### *Chuyển hóa*

Dữ liệu *in vitro* cho thấy rằng CYP3A4 và CYP2D6 là isozym P450 chính có liên quan đến quá trình chuyển hóa oxy hóa của gefitinib.

Các nghiên cứu *in vitro* đã chứng tỏ gefitinib ít có khả năng ức chế CYP2D6. Gefitinib cho thấy không có tác động cảm ứng enzym trong các nghiên cứu ở động vật và không ức chế đáng kể (*in vitro*) trên bất kỳ cytochrom P450 enzym.

Gefitinib được chuyển hóa rộng rãi ở người. 5 chất chuyển hóa đã được nhận biết đầy đủ trong phân và 8 chất chuyển hóa trong huyết tương ở người. Chất chuyển hóa chính được định danh là O-desmethyl gefitinib, hoạt tính kém 14 lần so với gefitinib về khả năng ức chế sự phát triển tế bào được kích hoạt bởi EGFR và không có tác động ức chế sự phát triển tế bào khối u ở chuột. Vì vậy, chất chuyển hóa này được xem như không đóng góp vào tác động lâm sàng của gefitinib.

*In vitro*, O-desmethyl gefitinib đã được chứng minh là sản sinh qua men CYP2D6. Vai trò của men CYP2D6 trong quá trình thanh thải chuyển hóa gefitinib đã được đánh giá trong 1 nghiên cứu lâm sàng trên người tình nguyện khỏe mạnh đã khảo sát kiểu gen về tình trạng CYP2D6 (genotyped for CYP2D6 status). Ở người chuyển hóa kém, không phát hiện O-desmethyl gefitinib được sản sinh ở mức độ có thể đo lường được. Nồng độ và thời gian tiếp xúc với gefitinib trong máu ở cả nhóm chuyển hóa mạnh và nhóm chuyển hóa kém đều biến thiên rộng và trùng lặp nhau nhưng nồng độ và thời gian tiếp xúc trung bình với gefitinib trong máu ở nhóm chuyển hóa kém thì cao gấp đôi. Hiện tượng người không có CYP2D6 có nồng độ thuốc và thời gian tiếp xúc với thuốc trong máu cao hơn có thể có ý nghĩa lâm sàng vì đã gặp các phản ứng ngoại ý liên quan đến liều và nồng độ thuốc trong cơ thể.

#### *Thải trừ*

Gefitinib được bài tiết chủ yếu dưới dạng chất chuyển hóa qua phân, độ thải trừ thuốc và các chất chuyển hóa qua thận ít hơn 4% liều dùng.

Tổng thanh thải gefitinib trong huyết tương là khoảng 500 ml/phút và trung bình thời gian bán thải cuối là 41 giờ ở bệnh nhân ung thư. Uống gefitinib một lần mỗi ngày sẽ dẫn đến tích lũy thuốc từ 2 đến 8 lần, với nồng độ và thời gian tiếp xúc ở trạng thái ổn định đạt được sau 7 – 10 liều dùng. Ở trạng thái ổn định, nồng độ thuốc trong huyết tương tuần hoàn được duy trì gấp 2-3 lần với khoảng cách liều 24 giờ.

#### *Các nhóm dân số đặc biệt*

Khi phân tích dữ liệu dựa trên nhóm dân số ở bệnh nhân ung thư, không xác định có mối liên hệ giữa nồng độ đáy ở trạng thái ổn định đã tiên đoán trước (predicted steady state trough concentration) và độ tuổi bệnh nhân, thể trọng, giới tính, chủng tộc hoặc độ thanh thải creatinin (>20 ml/phút).

#### *Suy gan*

Trong một nghiên cứu nhân mở pha I dùng liều đơn gefitinib 250mg trên bệnh nhân suy gan nặng, trung bình hoặc nhẹ do xơ gan (theo phân loại Child-Pugh), đã có sự gia tăng về nồng độ thuốc trong máu trong tất cả nhóm so với nhóm chứng khỏe mạnh. Đã ghi nhận có mức độ phơi nhiễm với gefitinib tăng trung bình gấp 3,1 lần ở bệnh nhân suy

gan trung bình và nặng. Không có bệnh nhân nào bị ung thư, tất cả đều bị xơ gan và vài người bị viêm gan. Sự tăng mức phơi nhiễm này có ý nghĩa lâm sàng vì đã gặp các phản ứng ngoại ý liên quan đến liều và mức phơi nhiễm với thuốc trong cơ thể.

Gefitinib đã được đánh giá trong một thử nghiệm lâm sàng thực hiện trên 41 bệnh nhân có bướu đặc (solid tumour) và chức năng gan bình thường, suy chức năng gan trung bình hoặc nặng (phân loại Tiêu chuẩn Đánh giá Độc tính Thường gặp dựa vào AST, alkaline phosphatase và bilirubin) do di căn gan. Kết quả cho thấy sau khi dùng liều hàng ngày IRESSA 250 mg, các trị số như thời gian đạt nồng độ ổn định trong máu, tổng độ thanh thải huyết tương và mức tiếp xúc ở trạng thái ổn định ( $C_{maxss}$ ,  $AUC_{24ss}$ ) tương tự ở các nhóm có chức năng gan bình thường và chức năng gan suy giảm mức độ trung bình. Dữ liệu của 4 bệnh nhân có chức năng gan rối loạn trầm trọng do di căn gan cho thấy mức phơi nhiễm ở trạng thái ổn định của các bệnh nhân này cũng tương tự như ở bệnh nhân có chức năng gan bình thường.

### **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI**

Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên nén bao phim.

### **CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ**

IRESSA được chỉ định điều trị cho bệnh nhân người lớn ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn mà có đột biến hoạt hóa EGFR TK.

### **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG**

Việc điều trị với IRESSA nên được tiến hành và theo dõi bởi các bác sĩ có kinh nghiệm trong điều trị ung thư.

Liều khuyến cáo IRESSA là 1 viên 250 mg, ngày 1 lần. Nếu quên dùng 1 liều thuốc, nên uống ngay khi nhớ ra. Nếu việc quên uống thuốc dưới 12 giờ tính đến thời điểm dùng liều kế tiếp, bệnh nhân không nên dùng liều thuốc đã lỡ quên uống. Bệnh nhân không nên dùng liều gấp đôi (uống cùng lúc 2 liều thuốc) để bù cho liều đã quên uống.

#### *Trẻ em*

Độ an toàn và hiệu quả của IRESSA ở trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập. Chưa có sử dụng gefitinib trên trẻ em với chỉ định ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ.

#### *Suy gan*

Bệnh nhân suy gan trung bình đến nặng (Child Pugh B hoặc C) do xơ gan có tăng nồng độ gefitinib trong huyết tương. Nên theo dõi chặt chẽ các phản ứng ngoại ý ở các bệnh nhân này. Nồng độ trong huyết tương không tăng ở bệnh nhân có tăng aspartat transaminase (AST), alkaline phosphatase hoặc bilirubin do di căn gan (xem phần "Đặc tính dược động học").

#### *Suy thận*

Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận có độ thanh thải creatinin >20 ml/phút. Có rất ít số liệu ở bệnh nhân độ thanh thải creatinin ≤20 ml/phút và cần thận trọng khi sử dụng thuốc ở nhóm bệnh nhân này (xem phần "Đặc tính dược động học").

#### *Bệnh nhân cao tuổi*

*Handwritten mark*

Không cần điều chỉnh liều dựa vào lứa tuổi của bệnh nhân (xem phần “Đặc tính dược lực học”).

#### *Bệnh nhân có suy giảm enzym CYP2D6*

Không có khuyến cáo chỉnh liều cụ thể ở bệnh nhân có kiểu gen chuyển hóa qua CYP2D6 giảm, nhưng ở các bệnh nhân này nên được theo dõi chặt chẽ các phản ứng ngoại ý (xem phần “Đặc tính dược lực học”).

#### *Điều chỉnh liều khi có độc tính của thuốc*

Bệnh nhân bị tiêu chảy hoặc có phản ứng ngoại ý trên da mà không dung nạp có thể được kiểm soát thành công khi ngưng dùng thuốc trong một thời gian ngắn ( $\leq 14$  ngày) và sau đó dùng trở lại liều 250 mg (xem phần “Tác dụng không mong muốn”). Đối với bệnh nhân không thể dung nạp thuốc sau một đợt ngắt quãng điều trị, nên ngưng sử dụng gefitinib và cân nhắc phương pháp điều trị thay thế.

#### Cách dùng:

Có thể uống thuốc trong hoặc ngoài bữa ăn, cùng một thời gian trong ngày. Thuốc có thể được nuốt nguyên viên cùng với một ít nước hoặc trường hợp không thể nuốt nguyên viên thuốc thì có thể phân tán viên thuốc trong nước. Nên thả viên thuốc trong nửa ly nước uống (không chứa carbonat). Không nên dùng chung với các thức uống khác. Không được nghiền viên thuốc, thả nguyên viên thuốc trong nửa ly nước. Khuấy đều cho đến khi viên thuốc phân tán hoàn toàn (khoảng 20 phút) và uống dịch thuốc ngay lập tức sau khi thuốc phân tán hoàn toàn (nghĩa là trong vòng 60 phút). Tráng ly với nửa ly nước và uống. Dịch thuốc phân tán cũng có thể được dùng qua ống thông mũi-dạ dày hoặc ống thông dạ dày.

#### **CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

Quá mẫn với hoạt chất hay tá dược.

Phụ nữ đang cho con bú.

#### **LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG**

##### Thân trong

Khi xem xét sử dụng IRESSA để điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển hoặc di căn, khuyến cáo xét nghiệm đánh giá đột biến EGFR tại mô khối u cho tất cả các bệnh nhân. Nếu mẫu khối u không thể đánh giá được, thì có thể sử dụng mẫu DNA của khối u trong hệ tuần hoàn (ctDNA) thu thập từ mẫu máu (huyết tương). Chỉ dùng các phương pháp xét nghiệm có độ tái lập, độ tin cậy, độ nhạy cùng với tiện ích đã được chứng minh về xác định tình trạng đột biến EGFR của khối u hay ctDNA để tránh kết quả âm tính giả hay dương tính giả (xem phần “Đặc tính dược lực học”).

##### *Bệnh phổi mô kẽ (ILD)*

Bệnh phổi mô kẽ, có thể khởi phát cấp tính, đã được quan sát thấy ở 1,3% bệnh nhân đang dùng gefitinib, và một vài trường hợp có thể bị tử vong (xem phần Tác Dụng Không Mong Muốn). Nếu bệnh nhân có biểu hiện xấu đi với các triệu chứng hô hấp như khó thở, ho và sốt, nên ngừng IRESSA và cho kiểm tra ngay. Nếu xác nhận chẩn đoán là bệnh phổi mô kẽ, nên ngưng dùng IRESSA và điều trị bệnh nhân bằng các biện pháp thích hợp.

*MAS*

Trong một nghiên cứu dược lý dịch tễ có đối chứng tại Nhật thực hiện trên 3159 bệnh nhân ung thư phổi loại không tế bào nhỏ (NSCLC) đã được theo dõi trong 12 tuần khi dùng gefitinib hoặc hóa trị, các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh phổi mô kẽ (ILD) như sau đã được xác định (bất kể bệnh nhân dùng IRESSA hoặc hóa trị) là: hút thuốc, tình trạng thể chất kém ( $PS \geq 2$ ), giảm thể tích phổi bình thường có chứng cứ chụp cắt lớp CT ( $\leq 50\%$ ), mới được chẩn đoán NSCLC ( $< 6$  tháng), bệnh phổi mô kẽ (ILD) có sẵn trước, lớn tuổi ( $\geq 55$  tuổi) và bệnh tim đồng thời. Đã ghi nhận gia tăng nguy cơ bệnh phổi mô kẽ ở nhóm dùng gefitinib so với hóa trị chủ yếu trong vòng 4 tuần đầu sử dụng (giá trị OR hiệu chỉnh 3,8; 95% CI 1,9 – 7,7); sau đó nguy cơ tương đối thấp hơn (giá trị OR hiệu chỉnh 2,5; 95% CI 1,1-5,8). Trong số bệnh nhân bị ILD ở cả 2 nhóm IRESSA và hóa trị thì nguy cơ tử vong cao ở nhóm bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ sau: hút thuốc, giảm thể tích phổi bình thường có chứng cứ chụp cắt lớp CT ( $\leq 50\%$ ), bệnh phổi mô kẽ (ILD) có sẵn trước, lớn tuổi ( $\geq 65$  tuổi) và các vùng dính liền với màng phổi quá rộng ( $\geq 50\%$ ).

#### *Ngộ độc gan và suy giảm chức năng gan*

Bất thường xét nghiệm chức năng gan (bao gồm tăng alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase, bilirubin) đã được ghi nhận nhưng ít khi có biểu hiện viêm gan (xem phần "Tác dụng không mong muốn"). Vài báo cáo riêng lẻ suy chức năng gan mà một số trường hợp dẫn đến tử vong. Vì vậy, bệnh nhân được khuyến cáo nên kiểm tra chức năng gan định kỳ. Gefitinib nên được dùng thận trọng trên bệnh nhân có thay đổi chức năng gan ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Cần nhắc ngưng sử dụng thuốc nếu các thay đổi là nghiêm trọng.

Suy giảm chức năng gan do xơ gan đã được ghi nhận là dẫn đến tăng nồng độ gefitinib trong huyết tương (xem phần "Đặc tính dược lực học").

#### *Tương tác với các thuốc khác*

Các chất gây cảm ứng với hệ enzym CYP3A4 có thể làm tăng chuyển hóa gefitinib và giảm nồng độ gefitinib trong huyết tương. Vì vậy, khi phối hợp với các chất gây cảm ứng CYP3A4 (như phenytoin, carbamazepin, rifampicin, barbiturat hoặc chế phẩm từ dược liệu có chứa *St John's Wort/Hypericum perforatum*) có thể làm giảm hiệu lực của thuốc và vì thế nên tránh sử dụng chung các thuốc này (xem phần Tương Tác Thuốc và các Dạng Tương Tác Khác).

Ở các bệnh nhân có kiểu gen chuyển hóa qua CYP2D6 giảm, điều trị bằng thuốc ức chế mạnh CYP3A4 có thể dẫn đến tăng nồng độ của gefitinib trong huyết tương. Khi bắt đầu điều trị bằng thuốc ức chế CYP3A4, bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ các phản ứng ngoại ý của gefitinib (xem phần "Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác").

Tăng INR (International Normalised Ratio) và/hoặc các biến cố xuất huyết đã được báo cáo ở một số bệnh nhân đang dùng warfarin (xem phần "Tương Tác Thuốc và các Dạng Tương Tác Khác"). Nên thường xuyên theo dõi sự thay đổi về thời gian prothrombin (PT) hoặc INR ở bệnh nhân đang dùng warfarin.

Các thuốc làm tăng đáng kể và kéo dài độ pH dịch vị như thuốc ức chế bơm proton và thuốc đối kháng thụ thể  $H_2$  có thể làm giảm sinh khả dụng và nồng độ gefitinib trong huyết tương và vì thế có thể giảm hiệu lực của thuốc. Thuốc kháng acid nếu dùng thường xuyên gần thời điểm uống thuốc gefitinib có thể có tác động tương tự (xem phần "Tương Tác Thuốc và các Dạng Tương Tác Khác" và "Đặc Tính Dược Động Học").

Dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng pha II, khi dùng đồng thời gefitinib và vinorelbin cho thấy gefitinib có thể làm tăng tác động giảm bạch cầu trung tính của vinorelbin.

#### *Lactose*

IRESSA có chứa lactose. Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiếm gặp kém dung nạp galactose, thiếu hụt Lapp lactose hoặc kém hấp thu glucose-galactose thì không nên dùng thuốc này.

#### *Các thận trọng khác:*

Nên khuyên bệnh nhân khám bác sĩ ngay lập tức khi có tiêu chảy trầm trọng hoặc dai dẳng, buồn nôn, nôn hoặc biếng ăn mà có thể gián tiếp dẫn tới mất nước cơ thể. Các triệu chứng này có thể được xử trí theo bệnh cảnh lâm sàng (xem phần Tác Dụng Không Mong Muốn).

Bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng nghi ngờ viêm giác mạc như tình trạng cấp tính hay trầm trọng hơn: viêm mắt, tuyến lệ, mẫn cảm với ánh sáng, nhìn mờ, đau mắt và/hoặc đỏ mắt nên nhanh chóng tham vấn bác sĩ chuyên khoa mắt.

Nếu chẩn đoán đã xác định là viêm loét giác mạc, nên ngưng điều trị với gefitinib và nếu các triệu chứng không hết hẳn hoặc tái phát khi sử dụng lại gefitinib, cân nhắc ngưng sử dụng lâu dài gefitinib.

Trong 1 nghiên cứu pha I/II sử dụng gefitinib và xạ trị ở bệnh nhân nhi mới được chẩn đoán u thần kinh đệm cuống não (brain stem glioma) hoặc u thần kinh đệm ác tính trên lều đã được cắt bỏ không hoàn toàn (incompletely resected supratentorial malignant glioma), có 4 trường hợp xuất huyết ở hệ thần kinh trung ương (trong đó có 1 trường hợp tử vong) đã được ghi nhận trong 45 bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Một trường hợp xuất huyết ở hệ thần kinh trung ương ở trẻ u màng não thất (ependymoma) cũng được ghi nhận trong thử nghiệm dùng gefitinib đơn thuần. Việc tăng nguy cơ xuất huyết não ở bệnh nhân trưởng thành bị ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ dùng IRESSA chưa được thiết lập.

Đã có ghi nhận thủng dạ dày ruột ở bệnh nhân dùng gefitinib. Trong đa số các trường hợp, điều này có liên quan đến các yếu tố nguy cơ đã biết khác, bao gồm tuổi cao, sử dụng đồng thời các thuốc khác như steroid, kháng viêm NSAID, bệnh nền loét dạ dày ruột, hút thuốc hoặc di căn ở ruột tại vị trí thủng.

#### Phụ nữ có thai và cho con bú

##### *Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản*

Khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không nên có thai trong quá trình điều trị với thuốc này.

##### *Phụ nữ mang thai*

Chưa có dữ liệu về việc dùng gefitinib cho phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật đã chứng tỏ thuốc có độc tính trên hệ sinh sản. Chưa biết khả năng nguy cơ đối với con người. Không nên dùng IRESSA trong thai kỳ trừ khi thật sự rất cần thiết.

##### *Phụ nữ đang cho con bú*

Hiện vẫn chưa biết liệu gefitinib có bài tiết qua sữa ở người hay không. Gefitinib và các chất chuyển hóa của gefitinib đi vào sữa của chuột thí nghiệm. Chồng chỉ định dùng

gefitinib trong khi đang cho con bú và vì thế phụ nữ đang cho con bú phải ngưng cho con bú trong khi điều trị bằng IRESSA (xem phần "Chống chỉ định").

#### Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Đã có báo cáo về triệu chứng suy nhược trong khi điều trị bằng gefitinib. Do đó, các bệnh nhân có triệu chứng này nên thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy.

### **TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC**

Gefitinib chuyển hóa qua cytochrom P450, chủ yếu là isoenzym CYP3A4 và qua CYP2D6.

#### *Các thuốc có thể làm tăng nồng độ gefitinib trong máu*

Các nghiên cứu *in-vitro* cho thấy gefitinib là một chất nền của glycoprotein. Các dữ liệu hiện nay không có chỉ ra bất kỳ mối liên quan lâm sàng với phát hiện *in-vitro* này.

Các thuốc ức chế CYP3A4 có thể làm giảm độ thanh thải của gefitinib. Sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế mạnh hoạt động của CYP3A4 (như ketoconazol, posaconazol, voriconazol, thuốc ức chế enzym protease, clarithromycin, telithromycin) có thể làm tăng nồng độ gefitinib trong huyết tương. Sự gia tăng này có thể có ý nghĩa về mặt lâm sàng vì đã ghi nhận các phản ứng ngoại ý liên quan đến liều và nồng độ thuốc trong cơ thể.

Sự gia tăng này có thể cao hơn ở cá thể bệnh nhân có kiểu gen chuyển hóa qua CYP2D6 giảm. Điều trị trước với itraconazol (một thuốc ức chế CYP3A4 mạnh) đã làm tăng 80% trị số AUC trung bình của gefitinib ở người tình nguyện khỏe mạnh. Nếu dùng đồng thời với thuốc ức chế CYP3A4, nên theo dõi chặt chẽ các phản ứng ngoại ý của gefitinib.

Chưa có dữ liệu về việc điều trị đồng thời với thuốc ức chế CYP2D6 nhưng các thuốc ức chế mạnh enzym này có thể làm tăng nồng độ gefitinib trong huyết tương khoảng 2 lần ở các bệnh nhân có chuyển hóa mạnh qua CYP2D6. Nếu dùng đồng thời với thuốc ức chế mạnh CYP2D6, nên theo dõi chặt chẽ các phản ứng ngoại ý trên bệnh nhân.

#### *Các thuốc làm giảm nồng độ gefitinib trong huyết tương*

Các thuốc cảm ứng CYP3A4 có thể làm tăng chuyển hóa và làm giảm nồng độ gefitinib trong huyết tương và vì thế làm giảm hiệu lực của gefitinib. Nên tránh sử dụng đồng thời với các thuốc cảm ứng CYP3A4 (như phenytoin, carbamazepin, rifampicin, barbiturat hoặc cỏ St John's wort (*Hypericum perforatum*)). Điều trị trước với rifampicin (thuốc cảm ứng CYP3A4 mạnh) ở người tình nguyện khỏe mạnh làm giảm khoảng 83% trị số AUC trung bình (xem phần "Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng").

Các thuốc làm tăng đáng kể nồng độ pH dịch vị có thể làm giảm nồng độ gefitinib trong huyết tương và vì thế làm giảm hiệu lực của gefitinib. Liều cao các thuốc kháng acid tác động ngắn có thể có tác động tương tự nếu dùng thường xuyên sát thời điểm dùng gefitinib. Dùng đồng thời gefitinib với ranitidin ở mức liều làm tăng kéo dài pH dịch vị  $\geq 5$  dẫn đến giảm khoảng 47% trị số AUC trung bình ở người tình nguyện khỏe mạnh (xem phần "Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng" và "Đặc tính dược lực")

#### *Các thuốc bị thay đổi nồng độ trong huyết tương do ảnh hưởng của gefitinib*

Các nghiên cứu *in-vitro* cho thấy gefitinib ít có khả năng ức chế CYP2D6. Trong một thử nghiệm lâm sàng, gefitinib được dùng đồng thời với metoprolol (một chất nền của CYP2D6). Điều này làm tăng 35% nồng độ và thời gian tiếp xúc với metoprolol. Việc gia

tăng này có ý nghĩa với các chất nền CYP2D6 có chỉ số điều trị hẹp. Cân nhắc khi sử dụng các chất nền CYP2D6 phối hợp với gefitinib, cần điều chỉnh liều của chất nền CYP2D6, đặc biệt là các thuốc có cửa sổ trị liệu hẹp.

Gefitinib ức chế protein vận chuyển BCRP *in-vitro*, nhưng vẫn chưa rõ các mối liên quan trên lâm sàng với phát hiện này.

#### *Các khả năng tương tác khác*

Tăng INR và/hoặc các biến cố xuất huyết đã được báo cáo ở một vài bệnh nhân dùng warfarin (xem phần “Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng”).

### **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

#### Tóm tắt dữ liệu an toàn thuốc

Dữ liệu gộp từ các thử nghiệm lâm sàng pha III như ISEL, INTEREST và IPASS (thực hiện trên 2462 bệnh nhân điều trị với IRESSA), các phản ứng ngoại ý do thuốc (ADR) thông thường nhất được ghi nhận xảy ra trên > 20% bệnh nhân là tiêu chảy và phản ứng trên da (bao gồm nổi mẩn, mụn, da khô và ngứa). Các phản ứng ngoại ý do thuốc thường xuất hiện trong tháng đầu điều trị và nói chung có thể tự hết. Khoảng 8% bệnh nhân có phản ứng ngoại ý trầm trọng (độ 3 và 4 theo Tiêu chuẩn Đánh giá Độc tính Thường gặp - CTC: Common Toxicity Criteria). Tuy nhiên, chỉ có 3% bệnh nhân là phải ngưng điều trị do phản ứng ngoại ý.

Bệnh phổi mô kẽ (ILD) xảy ra ở 1,3% bệnh nhân, thường gặp mức độ nghiêm trọng (độ 3-4 theo Tiêu chuẩn Đánh giá Độc tính Thường gặp). Cũng có ghi nhận hậu quả là tử vong.

#### Bảng phân loại phản ứng ngoại ý

Dữ liệu an toàn thuốc trình bày trong Bảng 7 được dựa trên các chương trình phát triển lâm sàng của gefitinib. Phản ứng ngoại ý được sắp xếp theo cột tần số ở Bảng 7 nếu có thể dựa trên tỷ lệ các báo cáo phản ứng ngoại ý có thể so sánh được trong dữ liệu gộp từ các thử nghiệm lâm sàng pha III như ISEL, INTEREST và IPASS (trên 2462 bệnh nhân điều trị với IRESSA).

Tần số xảy ra các phản ứng ngoại ý được xác định như sau: rất thường gặp ( $\geq 1/10$ ); thường gặp ( $> 1/100 - < 1/10$ ); ít gặp ( $\geq 1/1,000 - < 1/100$ ); hiếm gặp ( $\geq 1/10,000 - < 1/1,000$ ); rất hiếm gặp ( $< 1/10,000$ ), chưa biết (không thể dự đoán từ các dữ liệu sẵn có).

Trong mỗi nhóm phân loại, các phản ứng ngoại ý được sắp xếp theo trình tự mức độ giảm dần.

#### **Bảng 7 Phản ứng ngoại ý**

Phản ứng ngoại ý phân loại theo cơ quan và tần số		
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Rất thường gặp	Biếng ăn có bản chất nhẹ hoặc trung bình (CTC độ 1 hoặc 2).
Rối loạn mắt	Thường gặp	Viêm kết mạc, mồng mắt và khô mắt*, chủ yếu có bản chất nhẹ (CTC độ 1).

*N/A*



	Ít gặp	Viêm xước giác mạc, có thể hồi phục và đôi khi kèm với lông mi mọc lạc chỗ. Viêm giác mạc (0,12%)
Rối loạn mạch máu	Thường gặp	Xuất huyết, như chảy máu cam và tiểu máu.
Rối loạn hệ hô hấp, lồng ngực và trung thất	Thường gặp	Bệnh phổi mô kẽ (1,3%), thường nghiêm trọng (CTC độ 3-4). Đã có báo cáo về các hậu quả nguy hiểm đến tính mạng.
Rối loạn hệ tiêu hóa	Rất thường gặp	Tiêu chảy chủ yếu có bản chất nhẹ hoặc trung bình (CTC độ 1 hoặc 2)
		Nôn mửa chủ yếu có bản chất nhẹ hoặc trung bình (CTC độ 1 hoặc 2).
		Buồn nôn chủ yếu có mức độ nhẹ (CTC độ 1).
	Thường gặp	Viêm miệng chủ yếu có bản chất nhẹ (CTC độ 1).
		Mất nước thứ phát do tiêu chảy, buồn nôn, nôn hoặc biếng ăn. Khô miệng* chủ yếu có bản chất nhẹ (CTC độ 1).
Ít gặp	Viêm tụy, thủng dạ dày ruột.	
Rối loạn gan mật	Rất thường gặp	Tăng alanin aminotransferase chủ yếu có mức độ nhẹ đến trung bình.
	Thường gặp	Tăng aspartate aminotransferase chủ yếu có mức độ nhẹ đến trung bình.
		Tăng bilirubin toàn phần chủ yếu có mức độ nhẹ đến trung bình.
Ít gặp	Viêm gan***	
Rối loạn da và mô dưới da	Rất thường gặp	Phản ứng trên da chủ yếu nổi mẩn dạng mụn mủ nhẹ hoặc vừa (CTC độ 1 hoặc 2), đôi khi ngứa với da khô, bao gồm nứt nẻ trên nền ban đỏ.
	Thường gặp	Rối loạn móng
		Rụng tóc
	Ít gặp	Phản ứng dị ứng**, gồm phù mạch và nổi mề đay.
Hiếm gặp	Bóng nước bao gồm hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Stevens Johnson và hồng ban đa dạng.	

		Viêm mao mạch da
Rối loạn thận và tiết niệu	Thường gặp	Tăng creatinin máu không triệu chứng
		Protein niệu
		Viêm bàng quang
	Hiếm gặp	Viêm bàng quang xuất huyết
Rối loạn tổng quát	Rất thường gặp	Suy nhược chủ yếu mức độ nhẹ (CTC độ 1).
	Thường gặp	Sốt

Tần số phản ứng ngoại ý có liên quan đến các kết quả xét nghiệm bất thường là dựa trên các bệnh nhân có thay đổi CTC độ 2 hoặc lớn hơn so với nền chuẩn của các thông số xét nghiệm có liên quan.

\*Biến cố này có thể xảy ra kết hợp với các tình trạng khô khác (chủ yếu là phản ứng trên da) đã ghi nhận với IRESSA.

\*\* Tần suất toàn bộ phản ứng ngoại ý về phản ứng dị ứng ghi nhận trong phân tích gộp các thử nghiệm ISEL, INTEREST và IPASS là 1,5% (36 bệnh nhân). 14 trong số 36 bệnh nhân bị loại trừ khỏi tần suất được báo cáo do không có căn nguyên dị ứng hoặc do phản ứng dị ứng là kết quả khi dùng 1 dược phẩm khác.

\*\*\* Bao gồm vài báo cáo riêng lẻ suy gan mà một số trường hợp dẫn đến tử vong

#### *Bệnh phổi mô kẽ (ILD)*

Trong nghiên cứu lâm sàng INTEREST, tỷ lệ các loại phản ứng ngoại ý là 1,4% (10) bệnh nhân trong nhóm gefitinib so với 1,1% (8) bệnh nhân trong nhóm docetaxel. Một phản ứng ngoại ý loại bệnh phổi mô kẽ gây tử vong và đã xảy ra ở một bệnh nhân thuộc nhóm gefitinib.

Trong nghiên cứu lâm sàng ISEL, tần suất biến cố loại ILD ở toàn bộ bệnh nhân là tương tự nhau và khoảng 1% ở cả 2 nhánh điều trị. Đa số biến cố loại ILD ghi nhận là ở bệnh nhân thuộc chủng tộc Châu Á và tần suất xảy ra ILD giữa nhóm bệnh nhân Châu Á điều trị bằng IRESSA và nhóm dùng giả dược là khoảng 3% và 4 % theo thứ tự tương ứng. Có 1 bệnh nhân thuộc nhóm dùng giả dược có biến cố ILD tử vong.

Trong một nghiên cứu theo dõi sau khi đưa thuốc ra thị trường tại Nhật (3350 bệnh nhân), tỷ lệ biến cố loại ILD được ghi nhận ở bệnh nhân dùng gefitinib là 5,8%. Tỷ lệ của các phản ứng ngoại ý loại ILD bị tử vong là 38,6%.

Trong thử nghiệm lâm sàng nhân mở pha III (IPASS) trên 1217 bệnh nhân so sánh IRESSA với hóa trị liệu 2 thuốc carboplatin/paclitaxel như là điều trị bước đầu ở những bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại châu Á, tỷ lệ biến cố loại ILD là 2,6% ở nhóm điều trị với IRESSA so với 1,4% ở nhóm điều trị với carboplatin / paclitaxel.

#### **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ**

Không có trị liệu đặc biệt trong trường hợp dùng quá liều gefitinib. Tuy nhiên, trong nghiên cứu lâm sàng pha I, một số ít bệnh nhân đã được điều trị bằng liều lên đến 1000 mg/ngày. Đã ghi nhận sự tăng tần suất và mức độ trầm trọng của một số phản ứng ngoại ý, chủ

yếu là tiêu chảy và ban da. Các phản ứng ngoại ý do dùng quá liều nên được điều trị triệu chứng; đặc biệt tình trạng tiêu chảy nặng nên được điều trị theo chỉ định lâm sàng. Trong một nghiên cứu với số lượng giới hạn bệnh nhân được điều trị hàng tuần với liều từ 1500 mg đến 3500 mg. Trong nghiên cứu này, nồng độ và thời gian tiếp xúc với IRESSA không tăng cùng với liều, các phản ứng ngoại ý chủ yếu ở mức độ nhẹ đến trung bình và phù hợp với các dữ liệu an toàn thuốc IRESSA đã biết.

### CÁC DẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYẾN CÁO

Không áp dụng.

### ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG CỦA THUỐC

Điều kiện bảo quản: Không bảo quản quá 30°C. Bảo quản trong bao bì gốc.

Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

### TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Anh.

### NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

dd/mm/yy

Doc ID-..... Version ...

© AstraZeneca 2003-2016

IRESSA is a trade mark of the AstraZeneca group of companies.

AstraZeneca 



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Phạm Thị Vân Hạnh*

*WAS*