

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 09 / 8 / 2014

12



Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

Phân phối bởi: **CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM**  
ĐC: Nhà 1D - Ngõ 68 - Quan Nhân - Cầu Giấy - Hà Nội  
ĐT: 043. 556 4804 \* Fax: 043. 556 0315

**Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Số lô SX:  
Ngày SX:  
Hạn SD :

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

**PiMATUSSiN**  
Codein phosphat - Guaifenesin - Loratadin

**PiMATUSSiN**  
Codein phosphat 10 mg  
Guaifenesin 50 mg  
Loratadin 5 mg

**DNT** Sản xuất tại:  
**DƯỢC HÀ TÂY** **CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:  
Codein phosphat ..... 10mg  
Guaifenesin ..... 50mg  
Loratadin ..... 5mg  
Tá dược vđ ..... 1 viên.  
**SDK:**

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.  
**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

**PiMATUSSiN**  
Codein phosphat - Guaifenesin - Loratadin

**PiMATUSSiN**  
Codein phosphat 10 mg  
Guaifenesin 50 mg  
Loratadin 5 mg

Phân phối bởi:  
**CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM**  
Quan Nhân - Cầu Giấy - Hà Nội



Codein phosphat - Guaifenesin - Loratadin

# PIMATUSSIN

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm



## PIMATUSSIN

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang mềm chứa:  
 Codein phosphat ..... 10mg  
 Guaifenesin ..... 50mg  
 Loratadin ..... 5mg  
 Tã được vđ ..... 1 viên.

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG -  
 LIỀU DÙNG:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc  
 bên trong hộp.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

**SDK:**

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
 La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

## PIMATUSSIN

- Codein phosphat 10 mg
- Guaifenesin 50 mg
- Loratadin 5 mg

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

## PIMATUSSIN

- Codein phosphat 10 mg
- Guaifenesin 50 mg
- Loratadin 5 mg

Phân phối bởi:  
**CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM**  
 Quan Nhân - Cầu Giấy - Hà Nội

## PIMATUSSIN

Sản xuất tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
 La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

Phân phối bởi:  
**CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM**  
 ĐC: Nhà 1D - Ngõ 68 - Quan Nhân - Cầu Giấy - Hà Nội  
 ĐT: 043.556.4804 • Fax: 043.556.0315

**Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng  
 dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Số lô SX:  
 Ngày SX:  
 Hạn SD :





**Hướng dẫn sử dụng thuốc:**  
**PIMATUSSIN**

- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm.

- **Thành phần:** Mỗi viên nang mềm chứa:

Guaifenesin	50mg	Loratadin	5mg
Codein phosphat	10mg	Tá dược vđ	1 viên

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, dầu cọ, lecithin, aerosil, gelatin, glycerin, dung dịch sorbitol 70%, sáp ong trắng, nipagin, nipasol, vanilin, titan dioxyd, phẩm màu Chocolate, phẩm màu Ponceau 4R, phẩm màu Sunset yellow, nước tinh khiết, ethanol 90%).

- **Chỉ định:**

- Làm giảm các triệu chứng ho do cảm lạnh, ho dị ứng.
- Có tác dụng long đờm.
- Làm giảm các triệu chứng của bệnh cúm: hắt hơi, sổ mũi, viêm mũi.

- **Cách dùng và liều dùng:** Trung bình:

+ Người lớn: Uống 1 viên/ngày x 2 lần/ngày. Tối đa không quá 7 ngày.

- **Chống chỉ định:**

- Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Bệnh nhân bệnh gan hoặc suy hô hấp.
- Phụ nữ có thai
- Trẻ em dưới 18 tuổi vừa thực hiện cắt amidan hoặc thủ thuật nạo V.A

- **Thận trọng:**

- Do nguy cơ suy hô hấp, chỉ sử dụng các thuốc chứa codein để giảm đau cấp tính ở mức độ trung bình cho trẻ trên 12 tuổi khi các thuốc giảm đau khác như paracetamol và ibuprofen không có hiệu quả.
- Codein chỉ nên được sử dụng ở liều thấp nhất mà có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất.
- Không khuyến cáo sử dụng codein cho trẻ em có các vấn đề liên quan đến hô hấp (Ví dụ: khó thở hoặc thở khò khè khi ngủ...).
- Thận trọng khi sử dụng codein cho trẻ em dưới 12 tuổi (do thông tin nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc cho đối tượng này còn hạn chế)
- Các bệnh đường hô hấp như hen, khí phế thũng. Suy giảm chức năng gan, thận. Có tiền sử nghiện thuốc.
- Không dùng để giảm ho trong các bệnh nung mù phổi, phế quản khi cần khắc đờm mù.
- Khi dùng Loratadin có nguy cơ gây khô miệng, đặc biệt ở người cao tuổi, và tăng nguy cơ sâu răng. Do đó cần phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi uống thuốc.

- **Tương tác thuốc:**

*Codein:* Codein làm giảm chuyển hóa cyclosporin do ức chế men cytochrom P450.

*Loratadin:* Điều trị đồng thời Loratadin với Cimetidin, ketoconazol, erythromycin đều làm tăng nồng độ

Loratadin trong huyết tương nhưng không có biểu hiện lâm sàng vì Loratadin có chỉ số điều trị rộng.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

- **Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Thuốc dùng được khi lái xe và vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

+ Không thường xuyên: Một số phản ứng phụ ở đường tiêu hoá như đau đầu, khô miệng, buồn nôn, táo bón.

+ Trong rất ít trường hợp, có thể thấy nổi ban da.

*Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

- **Sử dụng quá liều và xử trí:**

*Quá liều Codein*

- **Triệu chứng:** Suy hô hấp (làm giảm nhịp thở, hô hấp Cheyne – Stokes, xanh tím). Lơ mơ dẫn đến trạng thái đờ đẫn hoặc hôn mê, mềm cơ, da lạnh và ẩm, đôi khi mạch chậm và hạ huyết áp. Trong trường hợp nặng: ngừng thở, trụy mạch.

- **Điều trị:** Phải hồi phục hô hấp bằng cách cung cấp dưỡng khí và hô hấp hỗ trợ có kiểm soát. Chỉ định ngay naloxon bằng đường tiêm tĩnh mạch trong trường hợp nặng.

*Quá liều Loratadin*

- **Triệu chứng:** Buồn ngủ, nhịp tim nhanh, nhức đầu.

*pa*

- **Điều trị:** Thường là điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Trong trường hợp ngộ độc cấp có thể gây nôn, rửa dịch dạ dày, dùng than hoạt để ngăn hấp thu.
- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**
- \* **Lưu ý:** Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, viên thuốc bị nứt, vỡ, chảy thuốc, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 03 vi x 10 viên nang mềm, Hộp 10 vi x 10 viên nang mềm.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

"**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ**"

**THUỐC SẢN XUẤT TẠI:**  
**CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
*L a Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội*  
**ĐT: 04.33522203 - 33516101 FAX: 04.33522203**  
**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**



**PHÓ CỤC TRƯỞNG**  
*Nguyễn Văn Lành*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*DS. Nguyễn Bá Lai*

