

Rx Thuốc kê đơn

POANVAG

Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của thầy thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ

Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thành phần:

Mỗi viên nang mềm đặt âm đạo chứa:

Clindamycin Phosphate BP tương đương với

Clindamycin..... 100 mg

Clotrimazole BP 200 mg

Tá dược: Glycerol Monostearate, White Soft Paraffin, Liquid Paraffin, Gelatin, Glycerin, Titan dioxide, Tá dược màu Sunset yellow, Tá dược màu Erythrosine, Nước tinh khiết.

Dược lực học:

POANVAG kết hợp 2 tác nhân diệt khuẩn: Clindamycin là kháng sinh thuộc nhóm lincosamid, Clotrimazole là tác nhân chống nấm. Các thành phần này tạo cho POANVAG hiệu quả chống nấm và ký sinh trùng ở âm đạo.

Tác dụng của Clindamycin là do ức chế tổng hợp protein của vi khuẩn. Thuốc tác động trên cầu khuẩn Gram dương ưa khí, trực khuẩn Gram âm kỵ khí, trực khuẩn Gram dương kỵ khí không sinh nha bào, Cầu khuẩn Gram dương kỵ khí và 1 số vi khuẩn khác

Clotrimazol là thuốc chống nấm phô rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau, đặc biệt là *Candida albicans* và cũng có tác dụng trên *Trichomonas*, *Staphylococcus* và *Bacteroides*.

Dược động học :

Sự hấp thu Clindamycin khi sử dụng đường đặt âm đạo tăng lên trong các trường hợp có viêm nhiễm. Thuốc được bài tiết một phần qua nước tiểu dưới dạng hoạt động hay chất chuyển hóa, một lượng nhỏ bài tiết qua phân.

Clotrimazole thâm nhập cục bộ qua lớp biểu bì nhưng chỉ có 1 lượng nhỏ được hấp thu (3% đến 10%). Clotrimazole được chuyển hóa trong gan. dạng hợp chất không hoạt động và thải trừ qua phân và nước tiểu.

Chỉ định :

POANVAG được chỉ định cho các trường hợp: viêm âm đạo, viêm âm hộ- âm đạo và viêm cổ tử cung gây nên do vi khuẩn, *Trichomonas vaginalis*, nấm *Candida* hoặc do các nguyên nhân phối hợp

Liều lượng và cách dùng :

Sử dụng 1 viên đặt âm đạo hàng ngày, liên tục trong ít nhất 7 ngày. Trong 1 vài trường hợp sử dụng có thể dùng 2 viên đặt trong 1 ngày theo chỉ định của bác sĩ.

Đặt viên thuốc vào sâu trong âm đạo. Sẽ tốt hơn nếu đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nên đặt thuốc ở tư thế nằm, đầu gối gấp lại và hai đầu gối dịch ra xa nhau. Nên tiếp tục giữ tư thế nằm trong 15 phút sau khi đặt thuốc.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Khuyến cáo và thận trọng:

- Thuốc chỉ dùng đặt âm đạo. Không được uống.
- Không dùng thuốc trong kỳ kinh nguyệt.
- Cần thận trọng khi sử dụng thuốc này cho người bệnh có bệnh đường tiêu hóa hay có tiền sử viêm đại tràng, người bệnh cao tuổi nhạy cảm đặc biệt với thuốc.
- Nên giảm việc sử dụng các thức uống có chứa cồn trong thời gian

- điều trị với thuốc này (nguy cơ gặp những phản ứng kiểu đỏ bừng mặt, bốc hỏa, nôn mửa)
- Bạn tình của bệnh nhân cũng phải được điều trị để tránh tái nhiễm cho bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp cần điều trị phối hợp đặt thuốc âm đạo và uống thuốc viên

Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang nuôi con bú:

Chưa có đủ số liệu nghiên cứu lâm sàng về tính an toàn của thuốc đối với phụ nữ mang thai và cho con bú, nên chỉ dùng thuốc cho nhóm bệnh nhân này khi thật cần thiết. Cần cân nhắc giữa các lợi ích đạt được và các nguy cơ có thể xảy ra.

Nếu phát hiện có thai trong thời gian điều trị, phải nhanh chóng hỏi ý kiến của bác sĩ để được điều chỉnh điều trị cho phù hợp với tình trạng của bệnh nhân.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc:

Phải chú ý vì thuốc này có thể gây ra chóng mặt.

Tương tác thuốc:

Nhằm tránh tương tác giữa các thuốc, nhất là với disulfirame, cần thông báo cho bác sĩ mọi thuốc khác đang sử dụng.

Clindamycin có thể ức chế tác dụng của Erythromycin và ngược lại. Thuốc có thể làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai steroid dạng uống. Diphenoxylat, loperamide hoặc opiat (những chất chống nhu động ruột) có thể làm trầm trọng thêm hội chứng viêm đại tràng do dùng clindamycin vì chúng làm chậm thải độc tố.

Sử dụng đường đặt âm đạo Clotrimazole không cho thấy sự tương tác với các tác nhân giảm đường huyết nên không ảnh hưởng đến các đồi tượng tiêu đường.

Mặt khác, tất cả các điều trị âm đạo tại chỗ đều có thể làm bất hoạt biện pháp tránh thai bằng tác nhân diệt tinh trùng tại chỗ.

Tác dụng không mong muốn:

Clindamycin: có khả năng hấp thụ thay đổi trong sử dụng cục bộ, nhưng có thể cũng gây nên buồn nôn, nôn, phản ứng mẫn cảm như ngứa, phát ban, hoặc tinh quá mẫn.

Clotrimazole: Sau khi sử dụng Clotrimazole, khó chịu tiêu hóa, các phản ứng cục bộ bao gồm kích thích và cảm giác nóng rát đã được báo cáo.

Quá liều: Chưa có kinh nghiệm về quá liều do cố ý.

Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN SỬ DỤNG GHI TRÊN NHÃN.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 7 viên

Sản xuất bởi:

GELNOVA LABORATORIES (India) PVT., LTD.

C-125, T.T.C. Industrial Area, Mahape,
Navi Mumbai 400 705, Dist. Thane, Maharashtra State, India