

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.  
Giữ tờ hướng dẫn để tra cứu khi cần thiết.

# SALONPAS GEL

Chỉ dùng ngoài da

**Không dây dính . Không nhờn . Thấm nhanh**

*Độ hấp thu và duy trì thuốc cao, tạo cảm giác dễ chịu. Dễ sử dụng ở những nơi nhiều lông.*

## Công thức

Hoạt chất

Methyl Salicylate ..... 15%

1-Menthol ..... 7%

Tá dược

Carboxy vinyl polymer

Propylen glycol

Polyoxyethylene oleylamine

Perfume

Hydroxy propyl cellulose

Ethanol

## Dạng bào chế :

Thuốc mỡ bôi ngoài da dạng Gel.

## Chỉ định

Dùng giảm đau, kháng viêm các cơn đau ở cơ & khớp, đau lưng đơn thuần, viêm khớp, căng cơ, bầm tím và bong gân.

## Liều lượng và cách dùng

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: bôi thuốc lên vùng bị đau không quá 3-4 lần trong ngày. Trẻ em dưới 2 tuổi: phải hỏi ý kiến Bác sĩ.

## Tác dụng không mong muốn

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Dị ứng, ngứa, đỏ da hiếm khi xảy ra. Nếu các triệu chứng trên xảy ra quá mức, việc trị liệu bằng SALONPAS GEL phải dừng lại và phải thông báo cho Bác sĩ của bạn.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Không phát hiện

Các đặc tính dược lực học

Hấp thu qua da

Các đặc tính dược động học

Nhiều tác động kích thích dây chuyền được chỉ rõ trong tác dụng giảm đau.

Thuốc kháng viêm dạng Non steroidal (NSSAIDs)

Chống chỉ định

Không bôi thuốc lên vùng da bị tổn thương, vết thương hở, niêm mạc và vùng da quanh mắt. Không để dây vào mắt, trường hợp bị dây vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch hay nước ấm, nếu triệu chứng vẫn còn nặng đến ngay Bác sĩ chuyên khoa mắt. Không dùng cho những người có tiền sử dị ứng với nhóm Salicylate.

Thận trọng khi dùng thuốc

Sử dụng đúng theo hướng dẫn và liều dùng đã quy định. Chỉ dùng ngoài da. Không được nuốt. Không dùng kèm với băng dán nóng. Không băng chặt. Trường hợp sử dụng vài ngày mà triệu chứng không thuyên giảm hoặc mất đi và tái phát lại vài ngày sau đó, ngưng sử dụng và hỏi ý kiến Bác sĩ. Phụ nữ có thai và đang cho con bú phải hỏi ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng.

Điều kiện bảo quản

Đậy kín nắp, giữ thuốc nơi mát, tránh ánh sáng trực tiếp, để xa tầm tay với của trẻ em. Không bỏ thuốc vào những bao bì khác để bảo quản để tránh sử dụng nhầm lẫn.

Tiêu chuẩn áp dụng : Đạt tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng : 48 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc quá hạn dùng.

Dạng đóng gói

- tuýp 15g

- tuýp 30g

Được sản xuất bởi

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

14-15, Đường 2A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 0251 - 3836378

Fax : 0251 - 3836381.