

Rx Thuốc kê đơn

ALPUTINE capsule

Thuốc này chỉ bán theo đơn của Bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sỹ hoặc Dược sỹ.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em, không dùng thuốc quá thời hạn ghi trên bao bì.

Mô tả:

Viên nang cứng màu đỏ.

Công thức: Mỗi viên nang chứa:

Thymomodulin:.....80,0 mg

Tá dược: cellulose vi tinh thể 147,7 mg, acid silicic khan nhẹ 7,0mg
magnesi stearat 5,0 mg, methylparaben 0,2mg, propylparaben 0,1 mg,
vỏ nang vừa đủ.

Các đặc tính dược lực học:

Thymomodulin có tác dụng điều hòa miễn dịch trên mô hình thử nghiệm.

Các đặc tính dược động học:

Ở những người trên 70 tuổi, dùng Thymomodulin gây ra sự xuất hiện tác động giống FTS (facteurthymide serique) đạt mức độ tối đa từ 2-6 giờ, duy trì đến 12 giờ và biến mất sau 48 giờ. Dùng duy nhất những liều Thymomodulin khác nhau (80,160,320), tác dụng phụ thuốc liều dường như tồn tại. Ở liều cao hơn mức độ FTS duy trì lâu dài hơn. Ở người, những dữ liệu này cho thấy khi uống Thymomodulin xuất hiện các chất trong huyết thanh với tác động điều chỉnh sự trưởng thành của các tế bào T và sự hấp thụ ở ruột của Thymomodulin cũng có hiệu quả ở người cao tuổi.

Chỉ định:

- Thuốc chống ung thư và hỗ trợ điều trị tác động vào hệ miễn dịch tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch trong cơ thể người.
- Da liễu: viêm da cơ địa, luput ban đỏ, vẩy nến, xơ cứng bì, móng kẽ rối loạn tự miễn.
- Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn.
- Viêm mũi dị ứng.
- Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn.
- Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân HIV/AIDS.
- Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm, viêm gan.

Liều lượng và cách sử dụng

- Chống ung thư:

Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 1-2 tháng.

- **Da liễu:** Viêm da cơ địa, luput ban đỏ, vẩy nến, sơ cứng bì, mỡng kê, rối loạn tự miễn.

Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 4-6 tháng .

- **Hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn.**

Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 4-6 tháng.

- **Viêm mũi dị ứng**

Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 4 tháng.

- **Hỗ trợ dự phòng tái phát dị ứng thức ăn.**

Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 3-6 tháng

- **Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lâm sàng ở bệnh HIV/AIDS**

Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 50 ngày.

- **Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi, viêm gan**

Liều dùng 160mg/ngày, dùng trong thời gian 6 tuần.

Chống chỉ định:

- Bệnh nhân mẫn cảm với thuốc này. .

Thận trọng:

1. **Phản ứng thuốc:** Dị ứng có thể xảy ra với bệnh nhân mẫn cảm với thuốc này.

2. **Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc :** Thymomodulin là dịch chiết tuyến ức từ con bê. Người ta đề nghị không được dùng các chế phẩm này như là chất bổ sung dinh dưỡng.

3. **Tương tác với các thuốc khác, các tương tác khác:** các peptide hoặc dẫn chất protein mạch ngăn từ tuyến ức được phối hợp với các hóa trị liệu và tăng thời gian sống sót khi dùng hóa trị liệu

4. Chưa xác định tính an toàn khi sử dụng cho phụ nữ có thai.

Bảo quản: Trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C và tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đóng gói: 6 vỉ x 10 viên nang/ hộp

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất

Số ĐK/ Visa No: VN - 15485 - 12

Nhà Sản Xuất : KOREA ARLICO PHARM CO., LTD.

21. Yongso 2-gil, Gwanghyewon, Jincheon-gun, chungcheongbuk-do, Hàn Quốc.