



Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

ARTHOEASE 500 & 1500

(Glucosamin 500mg & 1500mg)

**Thành phần:**

Mỗi viên ArthroEase 500 chứa:
 Glucosamin sulfat natri clorid.....627,9mg
 (Tương đương Glucosamin 392,5mg)

Talcum, magnesi stearat.....vừa đủ 1 viên
 Mỗi gói ArthroEase 1500 chứa:

Glucosamin sulfat natri clorid.....1883,9mg
 (Tương đương Glucosamin 1177,4mg)
 PEG 6000, Lactose, Aspartam.....vừa đủ 1 gói

Các đặc tính dược lực học:

Glucosamin tham gia quá trình chuyển hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Là một amino-monosaccharide, nguyên liệu để tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình tổng hợp là muco-polysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp. Glucosamin đồng thời ức chế các enzym phá hủy sụn khớp như collagenase, phospholipase A₂ và giảm các gốc tự do superoxide phá hủy các tế bào sinh sụn. Glucosamin còn kích thích mô sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá trình mất calci của xương.

Do Glucosamin làm tăng sản xuất chất nhầy dịch khớp nên tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vì thế Glucosamin không những làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp (đau, khó vận động) mà còn ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

Thuốc tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái hóa khớp, điều trị các bệnh thoái hóa xương khớp cả cấp và mạn tính, có đau hay không có đau, cải thiện chức năng khớp và ngăn chặn bệnh tiến triển, phục hồi cấu trúc sụn khớp.

Các đặc tính dược động học:

Khi uống, 90% thuốc được hấp thu qua đường tiêu hóa. Trong máu Glucosamin không liên kết với protein huyết tương. Chuyển hóa qua gan, sản phẩm chuyển hóa cuối cùng là CO₂, nước và urea. Thải trừ qua nước tiểu.

Chỉ định:

Giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

Chống chỉ định:

Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị.

Tác dụng không mong muốn:

Hiếm gặp, nhìn chung rất nhẹ, thoáng qua.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn khi gặp phải.

Độc quyền phân phối: INDECO.,JSC

**HÀ NỘI:**

Lô A12/D7 khu ĐTM Cầu Giấy - Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy
 Tel : (84) 4 3792.5055 - 3792.5056 - 3792.5059
 Fax : (84) 4 3792.5057
 Hotline: (84) 4 3772.0772
 Email : hanoi@eloge.vn

Liều lượng và cách dùng

Uống thuốc 15 phút trước bữa ăn.

Với người trên 18 tuổi:

Tên biệt dược	ArthroEase 500	ArthroEase 1500
Dạng bào chế	Viên nang	Gói
Liều dùng	Uống 2 viên/lần, ngày 3 lần	Uống 1 gói/lần, ngày 2 lần

Có thể dùng đơn độc Glucosamin hoặc phối hợp các thuốc khác như Chondroitin với liều 1200mg/ngày.

Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Tương tác với các thuốc khác:

Chưa được ghi nhận.

Thận trọng khi dùng:

Glucosamin không gây rối loạn dạ dày, ruột nên có thể điều trị lâu dài. Điều trị nên nhắc lại 6 tháng hoặc ngắn hơn tùy theo tình trạng bệnh.

Thuốc dùng trong thời kì có thai cần thận trọng và dưới sự theo dõi của bác sĩ.

Glucosamin là thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc chống viêm giảm đau trong những ngày đầu.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc dùng trong thời kì có thai cần thận trọng và dưới sự theo dõi của bác sĩ.

Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:

Chưa được ghi nhận

Quá liều và cách xử trí:

Cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào về các trường hợp quá liều.

Khi sử dụng thuốc quá liều, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói:

ArthroEase 500: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

ArthroEase 1500: Hộp 30 gói x 3g

Hạn dùng:

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

ĐÀ NẴNG:

Số 657 Trần Cao Văn - Q.Thanh Khê
 Tel : (84) 511.3715.778
 Fax : (84) 511.3715.779
 Hotline: (84) 511.3715.777
 Email : danangoffice@eloge.vn

HỒ CHÍ MINH:

Số 80/8 Nguyễn Trãi - P.3 - Q.5 - TP. Hồ Chí Minh
 Tel : (84) 8 3923.9817 - 3923.9816 - 3923.9815
 Fax : (84) 8 3923.9819
 Hotline: (84) 8 2200.2867
 Email : hochiminhoffice@eloge.vn