

PEGinpol

Macrogol 3350 BUSTINE

Utile per il trattamento della stipsi

Dispositivo Medico



Polvere per sospensione orale

1. Indicazioni

PEGinpol è un dispositivo medico ad azione lassativa che, attraverso un meccanismo di tipo osmotico, regolarizza l'intestino in modo naturale. **PEGinpol** è particolarmente indicato nella stitichezza cronica e nei casi di intestino occasionalmente irregolare. Grazie infatti alla sua affinità per l'acqua, **PEGinpol** ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione senza provocare crampi, né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo. Non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata.

2. Composizione

Ogni bustina contiene: 5 g di Macrogol 3350.
Eccipienti: biossido di silicio, aroma, saccarina sodica.

3. Confezione

PEGinpol bustine è una polvere per soluzione orale. La confezione contiene 20 buste monouso.

4. Posologia e Modalità di Assunzione

Da 6 mesi a 2 anni (fino a 12 kg): 1-2 bustine al giorno.
Da 2 a 11 anni (da 12 kg a 20 kg): 2-4 bustine al giorno.
Al di sopra di 11 anni (o > 20 kg): 2-6 bustine al giorno.

Sciogliere una busta (5 g) in circa 1/2 bicchiere d'acqua (circa 62,5 ml).

È possibile suddividere la dose giornaliera in più somministrazioni.

La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della risposta individuale al trattamento. Si consiglia in ogni caso di sentire il parere del medico per la posologia più corretta.

Utilizzare il prodotto in età pediatrica solo dopo consiglio medico.

Normalmente il dosaggio massimo necessario non supera le 6 bustine al giorno.

5. Controindicazioni

Non assumere **PEGinpol** in caso di:

- Stenosi intestinale
- Perforazione intestinale
- Malattie infiammatorie dell'intestino (come ad esempio morbo di Crohn, colite ulcerosa).

Non assumere in caso di ostruzione intestinale.

6. Avvertenze

La sospensione orale deve essere preparata al momento dell'assunzione.

Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l'insorgenza di effetti collaterali inaspettati.

Non usare **PEGinpol** per più di 30 giorni consecutivi, se i sintomi persistono consultare il medico.

Non assumere in caso di intolleranza al prodotto.

Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti ed al Polietilenglicole.

Non utilizzare in bambini al di sotto dei 6 mesi.

Durante il trattamento con **PEGinpol** è consigliabile seguire una dieta adeguata accompagnata dalla somministrazione di una soluzione per la reidratazione orale (ORS) per evitare la disidratazione; si consiglia comunque di consultare il medico.

Non assumere in caso di busta danneggiata.

Ogni busta è monouso e deve essere assunta solo al momento dell'utilizzo.

7. Sovradosaggio

In caso di sovradosaggio possono manifestarsi dolore intenso, distensione addominale, diarrea e vomito da cui potrebbe conseguire uno squilibrio elettrolitico. Qualora dovessero manifestarsi reazioni avverse, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

8. Effetti Indesiderati

Alle dosi necessarie per avere un effetto terapeutico, non si sono mai riscontrati effetti collaterali.

Potrebbero apparire soprattutto in fase iniziale di utilizzo disturbi gastro-intestinali, borborigmi, dolori addominali, nausea e leggere diarree. Raramente si manifestano reazioni di ipersensibilità e reazioni allergiche (rush cutaneo, orticaria).

Consultare il medico o il farmacista qualora dovessero verificarsi reazioni avverse, anche diverse da quelle elencate.

Nel caso si dimentichi l'assunzione non assumere una dose doppia, ma aspettare e assumere la dose successiva.

9. Interazioni con Farmaci e Integratori Alimentari

Ad oggi non sono note interazioni con farmaci, ma è opportuno che l'assunzione del prodotto sia distanziata di almeno 2 ore da quella dei farmaci o altri prodotti somministrati per via orale; infatti il potere osmotico del Macrogol e l'aumento della velocità di transito gastrointestinale indotta, possono influire negativamente sulla loro efficacia. Consultare comunque il proprio medico prima di assumere **PEGInpol** in caso di altre terapie in atto.

10. Modalità di Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto, a temperatura non superiore a 25°C, nella confezione originale. Non utilizzare **PEGInpol** dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

11. Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Data Ultima Revisione: Luglio 2018



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIA

Distribuito da Steve Jones srl
Via Alfieri 8 - 50019
Sesto Fiorentino (FI) - Italia
www.buona.it - info@buona.it

Steve Jones srl è un'azienda con sistema
di gestione qualità certificato ISO 9001



ROO. 0918.30660100F

buona