

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/12/2015

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:** Ngày uống 3 lần, uống sau bữa ăn:  
 - Trẻ em dưới 6 tuổi, mỗi lần 1 viên  
 - Trẻ em từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 2 viên  
 - Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 3 viên  
**CHỐNG CHỈ ĐỊNH & CÁC THỐNG TIN KHÁC:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

**CHỈ ĐỊNH:**  
 - Phòng và điều trị ngộ độc tiêu hóa khi ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn.  
 - Đau bụng, đầy hơi, ỉa chảy, kiết lỵ, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa



**P/H MỘC HƯƠNG**

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Phòng và điều trị  
ngộ độc tiêu hóa



**THÀNH PHẦN:** (cho 1 viên)  
 Bột Mộc hương ..... 120mg  
 Bột Hoàng liên ..... 240mg  
 Tá dược vơ ..... 1 viên  
**BẢO QUẢN:**  
 Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
**TIÊU CHUẨN:** TCCS.  
**SDK:**  
 Số lô SX :  
 Ngày SX :  
 HD :

**P/H MỘC HƯƠNG**

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim



**CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG**  
 Trụ sở: 56-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
 Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  
 ĐT: 04.33826222 \* Fax: 04.33978024



**P/H MỘC HƯƠNG**

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Phòng và điều trị  
ngộ độc tiêu hóa



486/152

# TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

## P/H MỘC HƯƠNG

**Thành phần:** (cho 1 viên)

Bột Mộc hương (*Pulveres radices saussureae lappae*) : 120mg

Bột Hoàng liên (*Pulveres rhizomae coptidis*) : 240mg

Tá dược (tinh bột sắn, calci carbonat, PVP K30, Avicel, HPMC 6cps, PEG 6000, talc, titan dioxyd, tartrazin, sắt oxyd đỏ, ethanol 96%, nước tinh khiết).....vừa đủ 1 viên

**Dạng bào chế:** Viên nén bao phim.

**Quy cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ x 10 viên.

**Chỉ định:**

- Phòng và điều trị ngộ độc tiêu hóa khi ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn.
- Đau bụng, đầy hơi, ỉa chảy, kiết lỵ, viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa.

**Cách dùng & liều dùng:**

Ngày uống 3 lần, uống sau bữa ăn:

- Trẻ em dưới 6 tuổi, mỗi lần 1 viên.
- Trẻ em từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 3 viên.

**Tác dụng phụ:**

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

**Chống chỉ định:**

Không dùng thuốc cho người thể hàn, hư hàn.

**Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác:** Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

**Quá liều và cách xử trí:** Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**Tiêu chuẩn:** TCCS.

**Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

**Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:**

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: [www.dongduocphuchung.com.vn](http://www.dongduocphuchung.com.vn)

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TUỢC CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Thị Thu Thủy*