

PHUC HUNG
H/D



THÀNH PHẦN: Mỗi lọ chứa 250ml cao lỏng (1,2) được chiết xuất từ 155g dược liệu đã qua chế biến gồm:

Hoàng liên	15g
Kê đầu ngựa	20g
Liên kiều	20g
Bồ công anh	10g
Bồ bô	50g
Kim ngân hoa	20g
Chi tử	10g
Hoàng bá	10g
Tà dược	và 250ml

CHỈ ĐỊNH:
 - Mất gan, giải độc, thanh huyết nhiệt. Chủ trị:
 - Mẩn ngứa, dị ứng, nổi mề đay.
 - Phụ nữ sạm da, nám má, da khô ráp.
 - Người bị táo bón, chức năng gan suy giảm.
 - Trẻ em mụn nhọt, rôm sảy.

Hộp 1 lọ x 250ml cao lỏng

**THANH HUYẾT
TIÊU ĐỘC P/H**



Hộp 1 lọ x 250ml cao lỏng

**THANH HUYẾT
TIÊU ĐỘC P/H**

PHUC HUNG

**THANH HUYẾT
TIÊU ĐỘC P/H**

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
 Ngày uống 2-3 lần, uống trước bữa ăn:
 - Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10-15ml (2 thìa cà phê).
 - Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20ml (3 thìa cà phê).
 - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25-30ml (2 thìa canh)

BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

**ĐỘC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
 Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Văn Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024



CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
 Ngày uống 2-3 lần, uống trước bữa ăn:
 - Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10-15ml (2 thìa cà phê).
 - Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15-20ml (3 thìa cà phê).
 - Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25-30ml (2 thìa canh)

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỘC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

SDK :
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD :

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Lọ 250ml cao lỏng

**THANH HUYẾT
TIÊU ĐỘC P/H**

PHUC HUNG

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu:.....2.3...03...2016.....



Handwritten signature

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THANH HUYẾT TIÊU ĐỘC P/H

Thành phần: (cho 1 lọ x 250ml)

Mỗi lọ chứa 250ml cao lỏng (1:2) được chiết xuất từ 155g dược liệu đã qua chế biến gồm:

Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>)	: 15g
Ké đầu ngựa (<i>Fructus Xanthii strumarii</i>)	: 20g
Liên kiều (<i>Fructus Forsythiae suspensae</i>)	: 20g
Bồ công anh (<i>Herba Lactucae indicae</i>)	: 10g
Bồ bồ (<i>Herba Adenosmatis indiani</i>)	: 50g
Kim ngân hoa (<i>Flos Lonicerae</i>)	: 20g
Chi tử (<i>Fructus Gardeniae</i>)	: 10g
Hoàng bá (<i>Cortex Phellodendri</i>)	: 10g
Tá dược (natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết)	: vừa đủ 250ml

Dạng bào chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 250ml.

Chỉ định:

Mát gan, giải độc, thanh huyết nhiệt. Chủ trị:

- Mẩn ngứa, dị ứng, nổi mề đay.
- Phụ nữ sạm da, nám má, da khô ráp.
- Người bị táo bón, chức năng gan suy giảm.
- Trẻ em mụn nhọt, rôm sảy.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, uống trước bữa ăn:

- Trẻ dưới 6 tuổi, mỗi lần 10 - 15ml (2 thìa cà phê).
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15 - 20ml (3 thìa cà phê).
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25 - 30ml (2 thìa canh).

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho người tỳ vị hư hàn.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian sử dụng thuốc, không nên ăn các thức ăn cay nóng, tôm, cua, cá và các đồ uống có cồn như rượu, bia...

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng


Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hằng