

Tài liệu lưu hành nội bộ

OTEOTAN

Ciprofloxacin 1mg/ 0.5ml - Ear drops, solution

Sterile solution



EAR DROPS



OTEOTAN

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Mỗi 0,5 ml liều dùng một lần chứa:

Thành phần hoạt chất: Ciprofloxacin 1 mg (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid 1.166 mg)
Thành phần tá dược: Acid Glacial acetic, Glycerol, Methylcellulose, Polysorbat 20, Natri acetat trihydrat, Natri hydroxid/ acid hydrochloric, nước pha tiêm.

CÔNG DỤNG

Dùng dịch nhỏ tại ciprofloxacin 1mg/0,5ml chỉ định để điều trị các bệnh sau:

Viêm tai ngoài cấp tính và viêm tai giữa có mũ màng tinh ở người lớn.

Viêm tai ngoài cấp tính ở trẻ em từ 1 tuổi trở lên có màng nhĩ còn nguyên vẹn. Cần xem xét các hướng dẫn chính thức về việc sử dụng kháng sinh hẹp lý.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn cảm với ciprofloxacin, các quinolon khác hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK: VN-22625-20

CÁCH DÙNG:

Để sử dụng dung dịch nhỏ tại đúng cách, nên hướng dẫn bệnh nhân nằm xuống với tai bị nhiễm khuẩn hướng lên trên, giữ và kéo dính tai ra sau. Sau đó, nên nhỏ hết dung dịch thuốc trong 1 tuyp vào tai, bóp tuyp thuốc ít nhất 3 lần, và giữ đầu của bệnh nhân ở vị trí này trong vài phút. Sau cùng, bệnh nhân nên ngồi dậy, nghiêng đầu qua bên ngược lại để lượng dung dịch thuốc dư thừa chảy ra khỏi tai đang được điều trị. Không nên che phủ hoặc bít tai bằng bông gòn hay vật liệu tương tự, do có thể gây ra kéo dài thời gian nhiễm khuẩn.

