

# MẪU NHÃN

17/MSB

## 1. Mẫu nhãn gói 5g

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHIÊ DUYỆT**

Lần đầu: 15-11-2016

**Sorbitol 5g**  
THUỐC BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG

Số lô SX: \_\_\_\_\_  
HSD : \_\_\_\_\_

**Gmp-who**

Thành phần: Cho 1 gói Sorbitol 5g

Chỉ định:  
- Điều trị triệu chứng táo bón và khô tiêu.  
- Nuôi dưỡng: 1 - 3 gói / ngày.  
- Trẻ em: Dùng ½ liều người lớn.

Cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS      SDK: \_\_\_\_\_

**CITY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**  
233 Đường Sĩ Thanh Khé, Tp. Đà Nẵng

## 2. Nhãn hộp 20 gói x 5g

HỘP 20 GỖ

THUỐC BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG

**Sorbitol 5g**

GMP-WHO

**Sorbitol 5g**

THUỐC BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG

DHM-DMD

**Sorbitol 5g**

THUỐC BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG

GMP-WHO

**Sorbitol 5g**

THUỐC BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG

GMP-WHO

Chỉ Định Điều Trị

**TRIỆU CHỨNG KHÓ TIÊU - TÁO BÓN**

**Danapha**  
PHARMACEUTICAL JSC

Composition:  
Sorbitol.....5 g  
Indications, contraindications, dosage, precautions, and other information.  
Please read carefully the instruction box.  
Storage: To be stored in a ventilation and dry place.  
Protect from light, the temperature below 30°C.

Keep out of reach children  
Read carefully the instruction before use  
Specifications: In House

Chỉ Định Điều Trị

**TRIỆU CHỨNG KHÓ TIÊU - TÁO BÓN**

**Danapha**  
PHARMACEUTICAL JSC

Thành phần: Sorbitol 5 g cho 1 gói  
Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.  
Chống chỉ định:  
- Trẻ em đang điều trị bằng thuốc khi dùng.  
- Trẻ em đang điều trị bằng thuốc khác.  
Bảo quản: Nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

SDK : \_\_\_\_\_ Ngày SX : \_\_\_\_\_  
Số lô SX : \_\_\_\_\_ HD : \_\_\_\_\_  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**  
233 Đường Sĩ Thanh Khé, TP. Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đ.S. Nguyễn Quang Trí, MBA**



## SORBITOL 5G

**THÀNH PHẦN:** mỗi gói chứa

Sorbitol..... 5 g

### ĐƯỢC LỰC HỌC

Sorbitol (D - glucitol) là một rượu có nhiều nhóm hydroxyl, có vị ngọt bằng 1/2 đường mía (sacarose). Thuốc thúc đẩy sự hydrat - hoá các chất chứa trong ruột. Sorbitol kích thích tiết cholecystokinin - pancreazymín và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thâm thấu.

### ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi uống, sorbitol được hấp thu kém qua đường tiêu hóa. Sorbitol chuyển hóa chủ yếu ở gan thành fructose, một phản ứng được xúc tác bởi sorbitol dehydrogenase. Một số sorbitol có thể chuyển đổi thẳng thành glucose nhờ aldose reductase. Một phần nhỏ sorbitol không chuyển hóa được đào thải qua thận. Phần còn lại đào thải dưới dạng CO<sub>2</sub> khi thở qua đường hô hấp.

### CHỈ ĐỊNH

Sorbitol được dùng trong điều trị triệu chứng khó tiêu và táo bón.

### LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

Chỉ được dùng với liều đơn và không thường xuyên.

*Điều trị triệu chứng khó tiêu:* Dùng thuốc trước bữa ăn hoặc khi có khó tiêu, người lớn 1 – 3 gói / ngày

*Điều trị táo bón:*

- Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng.
- Trẻ em dùng 1/2 liều người lớn.

*Cách dùng:* Pha 1 gói trong khoảng 50 ml nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại – trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc.
- Đau bụng chưa rõ nguyên nhân.
- Người không dung nạp fructose do di truyền (bệnh hiếm gặp).

### LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC

- Không dùng trong những trường hợp tắc đường dẫn mật.
- Ở người bệnh “đại tràng kích thích” tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều.
- Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.

*Nếu cần biết thêm thông tin về thuốc, xin tham khảo ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ*

### SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chưa có dữ liệu nghiên cứu sử dụng sorbitol cho những đối tượng này. Tham khảo ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng

### SỬ DỤNG THUỐC Ở NGƯỜI ĐANG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO

Không có tác động ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc và làm việc trên



cao.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Có thể bị tiêu chảy hay đau bụng, đặc biệt ở những người bệnh có “đại tràng kích thích” hoặc trứng bụng.

**Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

### TƯƠNG TÁC THUỐC

Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các loại thuốc uống cùng, do đó làm giảm hấp thu của các thuốc này.

### QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại.

*Cách xử trí:* bù nước và điện giải (nếu cần).

### KHUYẾN CÁO

Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như: vẩn đục, có vật lạ, nấm mốc....

### TRÌNH BÀY & BẢO QUẢN

- Đóng trong túi màu trắng, hàn kín, gói 5 gam, hộp 20 gói.

- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. **ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.**

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

*Thuốc được sản xuất tại*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

253 Dũng Sĩ Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

Tel : 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: [Info@danapha.com](mailto:Info@danapha.com)

Điện thoại tư vấn: 0511.3760131

*Và được phân phối trên toàn quốc*

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA



TU. CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG

*Đỗ Minh Hùng*