

# MEBENDAZOLE 500mg

Viên bao phim

## CÔNG THỨC:

Mebendazole..... 500mg

Tá dược vừa đủ..... 1 viên

(Tinh bột ngô (bắp), Lactose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Methacrylic acid copolymer, Hydroxypropylmethylcellulose, Polyethylene glycol 6000, Polysorbate 80, Titanium dioxide, Talc, Ethanol 96%).

## TÍNH CHẤT:

- Mebendazole - dẫn chất benzimidazole - có phô chống giun sán rộng. Thuốc có hiệu quả cao trên các giai đoạn trưởng thành và áu trùng của giun đũa, giun kim, giun tóc, giun móc,... Thuốc cũng diệt được trứng của giun đũa và giun tóc.

- Cơ chế tác dụng do thuốc liên kết với các tiêu quản của ký sinh trùng, qua đó ức chế sự trùng hợp tiêu quản thành các vi quản, cần thiết cho sự hoạt động bình thường của tế bào ký sinh trùng.

## CHỈ ĐỊNH:

Điều trị nhiễm một hay nhiều loại giun, như giun kim, giun tóc, giun móc, giun đũa và giun lươn.

## CÁCH DÙNG:

- Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: uống 1 liều duy nhất 1 viên.

- Ngừa nhiễm lại giun, mỗi 4 - 6 tháng uống 1 lần như trên.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với Mebendazole.

- Người bị bệnh gan.

## THẬM TRỌNG:

- Sử dụng Mebendazole kéo dài và dùng liều cao hơn liều khuyến cáo, cần theo dõi và kiểm tra chặt chẽ số lượng bạch cầu trung tính cũng như chức năng gan.

- Cần thông báo người bệnh giữ vệ sinh để phòng ngừa tái nhiễm và lây lan bệnh.

## THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

- Không được sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu thai kỳ.

- Thận trọng khi sử dụng thuốc ở phụ nữ cho con bú.

## TÁC DỤNG PHỤ:

- Ít gặp: chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy.

- Hiếm gặp: ngoại ban, mày đay, phù mạch, co giật.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## TƯƠNG TÁC THUỐC:

Dùng chung Mebendazole với:

- Phenytoin, Carbamazepine: làm giảm nồng độ Mebendazole trong huyết tương.

- Cimetidine: làm tăng nồng độ Mebendazole trong huyết tương.

## QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:

Khi bị quá liều, có thể xảy ra rối loạn đường tiêu hóa kéo dài vài giờ. Nên gây nôn và tẩy, có thể dùng than hoạt.

## HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

## BẢO QUẢN:

Nơi khô (độ ẩm ≤ 70%), nhiệt độ ≤ 30°C, tránh ánh sáng.

## TRÌNH BÀY:

Vỉ 1 viên bao phim. Hộp 1 vỉ.

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam