


 **SANDOZ**



ACTOBIM

L. acidophilus, B. infantis, E. faecium

Cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột



- **Chứa 3 chủng vi khuẩn đường tiêu hóa sinh acid lactic^(*)**
- **Thích hợp với mọi lứa tuổi (trẻ sơ sinh, trẻ em & người lớn)^(*)**

Số phiếu tiếp nhận HSDK tài liệu thông tin thuốc của Cục QLD-BYT:/...../QLD-TT. Cấp ngày.../.../...
Ngày in tài liệu/...../..... - Thông tin sản phẩm xin xem ở trang 2.

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

ACTOBIM®

L. acidophilus, B. infantis, E. faecium

Cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột



THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thành phần

Hoạt chất: Mỗi viên actobim chứa ít nhất $1,2 \times 10^7$ đơn vị khuẩn lạc sinh acid lactic, trong đó: *Lactobacillus acidophilus* (sp. *L.gasseri*) $\geq 4,5 \times 10^6$, *Bifidobacterium infantis* $\geq 3 \times 10^6$, *Enterococcus faecium* $\geq 4,5 \times 10^6$.

Tá dược: magnesi stearat, lactose, dextrin, tinh bột ngô, gelatin, methyl parahydroxybenzoat (E218) và propyl parahydroxybenzoat (E 216), titanium dioxide (E 171).

Đóng gói

Viên nang cứng màu trắng đục, bên trong chứa bột màu trắng không mùi.

Hộp 2 vỉ x 8 viên.

Chỉ định

Viên nang Actobim chứa 3 chủng vi khuẩn đông khô sinh acid lactic là thành phần sẵn có của hệ vi khuẩn đường ruột tham gia vào việc tiêu hóa, tổng hợp các vitamin và ức chế sự sinh sản của các vi khuẩn có hại.

Khi thiếu hụt lượng vi khuẩn sinh acid lactic, môi trường trở nên kiềm hơn, ức chế các hoạt động tiêu hóa của các enzyme dẫn đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn có hại. Khi cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ, dẫn tới một số rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, đầy hơi).

Viên nang Actobim dùng để phòng và hỗ trợ trong điều trị tiêu chảy, đầy hơi và các rối loạn tiêu hóa khác do:

- Nhiễm vi khuẩn và virus đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn.
- Điều trị bằng hóa chất và kháng sinh phổ rộng.
- Chiếu xạ vùng bụng và xương chậu.

Liều lượng và cách dùng

Dùng theo chỉ định của bác sĩ. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ.

- Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi: 1 viên/lần x 3 lần/ngày.


- Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày.

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày.

Điều trị tiêu chảy cho trẻ nhỏ hơn 6 tuổi phải có sự giám sát của bác sĩ.

Dùng Actobim sau bữa ăn với lượng nước vừa đủ.

VỚI NHỮNG TRẺ EM KHÔNG NUỐT ĐƯỢC VIÊN THUỐC, CÓ THỂ MỞ NANG THUỐC, CHO BỘT THUỐC (KHÔNG MÙI, KHÔNG VỊ) VÀO THÌA VÀ HÒA VỚI MỘT ÍT CHẤT LỎNG.



Để tránh tác dụng bất lợi của dịch acid dạ dày lên vi khuẩn sinh acid lactic nên dùng Actobim sau bữa ăn. Nếu tiêu chảy không được cải thiện sau 2 ngày dùng thuốc, cần đến gặp bác sĩ.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tương tác với các thuốc khác

Hãy thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ các thuốc mà bạn đang dùng hoặc mới dùng gần đây kể cả các thuốc không kê đơn. Cho tới nay chưa thấy có tương tác có ý nghĩa lâm sàng nào của thuốc với các thuốc khác được báo cáo. Không dùng Actobim với rượu và đồ uống nóng.

Thận trọng

Bệnh nhân cần tham khảo ý kiến trước khi sử dụng Actobim nếu:

- Nhiệt độ cơ thể lớn hơn 38°C.
- Có máu hoặc mủ trong phân.
- Tiêu chảy kéo dài hơn 2 ngày.
- Tiêu chảy kèm theo đau bụng nặng.
- Mắc các bệnh mãn tính khác (đái tháo đường, tim mạch) hoặc suy giảm miễn dịch (AIDS, HIV).

Phụ nữ có thai và cho con bú

Trị tiêu chảy cho phụ nữ có thai và cho con bú cần sự theo dõi của bác sĩ. Vì không có đủ dữ liệu về độ an toàn khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú nên không dùng thuốc cho đối tượng này.

Tác dụng phụ

Cũng như mọi thuốc khác, Actobim cũng gây ra một số tác dụng phụ, tuy nhiên không phải ai cũng gặp những tác dụng phụ này. Tác dụng phụ của vi khuẩn sinh acid lactic rất hiếm xảy ra. Có thể xảy ra các phản ứng mẫn cảm. Nếu tác dụng phụ trở nên nghiêm trọng hoặc gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào chưa liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng này hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.

Giữ thuốc xa tầm mắt và tầm tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, hãy hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Quá liều

Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo. Nếu xảy ra các tác dụng phụ cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ.

Bảo quản và hạn dùng

Bảo quản dưới 25°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc đã quá hạn trên bao bì.



VN-10368-10

(*) Thông tin kê toa

Mọi thông tin xin liên hệ:

TP.HCM: Lầu 10, Tòa nhà Centec
72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 Tel: 3823 9090 - Fax: 3823 9595

Hà Nội: P602, Lầu 6, Tòa nhà Harec
4A Láng Hạ, Q. Ba Đình Tel: 3772 7390 - Fax: 3514 7372

Nhà sản xuất:
LEK PHARMACEUTICALS D.D.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

Nhà phân phối:
VIMEDIMEX
246 Cống Quỳnh, Q.1, TP. HCM