https://nhathuocngocanh.com/

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

Viên nén air-x

Visa no.: VN -15376-12

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nén chứa :

Simethicone (USP 32) ..... 80,00 mg

Tá dược:

Silicon Dioxide dạng keo, Calci Stearate, Glucose khan, tinh dầu Caraway, thì là và bạc hà, Polyvinyl Pyrrolidone (Grade K 30), Sucrose.

MÔ TẢ: Viên nén hai mặt cong màu trắng, mùi thơm.

CHỈ ĐỊNH:

Đầy hơi ở đường tiêu hóa, cảm giác bị đè ép và căng ở vùng thượng vị, chướng bụng thoáng qua thường có sau bữa ăn thịnh soạn hoặc ăn nhiều chất ngọt, chướng bụng sau phẫu thuật; hội chứng dạ dày - tim, chuẩn bị chụp X-quang (dạ dày, ruột, túi mật, thận) và trước khi nội soi dạ dày.

LIỀU DÙNG:

Liều dùng thông thường cho người lớn là mỗi lần nhai kỹ 1 - 2 viên sau bữa ăn. Trong trường hợp chuẩn bị chụp X quang thì dùng 2 hoặc 3 ngày trước khi chụp. Liều dùng được điều chỉnh tùy theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

THẬN TRỌNG:

Không nên sử dụng quá 12 viên/ ngày trừ khi có chỉ định và theo dõi của thầy thuốc.

QUÁ LIỀU:

- Chưa có báo cáo nào về tác dụng gây hại của thuốc khi sử dụng quá liều, có lẽ là do tính chất trơ về mặt hóa học và không được hấp thu qua đường tiêu hóa của Simethicone.
- Tuy nhiên, nếu có triệu chứng bất thường khi dùng thuốc quá liều, hãy đến bệnh viện để được áp dụng các biện pháp giải độc thông thường và điều trị theo triệu chứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Các trường hợp quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ:

AIR - X làm giảm đáng kể triệu chứng và loại bỏ khí gây chứng đầy hơi. Thành phần hoạt tính quan trọng nhất của AIR - X, dimethylpolysiloxan, không được hấp thu vào dạ dày và ruột, do đó thường không có bất kỳ tác động gây hại nào cho cơ thể.

Tuy nhiên cần thông báo ngay cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn, nếu có.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có tương tác thuốc nào giữa AIR-X với thuốc khác được báo cáo.

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc có thể dùng trong thời kỳ có thai và cho con bú. Tuy nhiên, không rõ thuốc có qua được nhau thai vào thai nhi hay bài tiết vào sữa hay không. Do đó cần thận trọng khi sử dụng thuốc.

- Ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

CÁC LƯU Ý ĐẶC BIỆT:

Sử dụng cho trẻ em: Simethicone có thể dùng cho trẻ em mọi lứa tuổi, tuy nhiên đối với trẻ em nhỏ hơn 12 tuổi nên dùng Air-X giọt.

Sử dụng cho trẻ sơ sinh: Chỉ dùng Air-X giọt theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Sử dụng cho người già, người suy gan, suy thận: Do Simethicone không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa nên không gây ảnh hưởng gì đối với người già, người suy gan, suy thận.

TIÊU CHUẨN:

USP 32.

HẠN DÙNG:

5 năm tính từ ngày sản xuất.

CẢNH BÁO:

Không dùng thuốc này khi quá hạn dùng ghi trên bao bì đựng thuốc, khi thuốc đổi màu hay có mùi lạ.

Để thuốc ngoài tầm tay của trẻ em.

ĐÓNG GÓI: 10 x 10 Viên nén / Hộp

BẢO QUẢN:

Trong bao bì thật kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ phòng (<30°C).

Sản xuất tại
R.X. Manufacturing Co., Ltd.
76 Moo 10, Salaya-Bangpasi Road, Narapirom, Banglane,
Nakornpathom 73130,Thailand
Tel : 660-3429 8117-21 Fax: 660-3429 8117-21. Ext. 2422